


## Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky



# Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019-2048



15. október 2018

Spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci projektu: „Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené vtáčie územia – 2. etapa“



EURÓPSKA ÚNIA



Investícia do Vašej budúcnosti



NATURA 2000

## OBSAH

ÚVOD .....	4
<b>1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE .....</b>	<b>5</b>
1.1. ČÍSLO PODĽA ŠTÁTNÉHO ZOZNAMU .....	5
1.2. PRÍSLUŠNOSŤ K EURÓPSKEJ SÚSTAVE CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ .....	5
1.3. KATEGÓRIA A NÁZOV ÚZEMIA .....	5
1.4. PLATNÝ PRÁVNÝ PREDPIS O VYHLÁSENI CHRÁNENÉHO ÚZEMIA.....	5
1.5. CELKOVÁ VÝMERA CHRÁNENÉHO ÚZEMIA.....	5
1.6. SÚČASNÝ STAV PREDMETU OCHRANY.....	6
1.6.1. Prírodné pomery.....	6
1.6.2. Stručný popis predmetu ochrany .....	18
1.6.3. Hodnotenie stavu predmetu ochrany, stanovenie priorít ochrany.....	19
1.6.3.1. Súčasný stav druhov .....	19
1.6.3.1.1. Definovanie stavu druhu sokol sťahovavý v CHVÚ Strážovské vrchy.....	19
1.6.3.1.2. Definovanie stavu druhu výr skalný v CHVÚ Strážovské vrchy.....	22
1.6.3.1.3. Definovanie stavu druhu žlna sivá v CHVÚ Strážovské vrchy.....	24
1.6.3.1.4. Definovanie stavu druhu orol skalný CHVÚ Strážovské vrchy .....	27
1.6.3.1.5. Definovanie stavu druhu bocian čierny v CHVÚ Strážovské vrchy .....	29
1.6.3.1.6. Definovanie stavu druhu včelár lesný v CHVÚ Strážovské vrchy.....	31
1.6.3.1.7. Definovanie stavu druhu tetrov hlucháň v CHVÚ Strážovské vrchy .....	33
1.6.3.1.8. Definovanie stavu druhu kuvik kapcavý v CHVÚ Strážovské vrchy .....	35
1.6.3.1.9. Definovanie stavu druhu lelek lesný v CHVÚ Strážovské vrchy .....	37
1.6.3.1.10. Definovanie stavu druhu chriašteľ poľný v CHVÚ Strážovské vrchy .....	39
1.6.3.1.11. Definovanie stavu druhu ďateľ čierny v CHVÚ Strážovské vrchy .....	41
1.6.3.1.12. Definovanie stavu druhu ďateľ bielochrbtý v CHVÚ Strážovské vrchy .....	43
1.6.3.1.13. Definovanie stavu druhu jariabok hôrny v CHVÚ Strážovské vrchy .....	45
1.6.3.1.14. Definovanie stavu druhu penica jarabá v CHVÚ Strážovské vrchy .....	46
1.6.3.1.15. Definovanie stavu druhu ďateľ prostredný v CHVÚ Strážovské vrchy .....	48
1.6.3.1.16. Definovanie stavu druhu muchárik červenohrdlý v CHVÚ Strážovské vrchy .....	50
1.6.3.1.17. Definovanie stavu druhu muchárik bielokrký v CHVÚ Strážovské vrchy .....	52
1.6.3.1.18. Definovanie stavu druhu strakoš červenochrbtý v CHVÚ Strážovské vrchy .....	54
1.6.3.1.19. Definovanie stavu druhu strakoš sivý v CHVÚ Strážovské vrchy .....	56
1.6.3.1.20. Definovanie stavu druhu prepelica poľná v CHVÚ Strážovské vrchy .....	57
1.6.3.1.21. Definovanie stavu druhu krutihlav hnedý v CHVÚ Strážovské vrchy .....	59
1.6.3.1.22. Definovanie stavu druhu prhlaviar čiernochlavý v CHVÚ Strážovské vrchy .....	61
1.6.3.1.23. Definovanie stavu druhu hrdlička poľná v CHVÚ Strážovské vrchy .....	63
1.6.3.1.24. Definovanie stavu druhu žltochvost lesný v CHVÚ Strážovské vrchy .....	65
1.6.3.1.25. Definovanie stavu druhu muchár sivý v CHVÚ Strážovské vrchy .....	66
1.6.3.2. Stav druhov vtákov na ochranu ktorých sa vyhlasuje CHVÚ a ich biotopov.....	68
1.6.3.2.1. Sokol sťahovaný.....	68
1.6.3.2.2. Výr skalný.....	69
1.6.3.2.3. Žlna sivá.....	69
1.6.3.2.4. Orol skalný .....	69
1.6.3.2.5. Bocian čierny.....	69
1.6.3.2.6. Včelár lesný.....	69
1.6.3.2.7. Tetrov hlucháň .....	69
1.6.3.2.8. Kuvik kapcavý .....	69
1.6.3.2.9. Lelek lesný .....	69
1.6.3.2.10. Chriašteľ poľný .....	70
1.6.3.2.11. Ďateľ čierny .....	70
1.6.3.2.12. Ďateľ bielochrbtý .....	70
1.6.3.2.13. Jariabok hôrny .....	70
1.6.3.2.14. Penica jarabá .....	70
1.6.3.2.15. Ďateľ prostredný .....	70
1.6.3.2.16. Muchárik červenohrdlý .....	70
1.6.3.2.17. Muchárik bielokrký .....	70
1.6.3.2.18. Strakoš červenochrbtý .....	71
1.6.3.2.19. Strakoš sivý .....	71
1.6.3.2.20. Prepelica poľná .....	71
1.6.3.2.21. Krutihlav hnedý .....	71
1.6.3.2.22. Prhlaviar čiernochlavý .....	71
1.6.3.2.23. Hrdlička poľná .....	71
1.6.3.2.24. Žltochvost lesný .....	71
1.6.3.2.25. Muchár sivý .....	71
1.6.3.3. Cieľový stav druhu.....	72
1.6.3.3.1. Sokol sťahovaný.....	72

1.6.3.2.2. Výr skalný.....	72
1.6.3.2.3. Žlna sivá.....	72
1.6.3.2.4. Orol skalný .....	72
1.6.3.2.5. Bocian čierny.....	72
1.6.3.2.6. Včelár lesný.....	72
1.6.3.2.7. Tetrov hlucháň .....	72
1.6.3.2.8. Kuvik kapcavý .....	73
1.6.3.2.9. Lelek lesný .....	73
1.6.3.2.10. Chriašteľ poľný .....	73
1.6.3.2.11. Ďateľ čierny.....	73
1.6.3.2.12. Ďateľ bielochrbtý .....	73
1.6.3.2.13. Jariabok hôrny.....	73
1.6.3.2.14. Penica jarabá .....	73
1.6.3.2.15. Ďateľ prostredný.....	73
1.6.3.2.16. Muchárik červenohrdlý .....	74
1.6.3.2.17. Muchárik bielokrký.....	74
1.6.3.2.18. Strakoš červenochrbtý .....	74
1.6.3.2.19. Strakoš sivý .....	74
1.6.3.2.20. Prepelica poľná .....	74
1.6.3.2.21. Krutihlav hnedý .....	74
1.6.3.2.22. Pŕhlaviar čiernohlavý .....	74
1.6.3.2.23. Hrdlička poľná .....	74
1.6.3.2.24. Žltochvost lesný .....	75
1.6.3.2.25. Muchár sivý .....	75
1.6.3.4. Osobitné záujmy.....	75
1.6.3.4.1. Sokol sťahovaný.....	75
1.6.3.4.2. Výr skalný.....	75
1.6.3.4.3. Žlna sivá.....	75
1.6.3.4.4. Orol skalný .....	76
1.6.3.4.5. Bocian čierny.....	76
1.6.3.4.6. Včelár lesný.....	76
1.6.3.4.7. Tetrov hlucháň .....	76
1.6.3.4.8. Kuvik kapcavý .....	77
1.6.3.4.9. Lelek lesný .....	77
1.6.3.4.10. Chriašteľ poľný .....	77
1.6.3.4.11. Ďateľ čierny.....	77
1.6.3.4.12. Ďateľ bielochrbtý .....	77
1.6.3.4.13. Jariabok hôrny.....	77
1.6.3.4.14. Penica jarabá .....	78
1.6.3.4.15. Ďateľ prostredný.....	78
1.6.3.4.16. Muchárik červenohrdlý .....	78
1.6.3.4.17. Muchárik bielokrký.....	78
1.6.3.4.18. Strakoš červenochrbtý .....	78
1.6.3.4.19. Strakoš sivý .....	78
1.6.3.4.20. Prepelica poľná .....	79
1.6.3.4.21. Krutihlav hnedý .....	79
1.6.3.4.22. Pŕhlaviar čiernohlavý .....	79
1.6.3.4.23. Hrdlička poľná .....	79
1.6.3.4.24. Žltochvost lesný .....	79
1.6.3.4.25. Muchár sivý .....	79
1.6.4. Hodnotenie ďalších osobitných záujmov ochrany prírody a krajiny v území .....	80
1.7. VÝSLEDKY KOMPLEXNÉHO ZISŤOVANIA STAVU LESA .....	81
<b>2. SOCIOEKONOMICKÉ POMERY (VYUŽÍVANIE ÚZEMIA A JEHO OKOLIA), POZITÍVNE A NEGATÍVNE FAKTORY .....</b>	<b>82</b>
2.1. HISTORICKÝ KONTEXT .....	82
2.2. STRUČNÝ OPIS AKTUÁLNEHO STAVU.....	83
2.3. NÁVRH ZÁSAD A OPATRENÍ VYUŽÍVANIA ÚZEMIA A JEHO OKOLIA Z HĽADISKA CIEĽOV OCHRANY.....	84
2.3.1. Návrh zásad a opatrení pre jednotlivé predmety ochrany .....	84
2.3.1.1. Návrh zásad a opatrení pre sokola sťahovavého .....	85
2.3.1.2. Návrh zásad a opatrení pre výra skalného .....	85
2.3.1.3. Návrh zásad a opatrení pre žlnu sivú .....	86
2.3.1.4. Návrh zásad a opatrení pre orla skalného .....	86
2.3.1.5. Návrh zásad a opatrení pre bociana čierneho .....	86
2.3.1.6. Návrh zásad a opatrení pre včelára lesného .....	87
2.3.1.7. Návrh zásad a opatrení pre tetrova hlucháňa.....	87
2.3.1.9. Návrh zásad a opatrení pre kuvika kapcavého.....	88
2.3.1.10. Návrh zásad a opatrení pre lelka lesného .....	88

2.3.1.11. Návrh zásad a opatrení pre chriašteľa poľného .....	88
2.3.1.12. Návrh zásad a opatrení pre ďatľa čierneho .....	89
2.3.1.13. Návrh zásad a opatrení pre ďatľa bielochrbtého .....	89
2.3.1.13. Návrh zásad a opatrení pre jariabka hôrneho .....	89
2.3.1.14. Návrh zásad a opatrení pre penicu jarabú.....	90
2.3.1.15. Návrh zásad a opatrení pre ďatľa prostredného.....	90
2.3.1.16. Návrh zásad a opatrení pre muchárika červenohrdlého .....	91
2.3.1.19. Návrh zásad a opatrení pre strakoša sivého .....	91
2.3.1.20. Návrh zásad a opatrení pre prepelicu poľnú.....	92
2.3.1.21. Návrh zásad a opatrení pre krutihlava hnedého .....	92
2.3.1.22. Návrh zásad a opatrení pre pŕhľaviara čiernohlavého .....	92
2.3.1.23. Návrh zásad a opatrení pre hrdličku poľnú.....	92
2.3.1.24. Návrh zásad a opatrení pre žltouchvosta lesného.....	93
2.3.1.25. Návrh zásad a opatrení pre muchára sivého.....	93
<b>2.3.2. Členenie územia na ekologicko-funkčné priestory (EFP).....</b>	<b>93</b>
2.3.2.1. Návrh zásad a opatrení v EFP1 – hnieddiská sokola stáhovavého a výra skalného.....	95
2.3.2.3. Návrh zásad a opatrení v EFP3 – hnieddiská chriašteľa poľného, prepelice poľnej, strakoša sivého a loviská dravcov .....	97
2.3.2.4. Návrh zásad a opatrení v EFP4 – hnieddiská ďatľa bielochrbtého a muchárika červenohrdlého .....	98
2.3.2.5. Návrh zásad a opatrení v EFP5 – hnieddiská penice jarabej, strakoša červenochrbtého a hrdličky poľnej .....	99
2.3.2.6. Návrh zásad a opatrení v EFP6 – hnieddiská ďatľa prostredného a muchárika bielokrkého....	100
<b>3. CIELE STAROSTLIVOSTI A OPATRENIA NA ICH DOSIAHNUTIE.....</b>	<b>101</b>
3.1. STANOVENIE DLHODOBÝCH CIEĽOV STAROSTLIVOSTI V NADVÄZNOSTI NA EKOLOGICKO-FUNKČNÉ PRIESTORY .....	101
3.2. STANOVENIE OPERATÍVNÝCH CIEĽOV V NADVÄZNOSTI NA EKOLOGICKO-FUNKČNÉ PRIESTORY .....	105
3.3. RÁMCOVÉ PLÁNOVANIE A MODELY HOSPODÁREŇIA PRE LESNÉ BIOTOPY .....	107
3.4. NAVRHOVANÉ OPATRENIA, STANOVENIE HARMONOGRAMU ICH PLNENIA, URČENIE SUBJEKTU ZODPOVEDNÉHO ZA ICH PLNENIE, STANOVENIE MERATEĽNÝCH INDIKÁTOROV ICH PLNENIA. ....	111
<b>4. SPÔSOB VYHODNOCOVANIA PLNENIA PROGRAMU STAROSTLIVOSTI .....</b>	<b>134</b>
<b>5. POUŽITÉ PODKLADY A ZDROJE INFORMÁCIÍ .....</b>	<b>151</b>
<b>6. PRÍLOHY .....</b>	<b>154</b>
6.1. MAPA PREDMETOV OCHRANY CHVÚ STRÁŽOVSKÉ VRCHY .....	154
6.2. MAPA IDENTIFIKÁCIE VLASTNÍCKO – UŽIVATEĽSKÝCH VZŤAHOV CHVÚ STRÁŽOVSKÉ VRCHY.....	155
6.3. MAPA VYUŽITIA ÚZEMIA CHVÚ STRÁŽOVSKÉ VRCHY.....	156
6.4. MAPA EKOLOGICKO FUNKČNÝCH PRIESTOROV CHVÚ STRÁŽOVSKÉ VRCHY.....	157
6.5. INÁ DOKUMENTÁCIA .....	158
6.5.1. Mapa častí CHVÚ Strážovské vrchy so zakázanými činnosťami podľa vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z. z.....	158
6.5.2 Mapa prekryvu CHVÚ Strážovské vrchy s chránenými územiami a územiami európskeho významu (ÚEV).....	159
6.5.3. Porastová mapa CHVÚ Strážovské vrchy.....	160

## ÚVOD

Chránené vtáchie územie Strážovské vrchy bolo vyhlásené v r. 2009 za účelom **zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov stáhovavých druhov vtákov: sokola sťahovavého, výra skalného, žlny sivej, orla skalného, bociana čierneho, včelára lesného, tetrova hlucháňa<sup>1</sup>, kuvika kapcavého<sup>1</sup>, lelka lesného, chriašteľa polného<sup>1</sup>, d'atľa čierneho<sup>1</sup>, d'atľa bielochrbtého, jariabka hôrneho, penice jarabej, d'atľa prostredného, muchárika červenohrdlého<sup>1</sup>, muchárika bielokrkého, strakoša červenochrbtého<sup>1</sup>, strakoša sivého<sup>1</sup>, prepelice polnej, krutihlavu hnedého<sup>1</sup>, pŕhľaviara čiernohlavého, hrdličky polnej, žltochvosta lesného<sup>1</sup> a muchára sivého.** Chránené vtácie územie Strážovské vrchy je jedným z najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie sokola sťahovavého, výra skalného a žlny sivej.

V programe starostlivosti je uvedené podrobne hodnotenie stavu uvedených 25 druhov vtáctva, ako aj z tohto hodnotenia vychádzajúce **4 dlhodobé ciele ochrany, 32 operatívnych cieľov a 207 opatrení** na ich dosiahnutie. Návrhy zásad a opatrení sú stanovené pred jednotlivé druhy vtáctva a následne zoskupené podľa ekologicko - funkčných priestorov. V Chránenom vtáčom území Strážovské vrchy bolo vymedzených **6 ekologicko-funkčných priestorov** podľa výskytu a nárokov jednotlivých druhov vtáctva a ich skupín.

Dlhodobým cieľom programu starostlivosti je zachovanie súčasného priaznivého stavu 20 druhov vtáctva a zlepšenie stavu 5 druhov vtákov - žlna sivá, jariabok hôrny, žltochvost lesný a strakoš sivý, vrátane zvrátenia veľmi nepriaznivého stavu druhu tetrov hlucháň prostredníctvom vytvorenia podmienok pre návrat druhu do CHVÚ.

Schválením programu starostlivosti sa nemení súčasný právny stav, ktorý je upravený v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 434/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtácie územie Strážovské vrchy, ako aj v ďalších predpisoch na úseku ochrany prírody, starostlivosti o lesy, poľovníctva, rybárstva, územného plánovania a iných. Spresňujú sa však zásady využívania územia a stanovujú sa opatrenia na dosiahnutie cieľov ochrany vtáctva.

Schválením programu starostlivosti budú tiež vytvorené podmienky pre systematickejšiu **spoluprácu s dotknutými vlastníkmi a užívateľmi pozemkov** a na realizáciu opatrení z fondov EÚ (69,4 % predpokladaných výdavkov programu starostlivosti), hlavne z Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020.

---

<sup>1</sup> V programe starostlivosti sú použité slovenské mená *tetrov hlucháň, kuvik kapcavý, chriašteľ polný, d'atel čierny, strakoš červenochrbtý, strakoš sivý, krutihlav hnedý a žltochvost lesný* v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 434/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtácie územie Strážovské vrchy, ako aj s prílohou č. 4 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov („vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z.“). V aplikačnej praxi sa používajú v súčasnosti aj mená *hlucháň hôrny, pôtič kapcavý, chrapkáč polný, tesár čierny, strakoš obyčajný, strakoš veľký, krutohlav hnedý a žltochvost hôrny*, ktoré sú uvedené v prílohe č. 32 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.

## 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

### 1.1. Číslo podľa štátneho zoznamu

Chránené vtáchie územie Strážovské vrchy (ďalej aj „**CHVÚ Strážovské vrchy**“) je evidované v Štátom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny pod číslom **A/22**.

### 1.2. Príslušnosť k európskej sústave chránených území

CHVÚ Strážovské vrchy je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000<sup>2</sup>. Prekrýva sa so 4 územiami európskeho významu, ktoré sú vymenované v prílohe rozhodnutia Komisie 2008/218/ES z 25. januára 2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma prvý aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne. Podrobnosti sú uvedené v časti 1.6.4. a mapovej prílohe č. 6.5.2.

### 1.3. Kategória a názov územia

Príslušnosť k európskej sústave chránených území:

Natura 2000

Kód územia:

SKCHVU028

Kategória:

Chránené vtáchie územie

Názov územia:

Strážovské vrchy

### 1.4. Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 434/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáchie územie Strážovské vrchy (ďalej len „**vyhláška MŽP SR č. 434/2009 Z. z.**“), nadobudla účinnosť 1. novembra 2009.

### 1.5. Celková výmera chráneného územia

Celková rozloha CHVÚ Strážovské vrchy stanovená vyhláškou je **58 673 ha**. Mapa využitia územia je prílohou č. 6.3.

Tabuľka č. 1: Výmera v členení podľa druhov pozemkov (podľa stavu katastra nehnuteľností k 1. máju 2015)

Kód pozemku	Druh pozemku	Zastúpenie v %
2	orná pôda	1,50
4	vinica	0,00
5	záhrada	0,03
6	ovocný sad	0,00
7	trvalé trávne porasty (TTP)	13,32
10	lesný pozemok	83,17
11	vodná plocha	0,21
13	zastavaná plocha a nádvorie	0,65
14	ostatná plocha	1,12
Spolu		100,00

<sup>2</sup> § 28 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

## 1.6. Súčasný stav predmetu ochrany

### 1.6.1. Prírodné pomery

#### Geografická poloha a vymedzenie územia

CHVÚ Strážovské vrchy sa nachádza na severozápade Slovenska. Z väčšej časti leží v Trenčianskom kraji, ale časť prechádza do Žilinského kraja. Najjužnejší bod územia je pri obci Dolné Vestenice, najsevernejší pri obci Hričovské Podhradie. Geomorfologicky CHVÚ hraničí na západe s Považským podolím, na juhu s Považským Inovcom a Podunajskou pahorkatinou, východnú hranicu tvorí časť Hornonitrianskej kotliny a Malej Fatry, severne leží Žilinská kotlina. Zastavané územia obcí nie sú súčasťou CHVÚ. CHVÚ Strážovské vrchy pretínajú dve cesty druhej triedy (II/517 a II/574), množstvo ciest tretej triedy, ciest miestneho významu a spevnených či nespevnených lesných ciest.

#### Klíma

Podnebím patria Strážovské vrchy do **mierne teplej klimatickej oblasti** s priemernými ročnými teplotami **7 až 8°C a úhrnom zrážok od 700 do 1000 mm**. V strednej časti pohoria je chladnejšia klíma s priemernou ročnou teplotou 5°C. Najteplejší mesiac je júl s priemernou teplotou 15 až 18°C. Najchladnejší je mesiac január s teplotami -3 až -6°C. Súvislá snehová pokrývka sa udrží priemerne 80 až 120 dní v roku, dĺžka trvania snehovej pokrývky je značne závislá na expozícii oblasti a nadmorskej výške. Vďaka značne pretiahnutému tvaru CHVÚ v smere sever-juh a značným rozdielom reliéfu sú však klimatické podmienky v jednotlivých častiach pohoria odlišné. Južná časť pohoria je výraznejšie ovplyvňovaná teplejšou klímom susednej Podunajskej pahorkatiny, zatiaľ čo severná oblasť klímom chladnejších horských oblastí. To sa napríklad prejavuje v priemerných počtoch letných dní v rozmedzí 20 až 30. Častý je inverzný ráz počasia, kedy rozdiely medzi vzduchovými hmotami môžu byť až 10°C.

#### Geologické podmienky a formy reliéfu

Strážovské vrchy sa po štruktúrnej stránke odlišujú od ostatných jadrových pohorí vnútorných Karpát, lebo netvoria jednotnú megaantiklinál, ale niekoľko antiklinálnych a synklinálnych popaleogénnych pásiem. Je to pohorie **morfologicicky silne rozčlenené**. Tiež z hľadiska geologického majú Strážovské vrchy mimoriadne pestré zloženie s typickou príkrovovou stavbou. Kryštalické jadro pohoria paleozoického veku je malé a asymetricky vysunuté do juhovýchodnej časti, kde vytvára masív Malej Magury a Suchého. Budujú ho **kryštalické bridlice, hlavne ruly, migmatity a niekoľko typov granitoidov**. Podstatnú časť tvoria silne zvrásnené a presúvané mezozoické komplexy. Na kryštalínikum sú v okolí Gápl'a viazané **hydrotermálne kremenné žily** s drobným výskytom olovnatých a zinkových rúd. Z minerálov obsahujú okrem kremeňa, kalcitu, hematitu a sideritu aj galenit, sfalerit a pyrit. Severný okraj kryštalických masívov lemuje úzky pruh obalovej malomagurskej jednotky (bridlice, kremence, vápence, dolomity, pieskovce).

Severne od nej sa rozprestiera **krížanský príkrov**, ktorý buduje celú centrálnu časť. Tvorí ho prevažne stredne a málo odolné komplexy zliechovskej a z časti belianskej série (**vápence, dolomity** a rozhovcové slienité vápence, **sliene, bridlice, kremence a pieskovce**). Na krížanskom príkrove sú plocho uložené komplexy chočského príkrovu, ktorý tvoria prevažne veľmi odolné polohy masívnych vápencov a dolomitov. Severne od Valaskej Belej sa nachádza v lokalite Kozí vrch bohaté nálezisko **skamenelin**. V predmetnom území leží aj allgäuské súvrstvie tvorené škvrnitými slieňovcami a slienitými vápencami. V súvrství sa nachádza bohatá fauna amonitov (Rajecká Lesná, Trenčianske Teplice, Čičmany).

**Chočský príkrov** buduje miestami celé horské skupiny (Strážov, Basky, Rokoš, veľkú časť Trenčianskej vrchoviny), inde sú len trosky ako pozostatok pôvodného súvislého príkrovu. V nadloží chočského príkrovu sa miestami vyskytujú i zvyšky vyššieho príkrovu (strážovského), ktorý tvoria veľmi odolné svetlé vápence a dolomity (Strážov, Basky, Hrubá Kečka). **Strážovský príkrov** tvorí severnú oblasť Strážovských vrchov, priliehajúcu k vnútrokarpatskému paleogénu a tvorí i menšie trosky na chočskom príkrove. Vyznačuje sa prítomnosťou svetlých vápencov tzv. wettersteinského typu.

Severozápadný okraj vrchov budujú intenzívne prevrásnené komplexy **manínskeho príkrovu** kriedového veku. Prevažnú časť územia tvoria kriedové stredne až málo odolné horniny vo flyšovom vývoji (Butkovská brázda).

Mohutné **bradlo Butkova** budujú jurské útvary (krinoidové, piesčité a rohovcové **vápence**) a organogénne vápence spodnej kriedy a sliene. Z nerastných surovín majú najväčší význam nerudné suroviny (vápence, sliene, dolomity a kremence).

Kedže prevažná časť Strážovských vrchov je budovaná vápencami, viažu sa k nim aj krasové javy. Nachádzajú sa tu rozsiahle **krasové oblasti** ako Mojtínsky kras, či kras v okolí Strážova. Stretávame sa s podzemnými, ale i povrchovými formami krasu. Z povrchových sa tu vyskytujú krasové jamy, škrapy (možno nájsť na Hrubej Kačke, vrchole Bosmán) a z podzemných jaskyne a prieplasti. V Strážovských vrchoch evidujeme **cca 200 väčších i menších jaskýň**. Väčšina z nich je ľahko dostupná a v niekoľko málo z nich sa zachovala i ojedinelá sintrová výplň v podobe rozličných kvapľových útvarov.

V rámci geomorfologického členenia Slovenskej republiky (Mazúr, Lukniš, 1986) patrí CHVÚ do **Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, oblasti Tatransko-fatranská**. Celky CHVÚ tvoria **južnejšie Strážovské vrchy a severnejšie Súľovské vrchy**.

Geologická stavba má zásadný vplyv na výsledný reliéf pohoria. Pokiaľ na kryštaliku sa vytvoril hladko modelovaný reliéf, na mäkkých, prevažne bridlicových horninách vznikli exogénnymi vplyvmi kotliny s pahorkatinným charakterom a brázdy. Na dolomitických a vápencových horninách vznikli strmé skalné vyvýšeniny, bradlové útvary a príkrovové trosky, ktoré sú často rozčlenené úzkymi kaňonovitými dolinami. Na tieto horniny sa viaže aj podzemný kras, už vyššie spomínané rozsiahle krasové oblasti Mojtínskeho krasu a v okolí Strážova.

Reliéf Strážovských vrchov vďaka svojej členitosti vykazuje nielen znaky pahorkatiny (výškové rozdiely 31 až 100 m), vyššej pahorkatiny (101 až 180 m), ale aj vrchoviny (181 - 310 m), hornatiny (311 až 470 m) či vysočiny (471 až 640 m).

Štruktúrne typy reliéfu sa vyskytujú v mimoriadne pestrom bohatstve tvarov. Detailná tvárnosť okrajov príkrovových trosiek je veľmi pestrá a striedajú sa tu súvislé skalné steny (zápole) s braňami stráňami rozčlenenými úzkymi krasovými a polokrasovými dolinami a tiesňavami, až po skalné mestá. V morfologickej exponovaných polohách sa zachovali príkrovové trosky len na malých plochách v podobe izolovaných vrchov. Majú ráz pyramidálnych alebo štíhlych kužeľovitých vrchov, respektíve pretiahnutých hrebeňov s rozsiahlymi skalnými útvarmi a štruktúrnymi tvarmi. Keďže príkrovové trosky budujú karbonatické horniny, viažu sa k nim krasové javy. Zovreté doliny majú povahu **kaňonov až tiesňav** a ich stráne vyznačujú časté braňné partie. Medzi výnimočné typy reliéfu patria vápencové **Butkovské bradlá**. Vyznačuje ich veľká relatívna výška, vysoké sklony a značný podiel skalných tvarov rozčlenených hlbkými skalnými tiesňavami.

#### Hydrologické pomery

Severná a západná časť CHVÚ patrí do **povodia Váhu**, východná a južná časť do **povodia rieky Nitry**. Najvýznamnejšimi prítokmi Nitry sú Tužina, Chvojnica, Nitrica a Bebrava. Najvýznamnejším prítokom Váhu je Rajčanka, ktorá odvodňuje severné svahy pohoria. Ďalšími sú Pružinka, Slatinský potok, Teplička, Radiša, Domanžanka. Vodný režim pohoria patrí k stredohorskej oblasti s maximom prietokov počas topenia snehu (marec-apríl), s minimom v zime. Zásoby podzemných vôd sú ovplyvnené geologickým zložením a reliéfom. V kryštalickej oblasti Malej Magury a Suchého sú **podzemné vody** s početnými, ale menej výdatnými prameňmi. Oveľa väčší význam majú oblasti, ktoré tvoria mezozoické útvary. Pre podzemný obeh vôd sú najvýznamnejšie čisté masívne vápence a dolomity najmä vyšších príkrovov. Vývery majú ráz krasových prameňov s veľkou výdatnosťou. Oproti tomu sú prvky

krížanského príkrovu najmä s väčšou prímesou nekarbonatických látok, menej bohaté na podzemné vody. Strážovské vrchy sú bohaté aj na termálne vody (napr. Belušské Slatiny).

### Pôdy

V CHVÚ sú najrozšírenejším pôdnym typom **rendziny** (prevažne plytký pôdny profil a značná skeletnatosť), miestami v bralných oblastiach **litosoly**. Rendziny sa viažu na karbonatické horniny a dominujú vo všetkých hornatých i vrchovinných častiach pohoria s výnimkou Suchého a Malej Magury, kde prevládajú **hnedé pôdy** nenasýtené. V eróznych brázdach a na znižených okrajoch pohoria sú hnedé pôdy nasýtené a sprievodné rendziny a pararendziny.

### Flóra

Podľa fytogeografického členenia spadá CHVÚ Strážovské vrchy do oblasti **západokarpatskej flóry** (*Carpaticum occidentale*), obvodu predkarpatskej flóry (*Praecarpaticum*), okresu Strážovské a Súľovské vrchy.

Vyznačuje sa bohatou vápencovou flórou so zastúpením teplomilných panónskych druhov, horských a vysokohorských karpatských druhov. Podstatný vplyv na charakter flóry majú hlavne pestré mikroklimatické podmienky ako aj severo - južná orientácia pohoria.

Na celom území prevládajú **biotopy kvetnatých a vápnomilných bučín**, na Strážove sa v najvyšších nadmorských výškach pohoria vyskytujú aj **javorovo-bukové horské lesy**. V závislosti od lokálnych pôdnich a mikroklimatických podmienok sú tu zastúpené **aj lipovo-javorové sutiňové lesy**. V Podhradskej doline dosahujú severnú hranicu rozšírenia **lesostepné spoločenstvá s dubom plstnatým**. Z lúčno-pasienkových spoločenstiev sa tu nachádzajú **podhorské lúky a suchomilné travinobylinné a krovité porasty**, miestami s výskytom borievky obyčajnej a druhmi z čelade vstavačovité (*Orchidaceae*). V nivách potokov sa nachádzajú vysokobylinné spoločenstvá, brehové porasty deväťsilov a biotopy podhorských jelšových lesov. Časté, hoci rozlohou nepatrné, sú podmáčané biotopy slatinných lúk a podsvahových pramenísk, ojedinele s tvorbou penovca.

Vzhľadom na akútne problém zarastania nelesných biotopov sú najviac ohrozené lúčne a mokraďové druhy: bradáčik vajcovitolistý (*Listera ovata*), hmyzovník holubyho (*Ophrys holubyana*), hmyzovník muchovitý (*Ophrys insectifera*), pavstavač hlavatý (*Traunsteinera globosa*), päťprstnica obyčajná (*Gymnadenia conopsea*), vemeníček zelený (*Coeloglossum viride*), vemeník dvojlistý (*Platanthera bifolia*), vemeník zelenkastý (*Platanthera chlorantha*), vstavač bledý (*Orchis pallens*), vstavač mužský poznáčený (*Orchis mascula subsp. signifera*), vstavač obyčajný (*Orchis morio*), vstavač vojenský (*Orchis militaris*), vstavačovec bazový (*Dactylorhiza sambucina*) - žltá a fialová forma, vstavačovec Fuchsov Sooov (*Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana*). Na mokradiach často rastú kruštík močiarny (*Epipactis palustris*), vstavačovec májový (*Dactylorhiza majalis*), vzácnejšie päťprstnica hustokvetá (*Gymnadenia densiflora*).

Hodnotu z hľadiska vývoja karpatskej flóry majú tzv. **západokarpatské endemity a subendemity**, ako sú klinček lesklý (*Dianthus nitidus*), klinček včasného pravý (*Dianthus praecox subsp. praecox*), poniklec prostredný (*Pulsatilla subslavica*), poniklec slovenský (*Pulsatilla slavica*), stoklas jednosteblový (*Bromus monocladius*) a soldanelka karpatská (*Soldanella carpatica*).

Okrem spomínaných chránených rastlinných druhov sa v území ďalej vyskytujú **druhy európskeho významu** ako prílba tuhá moravská (*Aconitum firmum subsp. moravicum*), v bučinách sa veľmi vzácne vyskytuje orchidea črievičník papučkový (*Cypripedium calceolus*).

Najviac horských a vysokohorských druhov je koncentrovaných na vrchole Strážova, napríklad iskerník alpínsky (*Ranunculus alpestris*), iskerník veľhorský (*Ranunculus breyninus*), lipnica alpínska (*Poa alpina*). Zo Strážova bola opísaná reznačka laločnatá slovenská (*Dactylis glomerata subsp. slovenica*).

Celkový ráz CHVÚ určujú aj travinno-bylinné porasty suchomilných a stredne vlhkomilných lúk a pasienkov. Z ohrozených druhov sa v nich hojne vyskytujú horec krížatý (*Gentiana cruciata*), mečík škrídlicovitý (*Gladiolus imbricatus*), orlíček obyčajný (*Aquilegia vulgaris*), veternica lesná (*Anemone sylvestris*), žltohlav najvyšší (*Trollius altissimus*).

CHVÚ Strážovské vrchy je prevažne lesnaté územie. Prevládajúcou drevinou je buk lesný (*Fagus sylvatica*), ojedinele sa vyskytuje hrab obyčajný (*Carpinus betulus*), dub zimný (*Quercus petraea*), vo vyšších polohách jedľa biela (*Abies alba*) a smrek obyčajný (*Picea abies*). **Smrekové porasty** sú väčšinou nepôvodné, spolu s borovicou boli na mnohých miestach umele rozšírené na úkor buka. Bralá a skalné chrbty s plytkou pôdou obsadzuje pôvodná **borovica lesná** (*Pinus sylvestris*). Na chladnejších severných stenách sa sporadicky vyskytuje chránená drevina tis obyčajný (*Taxus baccata*). Pozornosť si zasluhujú porasty duba plstnatého (*Quercus pubescens*) v Podhradskej doline. Je to botanicky veľmi zaujímavé miesto s výskytom teplomilných druhov ako hadí mor rakúskej (*Scorzonera austriaca*), kavyl' drsnosteblový (*Stipa eriocaulis*), kavyl' pôvabný (*Stipa pulcherrima*), lykovec voňavý (*Daphne cneorum*).

Vo vlhkých roklinách a sutinách môžeme nájsť miestami vzácné druhy kortúza Matthiolioho (*Cortusa matthioli*), či jazyk jelení (*Phyllitis scolopendrium*).

#### Fauna

CHVÚ je súčasťou **lesnej zóny palearktickej oblasti**. Podľa zoogeografického členenia Slovenska patrí územie do provincie listnatých lesov, podkarpatského úseku. Ekologické faktory (abiotické a biotické) určujú životné podmienky pre faunu. Vzhľadom na ich rozdielne pôsobenie sú rôzne i životné podmienky v rozličných biotopoch, čo je určujúcim faktorom formovania živočíšnych spoločenstiev. Uvádzame stručný prehľad suchozemských a vodných živočíšnych spoločenstiev CHVÚ Strážovské vrchy.

## BEZSTAVOVCE

#### **Mollusca**

V území, vzľadom na prevahu karbonátového podložia, nachádza vhodné podmienky pestré spektrum lesných aj slatiných druhov **mäkkýšov** (*Mollusca*). Viaceré z nich patria medzi vzácné a ohrozené mäkkýše Slovenska: ciha karpatská (*Clausilia dubia carpatica*), pimprlík močiarny (*Vertigo geieri*), pimprlík zubatý (*Vertigo antivertigo*), pimprlík mokradný (*Vertigo angustior*).

#### **Coleoptera**

**Chrobáky** Strážovských vrchov nie sú dostatočne preskúmané. K vzácnym druhom patria niektoré xylosaprofágne druhy zachovalých prirodzených listnatých lesov a pralesovitých lokalít (Strážov, Podhradská lesostep, Rokoš a ī.). Larvy viacerých vzácnych chrobákov sa vyvíjajú v dreve starých odumretých listnatých stromov. Typický predstaviteľ bukových lesov s dostatom odumretých stromov je fúzač alpský (*Rosalia alpina*).

#### **Lepidoptera**

K pomerne vzácnym patria niektoré druhy **motýľov** lúčno pasienkovej krajiny s pestrou skladbou flóry. Významné sú modráčiky viazané na zachovalé pasienkové spoločenstvá trávnatých porastov na vápencoch: modráčik čiernoškvrrnný (*Maculinea arion*), modráčik horcový (*Maculinea alcon*), modráčik Rebelov (*Maculinea rebeli*), vidlochvost ovocný (*Iphiclides podalirius*), priadkovec trnkový (*Eriogaster catax*). Lesné okraje s chochlačkami (*Corydalis sp.*) umožňujú výskyt jasoňa chochlačkového (*Parnassius mnemosyne*). Na vápencových xerotermných svahoch s rozchodníkom prežívajú metapopulácie druhu jasoň červenooký (*Parnassius apollo*).

## STAVOVCE

### ***Amphibia***

**Obojživelníky:** skokan hnedý (*Rana temporaria*), skokan štíhly (*Rana dalmatina*), ropucha bradavičnatá (*Bufo bufo*), ropucha zelená (*Bufo viridis*), rosnička zelená (*Hyla arborea*), kunka žltobruchá (*Bombina variegata*), mlok horský (*Triturus alpestris*), mlok karpatský (*Triturus montandoni*), mlok bodkovaný (*Triturus vulgaris*), salamandra škvornitá (*Salamandra salamandra*).

### ***Reptilia***

V území sú zaznamenané druhy **plazov**: jašterica bystrá (*Lacerta agilis*), jašterica múrová (*Podarcis muralis*), slepúch lámový (*Anguis fragilis*), užovka obojková (*Natrix natrix*), (*Coronella austriaca*), užovka stromová (*Elaphe longissima*) a v prostredí s horskou klímou sa vyskytujú jašterica živorodá (*Zootoca vivipara*), vretenica severná (*Vipera berus*).

### **Aves**

Stav významných druhov **vtáctva** je detailnejšie uvedených v ďalších častiach dokumentu.

### ***Mammalia***

**Cicavce** patria medzi pomerne dobre známe a preskúmané živočíchy Strážovských vrchov. Osobitne priaznivé podmienky poskytujú Strážovské vrchy so svojimi lesnými a skalnými krasovými biotopmi pre netopiere. Typické druhy pre oblasť sú podkovár krapatý (*Rhinolophus hipposideros*), netopier veľkouchý (*Myotis bechsteini*), netopier východný (*Myotis blythii*), netopier obyčajný (*Myotis myotis*), netopier brvitý (*Myotis emarginatus*).

Z ďalších cicavcov sa v území bežne vyskytuje kuna lesná (*Martes martes*), kuna skalná (*Martes foina*), hranostaj čiernochvostý (*Mustela erminea*), lasica myšožravá (*Mustela nivalis*), vydra riečna (*Lutra lutra*), jazvec lesný (*Meles meles*). V posledných rokoch sa tu častejšie objavuje psík medviedikovitý (*Nyctereutes procyonoides*).

Kopytníky reprezentuje srnec lesný (*Capreolus capreolus*), jeleň lesný (*Cervus elaphus*), diviak lesný (*Sus scrofa*) a nepôvodný muflón lesný (*Ovis musimon*).

Z veľkých mäsožravcov je zistený nepravidelný výskyt vlka (*Canis lupus*). Pomerne vzácny je rys ostrovid (*Lynx lynx*) a medveď hnedý (*Ursus arctos*), ktoré tu majú stály výskyt. Veľmi početná je líška (*Vulpes vulpes*).

### Vymedzenie a opis biotopov druhov

Hniezdnymi biotopmi **sokola stáhovavého** sú oblasti v lesnom a horskom prostredí so skalnými svahmi a stenami s dostatkom dutín alebo lavíc pre umiestnenie hniezda (SOS/BirdLife 2013). Vo svete obýva veľmi rôznorodé biotopy, hniezdi od tropických oblastí po studené morské oblasti, v horúcich alebo studených púštnych oblastiach. Mimo hniezdneho obdobia bol sokol stáhovavý registrovaný prakticky všade vo svete, napr. aj mimo súvislej pevniny na lodiach v Tichom oceáne (White et al. 2015). Na Slovensku sú hniezdnymi biotopmi druhu vysoké skalné útvary v lesnom prostredí, obvykle vzdialené od frekventovaných ciest a ľudských sídiel nedaleko otvorenej krajiny. Hniezdi v pohoriach od nadmorskej výšky 240 m n. m. (Burda, Malé Karpaty) až po najvyššie polohy Tatier (cca 1 780 m n. m.). Typický hniezdný biotop predstavuje horské lesné prostredie so skalnatými svahmi, stenami s dostatkom dutín alebo lavíc, vhodných pre umiestnenie znášky. Nie je výnimkou, ak obsadí hniezda postavené krkavcom alebo umelé hniezda inštalované na skalných stenách (Chavko, unpubl.). Výnimočne hniezdi aj v opustených lomoch (napr. Javorie – Schwarbacher, Jasík, Bačkor in litt., Cerová vrchovina - Chavko in verb.). Podmienkou hniezdenia je vhodný skalný biotop. Prakticky na celom území, vrátane nížin, možno zastihnuť prevažne migrujúce zimujúce jedince alebo jedince z blízkych pohorí. Veľmi zriedkavo môže zahniezdiť aj v nížine. Z nášho územia je známy iba jediný preukázaný prípad úspešného hniezdenia v r. 1995 na topoli v typickej agrocenóze juhozápadného Slovenska (Vďačný in verb.). Potravné biotopy predstavujú územia v pestrej krajine s mozaikou lesov, vód a

poľnohospodárskej krajiny v nižších a stredných polohách (Jasík in litt; Karaska a Cichocki 2014). V CHVÚ Strážovské vrchy druh hniezdi na lokalitách s vhodným skalným biotopom.

Hniezdnymi biotopmi **výra skalného** sú oblasti s dostatkom skalných útvarov (kameňolomy, skaly, skalné bralá) v blízkosti otvorenej poľnohospodárskej krajiny (Danko a Karaska 2002). Vo svete preferuje človekom riedko osídlené oblasti, kde sa vyskytuje najmä v neprístupnom teréne. Hniezdi v skalnej krajine s útesmi a roklinami, v okolí jaskyň, v lesných fragmentoch, v oblastiach s roztrúsenými stromami a v hájoch, všeobecne na nerušených miestach, mimo ľudských sídel. Obýva tiež rozvoľnené lesy, ale aj tajgu a ostatné typy lesných porastov. Ďalej aj lesostepy, riečne údolia s roklinami a zarastenými lomami, tiež poľnohospodársku krajinu so skalnatým prostredím a útesmi. Potravné biotopy zahŕňajú oblasti v otvorenej krajine alebo v riedko zalesnenom teréne; napr. inundačné územia, poľnohospodársku krajinu, pasienky, malé obrábané polia. Hniezdnym prostredím výra skalného na Slovensku sú oblasti s dostatkom kameňolomov a skál. Okrem neprístupných skalných útvarov preferuje druh aj hniezdenie na zemi, napr. medzi balvanmi v lesnom poraste, v koreňových vývratoch, v strmých svahoch, niekedy aj na strmých kamenito-hlinitých zalesnených brehoch vód (rieka Orava pri Tvrdošíne). Raritou je aj hniezdenie na opustenom železničnom moste v rovinatej krajine (Karaska a Cichocki 2014). Od začiatku 90. rokov minulého storočia sa začal výr skalný šíriť aj do nížinných lužných lesov hraničného pásma v okolí toku rieky Moravy, kde hniezdi v stromových hniezdach (napr. v dravčích a bocianích hniezdach a koloniach volaviek) (Zuna-Kratky 2003). Na území Slovenska boli stromové hniezda registrované napr. v porastoch lužného lesa (západné Slovensko), ďalej v nížinných dubovo-hrabových porastoch (háj susediaci s poliami a lúkami, na okraji rúbane, okres Prievidza) (Šotnár 2007) alebo v brehových porastoch topoľa sivého v nížinnej otvorenej krajine (východné Slovensko) (Pačenovský et al. 2012). V CHVÚ Strážovské vrchy hniezdi v rámci skalných útvarov a stien v oblastiach s bezprostrednou nadváznosťou na poľnohospodársku krajinu.

Hniezdnymi biotopmi **žlny sivej** sú staré listnaté, zmiešané, menej ihličnaté lesy s dostupnými trávnatými biotopmi, kde vyhľadáva kolónie mravcov (SOS/BirdLife 2013). V Európe a Ázii preferuje druh rozvoľnenejšie lesné porasty v otvorenej krajine, napr. lužné lesy, parky, záhrady a sady. Spravidla sa vyskytuje v listnatých lesoch, avšak lokálne obýva aj borovicovo-dubové lesy (*Pinus-Quercus*), alebo rozvoľnené horské ihličnaté lesy so smrekovcom (*Larix*). V Európe sa hniezdne biotopy čiastočne prekrývajú s biotopmi žlny zelenej (*Picus viridis*), avšak žlna sivá preferuje viac lesný interiér. Vyhýba sa čistým ihličnatým porastom tajgového charakteru (napr. v strednej Sibíri), preferuje viac listnaté lesy (Winkler a Christie 2015). Na Slovensku obýva žlna sivá listnaté lesy, napr. bučiny, lužné lesy a staré brehové porasty pozdĺž vodných tokov, cintoríny, stromoradia, parky v intravilánoch obcí a miest, ale aj skupiny stromov a solitéry v otvorenej krajine (Karaska a Cichocki 2014). Žlna sivá sa v CHVÚ Strážovské vrchy vyskytuje rovnomerne, čo je podmienené mozaikovitou štruktúrou krajiny vytvorenou striedaním sa lesných a nelesných biotopov.

Hniezdnymi biotopmi **orla skalného** sú vyššie položené lesnaté oblasti v montánnom a subalpínskom pásme s príahlými poliami a pasienkami v horských kotlinách (SOS/BirdLife 2013). Vo svete obýva širokú škálu otvorených biotopov, zvyčajne mimo ľudských sídel, napr. pohoria, kotliny a stepnú krajinu. Lokálne sa vyskytuje aj v okolí mokradí, preferuje nízku alebo redšiu vegetáciu pred husto zalesnenými územiami. Rozšírený je od púští po okraje tundry, od hladiny mora až po vysoké pohoria. Častý je aj v alpínskom pásme, najmä v lete. Na hniezdenie využíva nedostupné, málo urbanizované priestory, napr. skalné steny a stromy v starých redších lesných porastoch. Na odpočinok a nocľah využíva najmä suché stromy v blízkosti hniezda. V suchých oblastiach v Idaho (USA) preferuje druh ako hniezdný biotop oblasti porastené palinou (*Artemisia*). V takomto biotope sa zdržujú vysoké počty zajaca kalifornského (*Lepus californicus*), hlavnej potravy orla skalného v tejto oblasti (Orta et al. 2015). Na Slovensku sú typickým prostredím orla skalného vysoké zalesnené skalnaté pohoria s rozsiahlymi lúkami, pasienkami a poliami ako loviskami v blízkosti. Vyhovujú mu aj väčšie lesné komplexy s extenzívne využívanou poľnohospodárskou krajinou bez skalného

prostredia. Druh a typ lesa nie je až taký dôležitý, ale v prípade stromových hniezd vyžaduje aspoň menšie enklávy starých porastov s mohutnými stromami, najčastejšie jedľami (Karaska a Cichocki 2014).

Hniezdnymi biotopmi **bociana čierneho** sú lesy všetkých typov, prirodzené aj umelé. Podmienkou je prítomnosť aspoň malého množstva starých stromov s vhodným habitatom pre umiestnenie hniezda (Karaska 2002). Vo svete obýva nerušené oblasti lesných porastov v blízkosti potokov, mokradí, vodných plôch a brehov riek, kde hľadá potravu. Vyhýba sa veľkým vodným plochám a súvislým lesným porastom. Hniezdi mimo intravilánov obcí a miest. Vtáky v subsaharskej Afrike a na Iberskom polostrove preferujú skalnaté biotopy s riečnymi korytami. Na Iberskom polostrove sú významnými biotopmi napájadlá dobytka, ktoré sú umiestnené ďalej od cest, s veľkou vodnou hladinou, hlbšou vodou a s vysokou diverzitou vodných živočíchov. Zimujúce a migrujúce vtáky sa vyskytujú aj na mokradiach v otvorenej krajine a na ryžových poliach (Elliott et al. 2014). Na Slovensku hniezdi na celom území od 100 m n. m vo Východoslovenskej nížine po 1000 m n. m v Oravských Beskydách a Tatrách. Preferuje najmä enklávy starých porastov obvykle vo väčších lesných komplexoch (Karaska 2002). Hniezdo je umiestnené najčastejšie na starých stromoch, zvyčajne na spodných vetvach ďalej od kmeňa (listnaté stromy) alebo na bočných vetvach tesne pri kmeni (ihličnaté stromy) (Hudec et al 1994). Okrem hniezd na starých stromoch boli hniezda zistené aj v páse topoľov v poľnohospodárskej krajine (Rác in litt, Podunajská rovina), na skalách v lesnom prostredí (napr. Nízke Tatry, Muránska planina, Malá Fatra) a na poľovníckych posedoch (Karaska ex Karaska 2002; Štollmann ex Karaska 2002, Podbeskydská vrchovina).

Hniezdnymi biotopmi **včelára lesného** sú hlavne teplejšie oblasti listnatých lesov (hrabiny, dubiny, bučiny) v susedstve s lúkami a pasienkami so zastúpením rozptýlenej zelene, kde je dostatok jeho potravy - blanokrídleho hmyzu (Karaska a Danko 2002). Vo svete obýva biotopy podobného charakteru, preferuje najmä listnaté lesy, avšak vyskytuje sa aj v zmiešaných porastoch. V niektorých oblastiach svojho areálu hniezdi aj v ihličnatých lesoch (napr. Škandinávia, Veľká Británia). Obsadzuje aj rôzne biotopy v otvorenej alebo zalesnenej krajine, vrátane vresovísk a oblastí v poľnohospodárskej krajine. Predpokladá sa, že na hniezdenie vyžaduje nerušené miesta. V Afrike zimuje v sekundárnych lesných porastoch a iných husto zalesnených oblastiach (Orta et al. 2013). Hniezdnym prostredím na Slovensku sú lesy od Luhov pri Latorici, Dunaji a Morave až po zmiešané a ihličnaté lesy centrálnej časti Západných Karpát. Obýva všetky lesnaté oblasti s priľahlou mozaikou krajinou do približne 900–1000 m n.m. Vzhľadom na potravnú špecializáciu na blanokrídly hmyz mu najviac vyhovujú teplejšie a suchšie južné svahy. Optimálnym prostredím sú lesnaté nízke až stredne vysoké oblasti Karpát na okraji nížin. Preferuje viacetážové zmiešané porasty. Neobýva oblasti bez lesov a zriedkavý je aj v územiach s intenzívou poľnohospodárskou výrobou s prevahou ornej pôdy (Karaska a Danko 2002, Karaska a Cichocki 2014).

Hniezdnymi biotopmi **kuvika kapcavého** sú horské ihličnaté a zmiešané lesy. Vo svete obýva boreálne, subalpínske a zmiešané lesy. V Európe hniezdi v horských borovicových (*Pinus*), borovicovo-smrekových (*Picea*) a brezových (*Betula*) lesoch, v starých porastoch s bukom (*Fagus*) a vo vyspelých ihličnatých lesoch. V severnej Amerike hniezdi v smrekových (*Picea mariana*, *P. glauca*), topoľových (*Populus*), brezových a jedľových (*Abies balsamea*) lesoch. Vyskytuje sa aj v starých topoľových a zmiešaných lesných porastoch, ďalej v subalpínskych lesoch s jedľou plsnatoplodou (*Abies lasiocarpa*) a smrekom engelmannovým (*Picea engelmanni*). Počas zimy preferuje staré lesné porasty. Veľké stromy zachytávajú sneh a umožňujú jednoduchší prístup ku koristi. Počas jari sa presúva do otvorennejšej krajiny (orná pôda, rúbaniská, lesné okraje), kde je vyššia denzita hrabošov (Holt et al. 1999). Hniezdný biotop kuvika kapcavého na Slovensku tvoria ihličnaté a zmiešané lesy, najmä smrekové, menej jedľovo-bukové na rovinách i v horách, obvykle vo väčších lesných komplexoch. Dôležitým faktorom pri hniezdení je prítomnosť dutín v teritóriu, ktoré sú často vytiesané ďalšom čiernym v bukoch, jedliach, zriedkavejšie boroviciach a menej aj v smrekoch. Druh vzácnne obsadzuje aj vhodné hniezdne búdky (Párnica, Malá Magura; Osádka, Ostrý vrch) (Karaska a Cichocki 2014).

Hniezdnymi biotopmi **leľka lesného** sú riedke lesy, okraje hustejších krovinatých oblastí alebo stepné oblasti. Vyhýba sa lokalitám bez stromového alebo krovinného pokryvu, poľnohospodárskej krajine, vysokým polohám a tundre (Danko 2002). Vo svete obýva hlavne suchú otvorenú krajinu, napr. nížinné vresoviská s roztrúsenými stromami, lesy a kroviny (najmä paseky, čistiny a okraje lesov), rúbaniská a mladiny. Vyskytuje sa tiež v otvorenej kriedovej krajine (Anglicko), v okolí priemyselných skládok odpadu, v lesostepiach, na riedko porastených kamenitých stráňach, v dubových krovinách, na kamenistých a piesočnatých dunách, v púštiach a polopúštiach. Vyhýba sa oblastiam v urbánnej krajine, pohoriam, nižinám bez stromov, hustým interiérom lesov, vyspelým monokultúram a vysokým lúčnym porastom. Potravné biotopy zahŕňajú aj menej typické oblasti, napr. záhrady, poľnohospodársku pôdu, okolie trstínových porastov a mokradí (Cleere a Christie 2013). Na Slovensku hniezdi lelek lesný v rozvoľnených lesoch (najmä v borovicových porastoch) s výskytom rúbanísk, lesných okrajov a teplých strání s porastom krovísk a solitérnych stromov. Ďalej preferuje aj mozaikovité lúky a pasienky s krovinami, často s výskytom borievky (Karaska a Cichocki 2014).

Hniezdnymi biotopmi **chriašteľa poľného** sú hlavne lúky, predovšetkým extenzívne a nepravidelne obrábané, tiež dlhodobo nekosené lúky, s bylinným porastom vyšším ako 20 cm, ktorý poskytuje úkryt (Demko 2001, Hudec a Šťastný 2005). V Európe a Ázii hniezdi v suchších až vlhkých lúkach a pasienkoch, vrátane horských lúk a okrajov mokradí. Vyhýba sa príliš zaplaveným mokradiam, stojatej vode a otvorenej krajine so skalami, štrkcom a pieskom. Mimo obdobia hniezdenia obýva aj agrocenózy (obilné polia, okopaniny a krmoviny). Počas zimovania sa zdržuje v trávnatých oblastiach, napr. v savanách, často aj v oblastiach spálených v období sucha (Afrika) (Taylor a de Juana 2014). Na Slovensku pôvodne hniezdil v extenzívne využívaných podmáčaných lúkach ovplyvnených prirodzeným režimom riek (v súčasnosti niva rieky Morava, Latorica, Ipeľ). V horských a podhorských oblastiach sú hniezdnymi biotopmi druhu najmä extenzívne využívané prirodzené lúky aj bez vplyvu vodného režimu (Demko 2001). Ďalšími charakteristickými biotopmi sú oblasti pravidelne nevyužívané ľudskou činnosťou (napr. okraje mokradí, ruderálne biotopy – rumoviská a skládky organického materiálu). Osobitný typ biotopu predstavujú opustené poľnohospodárske pozemky – napr. úhory, kde sa nevykonáva žiadna činnosť (Demko 2001).

Hniezdnymi biotopmi **ďatľa čierneho** sú staré porasty listnatých, zmiešaných, ale aj ihličnatých lesov rozsiahlejšieho charakteru (Kropil 2002a). Vo svete obýva všetky typy klimaxových lesných porastov, vrátane lesných okrajov, vyhýba sa však veľmi hustým lesom. V Škandinávii a na Sibíri uprednostňuje smrekovo-borovicové lesy s prímesou smrekovca, ďalej obýva aj brezové, topoľové a jelšové porasty. V Poľsku hniezdi vo všetkých typoch prírodných lesných porastov. V Japonsku obýva boreálne zmiešané alebo ihličnaté lesy do 1000 m n.m, zriedka sa vyskytuje v nížinách. Vyžaduje staré práchnivé stromy a pne pre vyhľadávanie potravy a vhodné stromy pre tesanie dutín. Mimo obdobia hniezdenia sa vyskytuje aj v otvorenej krajine, lesných čistinách a na okrajoch miest (Winkler a Christie 2002a). Na Slovensku hniezdi ďatel' čierny od nížin po hornú hranicu lesa. Na nížinách preferuje lužné lesy (mäkký a tvrdý luh), v stredných polohách bukové porasty a vo vyšších polohách horské zmiešané a smrekové lesy. Hniezdi aj v lesných fragmentoch, ak sa v danom poraste vyskytuje dostatok drevín pre tesanie dutín a vyhľadávanie potravy (práchnivé pne, staré stromy) (Kropil 2002).

Hniezdnymi biotopmi **ďatľa bielochrbtého** sú bukové, jedľo-bukové, smrekovo-jedľovo-bukové a lokálne aj dubové lesy v nadmorských výškach od 330–1300 m n. m. Teritóriá sú predovšetkým v strmších svahoch s vyšším podielom mŕtveho dreva (SOS/BirdLife 2013). Vo svete obýva biotopy podobného charakteru. Preferuje vyspelé klimaxové, avšak rozvoľnené listnaté a zmiešané lesy s vysokým podielom mŕtveho dreva a padnutých kmeňov. Obýva najmä porasty staršie ako 80 rokov, umiestnené často na strmých svahoch alebo nedaleko vody. V prírodných lesoch východnej Európy hniezdi v bažinatých lesoch s jaseňom (*Fraxinus*), jelšou (*Alnus*), ďalej v lesných porastoch s dubom (*Quercus*) a hrabom (*Carpinus*). Príležitostne sa vyskytuje aj v ihličnatých lesoch. V strednej Európe a v Pyrenejach je typický

v rozvoľnenejších, svetlých zmiešaných lesoch (buk-dub, buk, jedľa, javor, smrek a pod.). Na Peloponézkom poloostrove je úzko viazaný na vyspelé horské lesy s dominantou jedľou gréckou (*Abies cephalonica*). Na Sibíri hniezdi ďatel' bielochrbtý v listnatých lesoch s brezou (*Betula*), ďalej v zmiešaných svetlých ihličnatých lesoch a pozdĺž záplavových oblastí s porastami vráb (*Salix*). Japonské populácie ďatľa sú závislé na prírodných bukových lesoch (Winkler a Christie 2002b). Na Slovensku je ďatel' bielochrbtý typickým druhom starých listnatých a zmiešaných lesov v štádiu rozpadu s významným zastúpením buka. Zásadný význam má prítomnosť odumretých stromov, kde nachádza potravu a v ktorých si buduje aj hniezda (Karaska a Cichocki 2014).

Hniezdnymi biotopmi **jariabka hôrneho** sú ihličnaté, zmiešané a listnaté lesy v stredných a vo vyšších horských polohách (300–1850 m n.m.) s výskytom bobuľonosných krovín (Saniga 2002). Vo svete obýva najčastejšie zmiešané lesy, od nížin po horské oblasti (napr. v Alpách sa vyskytuje po 1600–1800 m n.m.). V Nórsku je druh viazaný na stredoveké zmiešané lesy s porastami smreka (*Picea abies*), borovice (*Pinus sylvestris*), brezy plstnatej (*Betula pubescens*), brezy previsnutej (*Betula pendula*) a na iné opadavé stromy (*Populus tremula*, *Alnus glutinosa*, *A. incana*, *Salix caprea*, *Sorbus aucuparia* a *Prunus padus*). V severovýchodnej Číne uprednostňuje sekundárne porasty. Predpokladá sa, že druh sa nedokázal adaptovať na malé fragmenty pôvodných lesných porastov. Jariabok sa všeobecne vyhýba čistým ihličnatým porastom. Vyžaduje prítomnosť bohatého podrastu (do 2 m) a čistín, s porastami jelše, brezy, topoľa a liesky pozdĺž potokov, riek, prechodných oblastí (ekotónov) a čistín vzniknutých vďaka požiarom. Vyhýba sa úplne otvoreným priestranstvám. V švajčiarskych Alpách preferuje lesy s vysokým podielom jelše s bohatou vertikálnou štruktúrou (s množstvom vysokých porastov jarabiny vtáčej, s hustým podrastom a lesnými okrajmi) (de Juana a Kirwan 2013). Optimálny hniezdzny biotop na Slovensku predstavujú stanovišia prírodných lesov v štádiu rozpadu, ako aj mozaika sekundárnych lesných porastov, kde sa striedajú všetky vekové stupne. Vyhovujú mu najmä zmiešané porasty s pestrou štruktúrou, kde sa striedajú staršie porasty s čistinami a mladinami. Preferuje ľažko prístupné husté porasty s extenzívnym lesným hospodárením (svahy hôr, údolia lesných potokov, vlhkejšie miesta na kalamitiskách a húštine na styku so starými porastami a zarastené pasienky). Lesy obýva až po ich hornú hranicu a okrajovo zasahuje až do kosodreviny. Optimálne sú preň najmä stredné a vyššie polohy a lesné porasty v štádiu rozpadu. Druh preferuje aj hraničné línie medzi porastami so zárástom pionierskych drevín (lieska, breza, jelša, baza) (Saniga 2002; Karaska a Cichocki 2014).

Hniezdnymi biotopmi **penice jarabej** sú krovité porasty na južne exponovaných stráňach a rovinách v teplých nížinných a podhorských oblastiach (Krištín 2002a). V Európe a Ázii obýva biotopy podobného charakteru. Obýva kroviny a krovinné formácie, od lesných okrajov, hustých trnítych krovín, čistín s hustým podrastom po mladé porasty plantáží, húštine pri riebach, živé ploty pozdĺž ciest, pasienky, lúky, parky a sady (Aymí et al 2015). Druh častejšie hniezdi v suchých oblastiach, vo vhodných porastoch môže byť aj v blízkosti vody, obsadzuje aj svetlé listnaté lesy a ihličnaté lesy s podrastom (Šťastný & Hudec 2011). Na zimoviskách v Afrike obýva suchú otvorenú krajinu s krovinami, kde dominujú akáciové porasty (*Acacia*) a porasty *Commiphora*; vyskytuje sa aj v suchej savane (Aymí et al. 2015). Na Slovensku hniezdi v otvorenej krajine so skupinami alebo pásmi hustých trnítych krovín. Spravidla vyžaduje prítomnosť aspoň jednotlivých stromov alebo vyšších kríkov, ktoré využíva ako miesto pre spev (Šťastný & Hudec 2011). Obýva napr. strelnice v bývalých vojenských priestoroch (Lešť), mladé topoľové porasty v spoločenstve *Asparago-Crataegetum* (Podunajsko, Bohuš ex Krištín 2002) a agátové lesíky (Krištín 2002a). Preferuje aj sekundárne biotopy, napr. zarastajúce výsypanky, sady, pasienky s krovinami, okraje viníc a svetlých lesov.

Hniezdnymi biotopmi **ďatľa prostredného** sú staré teplomilné dúbravy a lužné lesy s dubom, pričom najvyššie populačné hustoty dosahuje v nenarušených, prírode blízkych dubových lesoch (Pavlík 2002a). Je viazaný na vyspelé opadavé lesy s preferenciou duba (*Quercus*) a hraby (*Carpinus*). Pôvodným biotopom v centrálnej Európe sú lužné lesy a stráne porastené starými dubmi alebo bukmi (*Fagus sylvatica*). V súčasnosti obsadzuje aj otvorené staré sady

hraničiace s listnatými lesmi, tento typ biotopu má však pre druh menší význam. Obsadzuje aj bukové, zmiešané bukovo-dubové a dubové lesy v južnej a bukové lesy v severo-východnej Malej Ázií a Kaukaze (Winkler et al. 2014). Na Slovensku ďalej prostredný hniezdi v starších lesných porastoch najmä s prítomnosťou dubov, ďalej preferuje aj stromové porasty pozdĺž vodných tokov, väčšie parky a cintoríny so starými stromami. Dôležitá je prítomnosť mŕtvykh alebo odumierajúcich listnáčov (Karaska a Cichocki 2014).

Hniezdnymi biotopmi **muchárika červenohrdlého** sú zachovalé vysoké listnaté lesy, predovšetkým bukové a bukovo-jedľové porasty (SOS/BirdLife 2013). Vo svete hniezdi v lesných oblastiach, hlavne v zmiešaných opadavých lesoch, predovšetkým v bukových, menej v dubových lesoch. Na severe areálu sa vyskytuje v smrekových porastoch. Preferuje rozvoľnené vysoké stromy, s dostatkom podrastu a otvorenými zónami v lesnom zápoji. Uprednostňuje holiny, paseky a oblasti v blízkosti vody. Počas mimohniezdzneho obdobia sa vyskytuje aj v hájoch, lesných monokultúrach, okrajoch, parkoch a záhradách s vysokými stromami. Počas ľahu bol registrovaný aj v kroví, na plantážach a v záhradách, často na vysokých stromoch, ale aj vo vysokom kroví v suchej krajine a v saharských oázach (Taylor 2006a). Na Slovensku patrí muchárik červenohrdlý medzi druhy charakterizované ako indikátory zachovalosti prirodzených zmiešaných horských lesov. Obýva listnaté alebo zmiešané štrukturálne bohaté lesy vyššieho veku s dostatkom vhodných dutinových stromov. Preferuje najmä bukové lesy, ďalej hrabovo-bukové lesy, jedľo-bučiny a vyššie položené smrekovo-jedľovo-bukové porasty (Karaska a Cichocki 2014).

Hniezdnymi biotopmi **muchárika bielokrkého** sú najmä listnaté, dubové a bukové lesy, menej zmiešané porasty, parky, staré sady s dostatkom dutín alebo búdok (SOS/BirdLife 2013). Vo svete obýva biotopy podobného charakteru. Uprednostňuje presvetlené lesy, lesné okraje, lužné lesy, otvorenú krajinu s roztrúsenými stromami, ako aj staré parky a aleje. Sekundárne sa vyskytuje aj v záhradách a sadoch. Vyžaduje staré stromy s dostatkom dutín, vysoko nad zemou. Preferuje opadavé listnaté lesy, vyskytuje sa v dubových, bukových, lipových a brezových lesoch. Na severe areálu je tiež v dubových a jaseňových lesoch s hustým podrastom liesky a hlohu. V Rusku hniezdi v hrabových lesoch, občas sa vyskytuje aj v borovicových porastoch. V porovnaní s muchárikom čiernohlavým (*Ficedula hypoleuca*) obsadzuje teplé kontinentálnejšie prostredie (Taylor 2006b). Na Slovensku hniezdi muchárik bielokrký v listnatých, menej zmiešaných lesoch s vyšším zastúpením listnatých stromov. Obýva staré pralesovité a prírode blízke porasty, napr. lužné lesy, bučiny, bukovo-jedľové a bukovo-smrekové porasty s dostatkom vhodných dutín na hniezdenie. Extrémne vysoké denzity dosahuje druh napr. v riedkych dubových lesoch so slabým podrastom a s dutinami (napr. pohorie Tríbeč). Hniezdi aj v prostredí mestských parkov a záhrad (napr. Zvolen) (Krištín a Kropil 2002).

Hniezdnymi biotopmi **strakoša červenochrbtého** sú otvorené oblasti, extenzívne obhospodarované suchšie trávnaté plochy s roztrúsenými krovinami, opustené poľnohospodárske pozemky, lesné okraje, záhrady, parky, sady a vojenské výcvikové priestory (SOS/BirdLife 2013). Vo svete vyžaduje slnečnú, suchú a teplú krajinu, zvyčajne s mierne svahovitým povrchom, s roztrúsenými drevinami, kríkmi a nízkymi stromami (1–3 m). Dôležitým komponentom potravného biotopu je nízka vegetácia, príp. obnažená pôda a dostaok konárov, ktoré slúžia ako vyhliadkové body k lovu (napr. konáre solitérnych stromov, krovín, stípov, línií elektrického vedenia a ploty). V poľnohospodárskej krajinе obýva opustené zarastajúce oblasti, zarastené sady a záhrady, živé ploty a kroviny pozdĺž ciest a železníc. Častý je aj v oblastiach so stepným charakterom, napr. vo vojenských priestoroch alebo spálených lesoch, ale aj na lesných čistinách a smrekových plantážach. V západnej Európe sa vyskytuje na extenzívnych pasienkoch, napr. v kopcovitých oblastiach alebo v stredných nadmorských výškach. Veľmi často loví v blízkosti poľných ciest, kde je ľahko dostupná potrava (napr. pravidelne kosené okraje ciest alebo holá pôda) a vyskytuje sa tu dostaok vyhliadkových bodov (stípy plotov, roztrúsené kroviny a nepokosená vegetácia ako útočisko pre korisť). Vyhýba sa veľmi suchým oblastiam, zriedkavý je aj v horských regiónoch. V zimoviskách v južných častiach Afriky obýva podobné biotopy, akými sú hniezdne biotopy

(Yosef et al. 2012). Na Slovensku obýva strakoš červenochrbtý predovšetkým otvorenú poľnohospodársku krajinu s bohatou rozptýlenou zeleňou, najmä s krovinami. Preferuje lúky a pasienky s trnítými kríkmi (hloh, ruža šípová, trnka) v nižších a stredných polohách. Menej početný je na okrajoch lesov v intenzívne obrábanej krajine bez rozptýlenej zelene. Prechodne obýva aj väčšie rúbane v ranných štádiach zarastania. Menej hniezdi na okrajoch intravilánov, najmä v tichších oblastiach. Vyhýba sa súvislým zalesneným oblastiam, silne urbanizovaným územiam a polohám nad hornou hranicou lesa (Karaska a Cichocki 2014).

Hniezdnymi biotopmi **strakoša sivého** sú oblasti v pahorkatinovej a podhorskej krajine s dostatkom rozptýlenej zelene, často v blízkosti rašelinísk a vlhkých lúk (SOS/BirdLife 2013). Vo svete hniezdi v otvorenej krajine so solitérnymi stromami, kríkmi, so stípmi a líniemi elektrického vedenia. Severné populácie obývajú čistiny a lesné okraje v tajge alebo v prechodnej zóne medzi tajgou a tundrou. Niekoľko sa vyskytuje aj v močaristej krajine a v okolí rašelinísk. Dôležitým komponentom potravného biotopu je nízka vegetácia a množstvo konárov, ktoré slúžia ako vyhliadkové body k lovovi (napr. konáre solitérnych stromov, krovín, stípov, línií elektrického vedenia a ploty) (Yosef et al. 2008). Na Slovensku obýva strakoš sivý predovšetkým otvorenú poľnohospodársku krajinu s prevahou mokrých lúk a pasienkov s bohatou rozptýlenou zeleňou. Preferuje lúky a pasienky so skupinkami smrekov v blízkosti rašelinísk a močiarov. Menej početný je na okrajoch lesov v intenzívne obrábanej krajine na suchších lúkach. Prechodne obýva aj väčšie rúbane v ranných štádiach zarastania. Menej hniezdi aj na okrajoch intravilánov, najmä v tichších oblastiach. Vyhýba sa súvislým zalesneným oblastiam, silne urbanizovaným územiam a polohám nad hornou hranicou lesa (Karaska a Cichocki 2014).

Pôvodnými biotopmi **prepelice polnej** sú stepi a lesostepi. V súčasnosti sú hniezdnymi biotopmi druhu najmä oblasti v otvorenej poľnohospodárskej krajine, napr. obilné polia, krmoviny, menej okopaniny, lúky a pasienky (Demko 2002). Vo svete obýva najmä otvorenú kultúrnu krajinu, roviny alebo miesta s mierne zvlneným povrhom. Podmienkou hniezdenia je prítomnosť hustej vegetácie, ktorá však nie je vyššia ako 1 m. V severo-východnej Tanzánií sa vyskytuje aj v menej narušených pasienkoch. Vyhýba sa holej pôde (McGowan et al. 2013). V podmienkach Slovenska hniezdi prepelica polná najmä v agrocenózach. Vyskytuje sa napr. v obilných a repkových poliach, kde obvzlášť preferuje miesta s podrastom tráv, burín alebo krmovín. Najpočetnejšia je na lúkach, ktorími vystupuje až do horských polôh (napr. Hruštínska hoľa, cca 1100 m n. m., Kubínska hoľa, cca 1300 m n. m.). Zriedkavejšie ju možno zastihnúť aj v suchších častiach slatiných rašelinísk, vo väčších ruderáloch. Uprednostňuje otvorenejšiu krajinu, menším plochám v lesoch sa vydá, bola však zastihnutá aj na rozľahlejších rúbaniach v rannom štádiu zarastania. Ďalej obsadzuje aj zaplavované a suché lúky, neobrábané trávnaté plochy (úhory), okraje mokradí a letiská. Počas migrácie sa vyskytuje aj v mestách; často ju možno počuť ozývať sa zo striech domov (Demko 2002; Hudec a Šťastný 2005; Karaska a Cichocki 2014).

Hniezdnymi biotopmi **krutihlava hnedého** sú staré rozvoľnené listnaté lesy a okraje lesných porastov, porasty rozptýlenej stromovitej vegetácie v otvorenej krajine, brehové porasty, poľné lesíky, väčšie sady a háje (Pavlík 2002b). Vo svete obýva biotopy podobného charakteru. Vyskytuje sa od rozvoľnených lesov, čistín, lesov s nízkym podrastom po krovité a opustené pasienky s roztrúsenými stromami. Obýva najmä slnečné a suché oblasti, vydá sa mokrnej vegetácii a vyšším pohoriam. Hniezdi aj v rozvoľnených brehových porastoch, v presvetlenejších častiach hustejších zmiešaných alebo opadavých lesov a v lesných okrajoch. Obýva aj mladiny, aleje, plantáže, sady a väčšie záhrady. Lokálne sa vyskytuje aj v čistých porastoch borovice alebo smrekovca. Mimo obdobia hniezdenia obýva aj rozvoľnené suché lesy, krovité pasienky a záhrady. V južnej Ázii je typický v krovinách, húštinách a v poľnohospodárskej krajine. V južnej Európe prežíva často v pobrežných mokradiach a v macchiách (Winkler et al. 2015). Na Slovensku hniezdi krutihlav hnedý v otvorenej krajine so skupinami stromov, lesíkmi a alejami, v nie príliš hustých listnatých a zmiešaných lesoch, ojedinele v borovicových a smrekovo-borovicových lesoch. Podmienkou hniezdného výskytu

je dostatok stromových dutín a prítomnosť plôch bez vegetácie alebo s nízkou trávnatou vegetáciou a s dostatkom mravenísk (Pavlík 2002b, Hudec a Šťastný 2005).

Hniezdnymi biotopmi **pŕhlaviara čiernohlavého** sú suchšie travinné porasty, často s podielom voľných plôch alebo riedkou vegetáciou a s rozptýlenými krovinami. Ďalej hniezdi aj v rôznych typoch sekundárnych biotopov (ruderálne plochy, strelnice, skládky, tankodromy) (Šťastný a Hudec 2011). Vo svete obýva podobné oblasti v otvorenej krajine. V Európe preferuje otvorenú krajinu s rôznou výškou krovín alebo umelé biotopy, akými sú kamenné múry, ploty a vedenia. Častý je aj v oblastiach so zvlneným terénom a bylinným porastom rôznej výšky (vysokohorské planiny, vresoviská, zatrávnené časti pohorí, suché roviny, krovité pasienky, vždyzelené kroviny) (Collar 2015). Podobné biotopy obýva druh aj na Slovensku. Jeho typickým prostredím je trávnatá bezlesá krajina s rozptýlenou drevinnou vegetáciou a s vysokými bylinami. Obvykle sa vyskytuje na suchých teplých, na juh orientovaných stanovištiach; napr. železničné násypy, skládky odpadov, väčšie staveniská s riedkou vegetáciou často s obnaženou pôdou, zaburinené areály poľnohospodárskych družstiev, ruderálizované stanovištia s vysokými bylinami, často býva aj v priekopách pozdĺž ciest, v medzihrádzových priestoroch a nivách riek. Ojedinele sa vyskytuje aj na okrajoch rašelinísk a zamokrených lúkach s vysokými bylinami (Krištín 2002b, Karaska a Cichocki 2014).

Hniezdnymi biotopmi **hrdličky poľnej** sú oblasti v otvorenej krajine s dostatkom rozptýlenej zelene, napr. vetrolamy, poľné lesíky, ale aj fragmenty lesov, ich okraje a brehové porasty (Krištín 2002c). Vo svete obýva širokú škálu lesných biotopov, stepnú krajinu a polopúšte. Vyhýba sa súvislým lesom. Preferuje lesné okraje, rozvoľnené lesy a vresoviská so skupinkami stromov. Vyhýba sa vaterným a vlhkým regiónom. Uprednostňuje suché, slnečné oblasti. Nevyskytuje sa v horách. Napriek tomu, že toleruje ľudskú prítomnosť, hniezda si nestavia v blízkosti miest a obcí. Častá je aj v lesoch s dubom cezmínovým (*Quercus ilex*), korkovým (*Q. suber*), v oblastiach s porastom borievok, v tufových lesoch v poľnohospodárskej krajine, tiež v olivových hájoch a ďatlových oázach. V zimoviskách v Afrike obýva akácia savany a savany s porastami rodu *Combretum* (Baptista et al. 2015). Na Slovensku hniezdi v oblastiach so striedajúcimi sa lesíkmi, hájmi, solitérnymi stromami a krami v poliach, lúkach, často v blízkosti vody. Obýva rôznoveké svetlé lesy, najmä ich okraje, poľné lesíky, krovinaté húštiny a opustené záhrady. Potravné biotopy zahŕňajú voľné priestranstvá v bezprostrednom okolí, kde zbiera najmä semená kultúrnych rastlín a burín (Hudec a Šťastný 2005).

Hniezdnymi biotopmi **žltouchvosta lesného** sú staré riedke lesné porasty, intravilány obcí a miest s vysokou stromovou vegetáciou; napr. záhrady, parky, sady a cintoríny (SOS/BirdLife 2013). Vo svete obýva biotopy podobného charakteru. Preferuje riedke presvetlené lesy, vrátane starých parkov a parkových záhrad, lesných čistín a ich okrajov, s nízkym krovinným a bylinným podrastom. V severnej Európe obýva subarktické horské brezové porasty a borovicové lesy. V strednej a južnej Európe hniezdi v listnatých lesoch, avšak obýva aj prechodné biotopy, akými sú vresoviská, oblasti s roztrúsenými staršími stromami a hlavovými vŕbami pozdĺž potokov a priekop. Ďalej sa vyskytuje aj v otvorenej kopcovitej krajine so starými kamennými mûrmi a budovami. V Rusku preferuje všeobecne listnaté a zmiešané lesy, menej borovicové porasty. V severnej Afrike hniezdi v starých dubových porastoch a ihličnatých lesoch. Zimuje v semi-aridných oblastiach, najmä v krovitých stepiach, riedkej suchej stromovej vegetácii, v akáciaových porastoch pozdĺž riek a v záhradách (Collar a Christie 2015). Na Slovensku obýva žltouchvost lesný vysokú stromovú zeleň v obciach a mestách, parky, cintoríny, ale aj samoty so solitérmi, kalamitiská s jednotlivými stromami, rôzne staré riedke lesy, ako sú rašeliniskové borové lesy Oravskej kotliny, či staré smrečiny na hornej hranici lesa, hájovne a samoty na lesných čistinách (Karaska a Cichocki 2014). Vo vyšších pohoriach obsadzuje najmä hrebeňové partie pohorí s polámanými a vyschnutými listnatými stromami. Najvyššie hustoty dosahuje v presvetlených porastoch, kde podrast chýba alebo je len minimálny. V nižších polohách takéto podmienky spĺňajú napr. lužné lesy, optimálne so zachovalým vodným režimom, ktorý bráni rastu vysokého podrastu vegetácie (napr. žihľavy),

ďalej dubové prírodné lesy bez podrastu (napr. pohorie Tríbeč) a rozvoľnené borovicové lesy s prímesou duba alebo agátu v Záhorskej nížine (napr. vojenské priestory) (Kropil 2002b).

Hniezdnymi biotopmi **muchára sivého** sú listnaté a parkové porasty, osobitne ich okraje, aleje, záhrady a sady (SOS/BirdLife 2013). Vo svete obýva všetky typy riedkych lesných porastov alebo zalesnené oblasti s vyvýšenými miestami (konáre), ktoré poskytujú výhľad. Hniezdne biotopy zahŕňajú rôzne typy rozvoľnených presvetlených porastov, od starších stromov po mladiny až kroviny. Dobre sa prispôsobil aj urbanizovanej krajine, kde obsadzuje záhrady, parky, sady a iné človekom vytvorené prostredie. Obýva listnaté aj ihličnaté porasty, vyskytuje sa tiež v lesných okrajoch, čistinách, spálených porastoch, brehových porastoch pozdĺž potokov, riek a v okolí stojatých vód. V afrických zimoviských sa vyskytuje v podobných biotopoch, napr. v opadavých alebo vzdyzelených listnatých lesoch, vrátane porastov miombo, mapane a akáciových saván. Rovnako častý je aj v sekundárnych biotopoch, akými sú zarastajúce pasienky, plantáže, sady, záhrady, parky a tŕnisté kroviny (Taylor 2006c). Na Slovensku hniezdi muchár sivý vo všetkých typoch lesov, s preferenciou redších listnatých, prípadne zmiešaných porastov. Obýva aj parkovitú krajinu so starými stromami a s dutinami, napr. brehové porasty a vysokú zeleň v intravilánoch (cintoríny, parky). Vyhýba sa nelesnej krajine a horským polohám nad hornou hranicou lesa. Vzácny je v horských smrečinách (Karaska a Cichocki 2014).

Hniezdnymi biotopmi **tetrova hlucháňa** sú staré prirodzené horské smrekové i zmiešané lesy. Biotopy sa vyznačujú nižšou zapojenosťou porastu, nie príliš hustým podrastom a pestrou druhovou skladbou vegetačného krytu s bobuľonosnými kríkmi (SOS/BirdLife 2013). V Európe a Ázii obýva najmä ihličnaté borovicové lesy, ďalej aj smrekové, jedľové porasty a zmiešané lesy. V niektorých častiach svojho areálu obýva aj izolované listnaté lesy, napr. pohorie Cantabria v severnom Španielsku a na juhu Uralu. Preferuje rozsiahle oblasti starých lesov, často s vlhkou pôdou a striedajúcimi sa mokraďami, rašeliniskami, vresoviskami (*Vaccinium*, *Calluna*) a čistinami. V Nórsku uprednostňuje staré lesné porasty s výrazným podielom čučoriedok (*Vaccinium myrtillus*). Počas zimy sa vyskytuje aj v menej zapojených lesoch (najmä v severných oblastiach), zatiaľ čo v lete (najmä počas hniezdenia) obýva hustejšie porasty s podielom bobuľonosných drevín (de Juana a Kirwan 2012). Na Slovensku sú *hniezdnym prostredím tetrova hlucháňa* staré riedke zmiešané a ihličnaté lesy nad 800–900 m n.m. s podrastom čučoriedok. Obýva aj zarastajúce okraje horských holí a hornú hranicu lesa (Karaska a Cichocki 2014).

### 1.6.2. Stručný popis predmetu ochrany

Účelom CHVÚ Strážovské vrchy je zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu a zabezpečenie ich prežitia a rozmnožovania. CHVÚ je jedným z najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov: sokol sťahovavý (*Falco peregrinus*), výr skalný (*Bubo bubo*) a žlna sivá (*Picus canus*). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % národnej populácie druhov orol skalný (*Aquila chrysaetos*), bocian čierny (*Ciconia nigra*), včelár lesný (*Pernis apivorus*), kuvik kapcavý (*Aegolius funereus*), lelek lesný (*Caprimulgus europaeus*), chriašteľ poľný (*Crex crex*), ďateľ čierny (*Dryocopus martius*), ďateľ bielochrbtý (*Dendrocopos leucotos*), jariabok hôrny (*Bonasa bonasia*), penica jarabá (*Sylvia nisoria*), ďateľ prostredný (*Dendrocopos medius*), muchárik červenohrdlý (*Ficedula parva*), muchárik bielokrký (*Ficedula albicollis*), strakoš červenochrbtý (*Lanius collurio*), strakoš sivý (*Lanius excubitor*), prepelica poľná (*Coturnix coturnix*), krutihlav hnedý (*Jynx torquilla*), príhaviar čiernohlavý (*Saxicola torquata*), hrdlička poľná (*Streptopelia turtur*), žltouchost lesný (*Phoenicurus phoenicurus*), muchár sivý (*Muscicapa striata*) a tetrov hlucháň (*Tetrao urogallus*). Údaje sú z obdobia vypracovania vedeckého návrhu a vyhlásenia územia.

V čase vymedzovania sústavy CHVÚ na Slovensku bolo CHVÚ Strážovské vrchy na Slovensku najvýznamnejším územím pre hniezdenie sokola sťahovavého, výra skalného a žlny sivej. V CHVÚ Strážovské vrchy bola v tom čase zistená v rámci sústavy CHVÚ najvyššia početnosť sokola sťahovavého na Slovensku. CHVÚ Strážovské vrchy je pre druh

sokol sťahovavý ako predmet ochrany najvýznamnejšie chránené vtáchie územie na Slovensku.

### **1.6.3. Hodnotenie stavu predmetu ochrany, stanovenie priorít ochrany**

Pri zhodnotení stavu predmetov ochrany sa vychádzalo z hodnotenia priaznivého stavu druhov, ktoré sú predmetmi ochrany v jednotlivých CHVÚ na základe **dát z monitoringu z r. 2010-2012**. Pre potreby hodnotenia stavu druhu je potrebné zohľadniť nielen stav jeho populácie, ale aj jeho biotopov a ohrození. Preto sa pri hodnotení kritériá populácie, biotopov a ohrození uvádzajú v programe starostlivosti v celom rozsahu. Pre zhodnotenie napĺňania programu starostlivosti bude potrebné merať zmeny stavu druhov tými istými kritériami, akými bol hodnotený ich stav v r. 2010-2012. Len takto sa zabezpečí porovnatelné vyhodnotenie stavu pri neskoršom hodnotení. Z tohto dôvodu je nižšie uvedená pre každý predmet ochrany celá tabuľka hodnotenia stavu (v kapitole 1.6.3.1).

Stručné celkové zhodnotenie stavu predmetov ochrany je uvedené v kapitole 1.6.3.2., stanovenie cieľových stavov druhov je uvedené v kapitole 1.6.3.3. a osobitných záujmov u dotknutých druhov je v kapitole 1.6.3.4.

#### 1.6.3.1. Súčasný stav druhov

##### *1.6.3.1.1. Definovanie stavu druhu sokol sťahovavý v CHVÚ Strážovské vrchy*

###### **Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:**

Sokol sťahovavý je rozšírený v celom CHVÚ Strážovské vrchy na lokalitách s vhodným bralným biotopom a podmienkami pre úspešné hniezdenie. V súčasnosti **hniezdi** v CHVÚ stabilná populácia, ktorej početnosť sa odhaduje, s miernymi fluktuáciami, na **15 párov** (dáta z monitoringu). Niektoré páry striedajú hniezdne lokality pravidelne, iné menia miesto hniezdenia iba sporadicky a iné páry hniezdia trvalo na tej istej lokalite. V severnej časti CHVÚ (CHKO Strážovské vrchy) hniezdi 9 párov na 10 lokalitách (1 pár pravdepodobne strieda 2 lokality), v južnej časti CHVÚ hniezdi 6 párov a 2 hniezdne lokality sú v blízkosti CHVÚ (potravné teritóriá zasahujú do CHVÚ).

Tabuľka č. 2: Definovanie stavu druhu sokol sťahovavý

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV			NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B - priemerný	C - nepriaznivý	
populácia	1.1 Veľkosť populácie	Veľkosť populácie je viac ako 13 párov za 5 rokov.	Veľkosť populácie je 7 - 13 párov za 5 rokov.	Veľkosť populácie je menej ako 7 párov za 5 rokov.
	1.2 Populačný trend	Populácia vzrástla za 5 rokov o viac ako 10 %.	Populácia je za 5 rokov stabilná, s fluktuáciou $\pm 10\%$ .	Populácia klesla za 5 rokov o viac ako 10 %.
	1.3 Veľkosť areálu	Viac ako 75 % plochy CHVÚ.	50 - 75 % plochy CHVÚ.	Menej ako 50 % plochy CHVÚ.
	1.4 Areálový trend	Rozloha vhodných skalných útvarov pre druh v CHVÚ za posledných 5 rokov neklesla o viac ako 10 % z ich rozlohy.	Rozloha vhodných skalných útvarov pre druh v CHVÚ za posledných 5 rokov klesla o 15 - 20 % z ich rozlohy.	Rozloha vhodných skalných útvarov pre druh v CHVÚ za posledných 5 rokov klesla o viac ako 20 % z ich rozlohy.

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV			NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B - priemerný	C - nepriaznivý	
1.5 Hniezdna úspešnosť	Priemerná hniezdná úspešnosť za 5 rokov je viac ako 3,2 vyleteného mláďaťa na hniezdný párs.	Priemerná hniezdná úspešnosť za 5 rokov je 1,2 - 3,2 vyleteného mláďaťa na hniezdný párs.	Priemerná hniezdná úspešnosť za 5 rokov je pod 1,2 vyleteného mláďaťa na hniezdný párs.	
biotop	2.1 Hniezdzny biotop	75 - 100 % historických hniezd je vhodných na hniezdenie, hniezdzny párs má k dispozícii v dosahu do 2 km minimálne 3 potenciálne lokality vhodné na hniezdenie, nie je zaznamenaný výskyt veľkých kŕdľov krkavca čierneho ( <i>Corvus corax</i> ) v hniezdom období.	50 - 75 % historických hniezd je vhodných na hniezdenie, hniezdzny párs má k dispozícii v dosahu do 2 km minimálne 1 - 3 potenciálne lokality vhodné na hniezdenie, nie je zaznamenaný výskyt veľkých kŕdľov krkavca čierneho v hniezdom období, prípadne len sporadicky.	Menej ako 50 % historických hniezd je vhodných na hniezdenie, hniezdzny párs nemá k dispozícii v dosahu do 2 km potenciálne lokality vhodné na hniezdenie, zaznamenaný výskyt veľkých kŕdľov krkavca čierneho v hniezdom období.
	2.2 Potravný biotop	Menej ako 5 % potravného biotopu pretínajú línie vzdušných vysokonapäťových (VN) elektrických vedení, vzdialenosť migračných trás vtákov (potravné druhy) do 5 km, rôznorodá mozaikovitá štruktúra biotopov, dostatok stromovej a krovinovej vegetácie v krajinе, minimálne 50 % hniezd je vo vzdialnosti menej ako 3 km od urbánnych sídiel.	5 - 25 % potravného biotopu pretínajú línie vzdušných VN elektrických vedení, vzdialenosť migračných trás vtákov (potravné druhy) 5 - 10 km, stredne rôznorodá štruktúra biotopov, mierny nedostatok stromovej a krovinovej vegetácie v krajinе, minimálne 50 % hniezd je vo vzdialosti 3 - 10 km od urbánnych sídiel.	Viac ako 25 % potravného biotopu pretínajú línie vzdušných VN elektrických vedení, vzdialenosť migračných trás vtákov (potravné druhy) nad 10 km, monotoná štruktúra biotopov, nedostatok stromovej a krovinovej vegetácie v krajinе, minimálne 50 % hniezd je vo vzdialosti viac ako 10 km od urbánnych sídiel.
	2.3 Biotopy počas zimovania	Viac ako 10 % výmery TTP obsahuje rozptýlenú krovinovú a stromovú vegetáciu so zastúpením druhov, ktoré poskytujú v zimnom období trofickú bázu pre spevavce (ruža sp./ <i>Rosa</i> sp., hloh sp./ <i>Crataegus</i> sp., baza čierna/ <i>Sambucus nigra</i> , trnka obyčajná/ <i>Prunus spinosa</i> ).	menej ako 10 % výmery TTP obsahuje rozptýlenú krovinovú a stromovú vegetáciu so zastúpením druhov, ktoré poskytujú v zimnom období trofickú bázu pre spevavce (ruža sp./ <i>Rosa</i> sp., hloh sp./ <i>Crataegus</i> sp., baza čierna/ <i>Sambucus nigra</i> , trnka obyčajná/ <i>Prunus spinosa</i> ).	TTP neobsahujú rozptýlenú krovinovú a stromovú vegetáciu so zastúpením druhov, ktoré poskytujú v zimnom období trofickú bázu pre spevavce (ruža sp./ <i>Rosa</i> sp., hloh sp./ <i>Crataegus</i> sp., baza čierna/ <i>Sambucus nigra</i> , trnka obyčajná/ <i>Prunus spinosa</i> ).
ohrozenia	3.1 Priame ohrozenie druhu (prenasledovanie, vyrušovanie)	Viac ako 95 % hniezdných lokalít bez vyrušovania ohrozujúceho inkubáciu a výchovu mláďat, do 300 m od hniezda nie sú skalolezecké trasy, do 500	75 - 95 % hniezdných lokalít bez vyrušovania ohrozujúceho inkubáciu a výchovu mláďat, do 200 m od hniezda nie sú skalolezecké trasy, do 400	Menej ako 75 % hniezdných lokalít bez vyrušovania ohrozujúceho inkubáciu a výchovu mláďat, do 100 m od hniezda nie sú skalolezecké

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B - priemerný	C - nepriaznivý
	m od hniezda je skalolezecká činnosť vykonávaná len mimo hniezdnej sezóny, za 5 rokov neboli zaznamenané žiadne prípady priameho prenasledovania človekom (vyberanie mláďat alebo vajec, odstrel, trávenie), viac ako 25 % hniezd v rámci celého CHVÚ je strážených fyzicky alebo kamerovými systémami.	m od hniezda je skalolezecká činnosť vykonávaná len mimo hniezdnej sezóny, za 5 rokov boli zaznamenané maximálne 2 prípady priameho prenasledovania človekom (vyberanie mláďat alebo vajec, odstrel, trávenie), 25 % hniezd v rámci celého CHVÚ je strážených fyzicky alebo kamerovými systémami.	trasy, za 5 rokov boli zaznamenané viac ako 3 prípady priameho prenasledovania človekom (vyberanie mláďat alebo vajec, odstrel, trávenie), menej ako 25 % hniezd v rámci celého CHVÚ je strážených fyzicky alebo kamerovými systémami.
3.2 Deštrukcia hniezdných biotopov	Menej ako 10 % hniezdných bráľ sukcesne zarastených drevinami alebo výrazne zvetralých.	10 - 25 % hniezdných bráľ sukcesne zarastených drevinami alebo výrazne zvetralých.	Viac ako 25 % hniezdných bráľ sukcesne zarastených drevinami alebo výrazne zvetralých.
3.3 Deštrukcia potravného biotopu	Viac ako 90 % všetkých stĺpov 22 kV vzdušného elektrického vedenia v CHVÚ je zabezpečených zábranami, línie VN pretínajú menej ako 5 % územia, územie bez používania insekticídov a chemických látok na likvidáciu teplokrvných živočíchov za 5 rokov, viac ako 10 % plochy TTP tvorí rozptýlená krovinná a stromová vegetácia.	75 - 90 % všetkých stĺpov 22 kV vzdušného elektrického vedenia v CHVÚ je zabezpečených zábranami, línie VN pretínajú 5 - 25 % územia, sporadické používanie insekticídov a chemických látok na likvidáciu teplokrvných živočíchov za 5 rokov, menej ako 10 % plochy TTP tvorí rozptýlená krovinná a stromová vegetácia.	Menej ako 75 % všetkých stĺpov 22 kV vzdušného elektrického vedenia v CHVÚ je zabezpečených zábranami, línie VN pretínajú viac ako 25 % územia, prítomnosť veterálnych elektrární v území, intenzívne používanie insekticídov a chemických látok na likvidáciu teplokrvných živočíchov za 5 rokov, plochy TTP netvorí rozptýlená krovinná a stromová vegetácia.

Tabuľka č. 3: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu sokol stňahovavý

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	3	3	9
	1.2. Populačný trend	3	2	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
	1.4. Areálový trend	3	2	6
	1.5. Hniezdna úspešnosť	2	2	4
B	2.1. Hniezdný biotop	2	2	4
	2.2. Potravný biotop	3	2	6
	2.3. Biotopy počas zimovania	2	2	4
O	3.1. Priame ohrozenie druhu	3	2	6
	3.2. Deštrukcia hniezdných biotopov	2	2	4

3.3. Deštrukcia potravného biotopu	3	1	3
<b>Dosiahnutá hodnota spolu:</b>			<b>56</b>
Maximálna možná hodnota ( $\Sigma$ váh $\times$ 3):			66

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 - 3.

Tabuľka č. 4: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu sokol stáhovavý

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
85 %		

### Zhodnotenie

Populácia sokola stáhovavého v CHVÚ Strážovské vrchy je stabilná s rastúcou tendenciou. Prvý pár začal hniezdiť v Strážovských vrchoch v r. 1998, a postupne populácia rástla. Potenciál biotopov na zahniezdenie druhu je vysoký. Limitujúcimi faktormi sú vykrádanie hniezd, predácia (napr. *B. bubo*, *V. vulpes*), klimatické faktory a vyrušovanie počas hniezdenia. Priemerná hniezdna produktivita za obdobie projektu bola od 0,8 do 1,53 mláďat na hniezdný pár.

#### 1.6.3.1.2. Definovanie stavu druhu výr skalný v CHVÚ Strážovské vrchy

##### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

Výr skalný je rozšírený v celom CHVÚ Strážovské vrchy na lokalitách s vhodným hniezdnym a lovným biotopom a podmienkami pre úspešné hniezdenie. Vzhľadom na trvalú väzbu na hniezda sú dlhodobo využívané historické hniezdne lokality, pričom absolútnej väčšine párov preferuje hniezdenie v rámci skalných útvarov a stien v oblastiach s bezprostrednou nadväznosťou na poľnohospodársku krajinu. Najvýznamnejšimi lokalitami výskytu výra sú najmä Súľovské skaly a širšia oblasť Manínov, výskyt bol zaznamenaný aj v centrálnej a južnej časti Strážovských vrchov. V súčasnosti je populácia stabilná. Početnosť druhu v CHVÚ Strážovské vrchy sa v súčasnosti odhaduje na **15 – 20 hniezdných párov** (dáta z monitoringu).

Tabuľka č. 5: Definovanie stavu druhu výr skalný

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV	
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
populácia	1.1. Veľkosť populácie	Veľkosť populácie je viac ako 18 párov za posledných 5 rokov.	Veľkosť populácie je 6 - 18 párov za posledných 5 rokov.	Veľkosť populácie je menej ako 6 párov za posledných 5 rokov.
	1.2. Lokálna populačná hustota	Populačná hustota je viac ako 3 páry/100 km <sup>2</sup> za posledných 5 rokov.	Populačná hustota je 1 - 3 páry/100 km <sup>2</sup> za posledných 5 rokov.	Populačná hustota je menej ako 1 pár/100 km <sup>2</sup> za posledných 5 rokov.
	1.3. Populačný trend	Populácia vzrástla za 5 rokov o viac ako 10 %.	Populácia je za 5 rokov stabilná, s fluktuáciou $\pm 10 \%$ .	Populácia klesla za 5 rokov o viac ako 10 %.
	1.4. Areálový trend	Dostupnosť vhodných skalných útvarov narástla za 5 rokov o viac 5 %.	Dostupnosť vhodných skalných útvarov je za 5 rokov stabilizovaná (tolerancia $\pm 5 \%$ ).	Dostupnosť vhodných skalných útvarov poklesla za 5 rokov o viac ako 5 %.

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV	
	A – dobrý	B – priemerný		
<b>biotop</b>	2.1. Hniezdný biotop	Viac ako 75 % historických hniezd a vhodných skalných útvarov je vhodných na hniezdenie, bez ohrozenia sukcesiou a vyrušovania ľudskými aktivitami.	50 - 75 % historických hniezd a vhodných skalných útvarov je vhodných na hniezdenie, bez ohrozenia sukcesiou a vyrušovania ľudskými aktivitami.	Menej ako 50 % historických hniezd a vhodných skalných útvarov je vhodných na hniezdenie, bez ohrozenia sukcesiou a vyrušovania ľudskými aktivitami.
	2.2. Potravný biotop	V poľnohospodárskej krajine zaberajú TTP viac ako 90 % z celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ.	V poľnohospodárskej krajine zaberajú trvalé trávne porasty 50 - 90 % z celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ.	V poľnohospodárskej krajine zaberajú trvalé trávne porasty menej ako 50 % z celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ.
	2.3. Zimoviská			
<b>ohrozenia</b>	3.1. Vyrušovanie na hniezdiskách	Viac ako 75 % hniezd za 5 rokov bez rušenia športovo - rekreačnými (skalolezectvo, turistika) a lesohospodárskymi aktivitami, za 5 rokov nezaznamenané žiadne prípady priameho prenasledovania človekom (vyberanie hniezd, odstrel).	50 - 75 % hniezd za 5 rokov bez rušenia športovo - rekreačnými (skalolezectvo, turistika) a lesohospodárskymi aktivitami, za 5 rokov zaznamenané 2 prípady priameho prenasledovania človekom (vyberanie hniezd, odstrel).	Menej ako 50 % hniezd za 5 rokov bez rušenia športovo - rekreačnými (skalolezectvo, turistika) a lesohospodárskymi aktivitami, za 5 rokov zaznamenané 3 prípady priameho prenasledovania človekom (vyberanie hniezd, odstrel).
	3.2. Stupeň ohrozenia hniezdisk	Menej ako 10 % hniezdných brálov je sukcesne zarastených drevinami alebo bez iných vhodných hniezdných možností za 5 rokov.	10 - 25 % hniezdných brálov je sukcesne zarastených drevinami alebo bez iných vhodných hniezdných možností za 5 rokov.	Viac ako 25 % hniezdných brálov je sukcesne zarastených drevinami alebo bez iných vhodných hniezdných možností za 5 rokov.
	3.3. Stupeň ohrozenia potravného biotopu	Výmera TTP je viac ako 90 % z celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ, pokles výmery TTP za 5 rokov je menej ako 5 %, vylúčené používanie insekticídov a chemických látok na likvidáciu teplokrvných živočíchov.	Výmera TTP je 70 - 90 % z celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ, pokles výmery TTP za 5 rokov je 5 - 10 %, obmedzené používanie insekticídov a chemických látok na likvidáciu teplokrvných živočíchov.	Výmera TTP je maximálne 70 % z celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ, pokles výmery TTP za 5 rokov je viac ako 10 %, intenzívne používanie insekticídov a chemických látok na likvidáciu teplokrvných živočíchov.
	3.4. Stupeň ohrozenia nadzemnej sieťou vedení	Minimálne 75 % všetkých stĺpov 22 kV vzdušného elektrického vedenia v CHVÚ je chránených proti zraneniam a úhynom vtákov hrebeňovými zábranami.	50 - 75 % všetkých stĺpov 22 kV vzdušného elektrického vedenia v CHVÚ je chránených proti zraneniam a úhynom vtákov hrebeňovými zábranami.	Pod 50 % všetkých stĺpov 22 kV vzdušného elektrického vedenia v CHVÚ je chránených proti zraneniam a úhynom vtákov hrebeňovými zábranami.

Tabuľka č. 6: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu výr skalný

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	3	3	9
	1.2. Lokálna populačná hustota	3	2	6
	1.3. Populačný trend	2	1	2
	1.4. Areálový trend	2	2	4
B	2.1. Hniezdný biotop	3	2	6
	2.2. Potravný biotop	2	2	4
	2.3. Zimoviská	2	2	4
	3.1. Vyrušovanie na hniezdiskách	2	3	6
O	3.2. Stupeň ohrozenia hniezdisk	2	2	4
	3.3. Stupeň ohrozenia potravného biotopu	2	2	4
	3.4. Stupeň ohrozenia nadzemnou sieťou vedení	2	2	4
	<b>Dosiahnutá hodnota spolu:</b>			<b>53</b>
Maximálna možná hodnota ( $\sum$ váh $\times$ 3):				69

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 7: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu výr skalný

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
	77 %	

### Zhodnotenie

Aktuálny stav výra skalného možno vyhodnotiť ako priaznivý a stabilný. Hlavným zdrojom ohrozenia je lokalizácia väčšiny hniezd v oblastiach intenzívne športovo - rekreačne využívaných (skalolezectvo, turistika, rekreačné aktivity), z čoho vyplýva vysoká miera rušenia a významný negatívny vplyv na úspešnosť hniezdenia. Ďalšími limitujúcimi faktormi sú konštrukčne nevhodné vzdušné líniové elektrické vedenia bez ošetrenia zábranami proti nárazom a úhynom a strata hniezdneho biotopu sukcesnými procesmi v okolí vhodných hniezdných skalných útvarov (zarastanie skalných stien, zanášanie skalných políc a hniezdných kotlinky). Dôležitú negatívnu úlohu zohráva aj čoraz intenzívnejšie obhospodarование lesných porastov a jeho vplyv na úspešnosť hniezdenia druhu. Pozitívnym faktorom je pomerne dobrý pomer extenzívne a intenzívne obhospodarovanej krajiny s dostatkom remízok, ale aj tu existuje určité riziko možnosti straty extenzívne obhospodarovanej krajiny v dôsledku zalesňovania, zarastania po opustení a zastavovania územia poľnohospodárskych pozemkov.

#### 1.6.3.1.3. Definovanie stavu druhu žlna sivá v CHVÚ Strážovské vrchy

### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

Žlna sivá sa v CHVÚ Strážovské vrchy vyskytuje rovnomerne, vďaka mozaikovej štruktúre krajiny vytvorenjej striedaním sa lesných a nelesných biotopov. Nenachádzajú sa tu veľké a súvislé lesné komplexy ihličnatých lesov, v ktorých žlna sivá prirodzene absentuje. V južnej tretine CHVÚ je populáčna hustota o niečo väčšia vzhľadom na väčší podiel starých listnatých a zmiešaných lesov s dostupnými trávnatými biotopmi. V súčasnosti je populácia stabilná, aj keď rozloha a štruktúra jej topických biotopov sa, najmä vplyvom zvýšených objemov ťažby dreva, zmenšuje a možnosti hospodárskeho využívania aj ochranných lesov, kde tento druh nachádza svoje optimálne hniezdzne podmienky. Početnosť druhu v CHVÚ Strážovské vrchy sa v súčasnosti odhaduje na **100 – 130 hniezdných párov** (dáta z monitoringu).

Tabuľka č. 8: Definovanie stavu druhu žlna sivá

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV	
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
populácia	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	Populačná hustota na monitorovacích plochách je viac ako 0,5 hniezdneho páru/km <sup>2</sup> hlavných biotopov (listnaté a zmiešané lesy nad 80 rokov), resp. viac ako 20 hniezdných párov/100 km <sup>2</sup> územia s vhodným biotopom (listnaté a zmiešané lesy nad 60 rokov) za 5 rokov.	Populačná hustota na monitorovacích plochách je 0,1 - 0,5 hniezdneho páru /km <sup>2</sup> hlavných biotopov (listnaté a zmiešané lesy nad 80 rokov), resp. 5 - 20 hniezdných párov /100 km <sup>2</sup> územia s vhodným biotopom (listnaté a zmiešané lesy nad 60 rokov) za 5 rokov.	Populačná hustota na monitorovacích plochách je do 0,1 hniezdneho páru/km <sup>2</sup> hlavných biotopov (listnaté a zmiešané lesy nad 80 rokov), resp. do 5 hniezdných párov/100k m <sup>2</sup> územia s vhodným biotopom (listnaté a zmiešané lesy nad 60 rokov) za 5 rokov.
	1.2. Populačný trend	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov stúpa o viac ako 20 %.	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov je stabilná, s fluktuáciou do ±20 %.	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov klesá o viac ako 20 %.
	1.3. Veľkosť areálu	Podiel listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov je viac ako 80 % z celkovej výmery lesných pozemkov v CHVÚ.	Podiel listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov je 50 - 80 % z celkovej výmery lesných pozemkov v CHVÚ.	Podiel listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov je menej ako 50 % z celkovej výmery lesných pozemkov v CHVÚ.
	1.4. Areálový trend	Výmera listnatých lesov nad 80 rokov za posledných 5 rokov narásla o viac ako 5 %.	Výmera listnatých lesov nad 80 rokov za posledných 5 rokov je stabilizovaná (tolerancia ±5 %).	Výmera listnatých lesov nad 80 rokov za posledných 5 rokov poklesla o viac ako 5 %.
biotop	2.1. Hniezdzny biotop	Viac ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú listnaté a zmiešané lesy prevahou listnatých drevín nad 100 rokov.	Viac ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov.	Menej ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov.
	2.2. Potravný biotop	Nelesné plochy bohaté na výskyt mravenísk zaberajú viac ako 50 % z celkovej nelesnej plochy CHVÚ.	Nelesné plochy bohaté na výskyt mravenísk zaberajú 30 - 50 % z celkovej nelesnej plochy CHVÚ.	Nelesné plochy bohaté na výskyt mravenísk zaberajú menej ako 30 % z celkovej nelesnej plochy CHVÚ.
	2.3. Biotop počas zimovania	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú viac ako 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov, nelesné plochy bohaté na výskyt mravenísk zaberajú nad	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú 50 - 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov, nelesné plochy bohaté na výskyt mravenísk zaberajú 30	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú menej ako 50 % rozlohy lesov nad 80 rokov, nelesné plochy bohaté na výskyt mravenísk zaberajú menej ako 30 % z

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
<b>ohrozenia</b>	50 % z celkovej nelesnej plochy CHVÚ.	- 50 % z celkovej nelesnej plochy CHVÚ.	celkovej nelesnej plochy CHVÚ.
	3.1. Stupeň ohrozenia populácie  Podiel listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov za 5 rokov vzrástol o vyše 10 %.	Podiel listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov je za 5 rokov stabilný (tolerancia ±10 %).	Podiel listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov za 5 rokov poklesol o vyše 10 %.
	3.2. Stupeň ohrozenia biotopu  Bez veľkoplošného holorubného spôsobu obhospodarovania lesných porastov, pokles rozlohy starých listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov menej ako 5 %, pokles výmery TTP za 5 rokov je menej ako 5 %, vylúčené používanie insekticídov.	Veľkoplošné holoruby využívané na max. 10 % rozlohy lesov, pokles rozlohy starých listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov 5 - 10 %, pokles výmery TTP za 5 rokov je 5 - 10 %, obmedzené používanie insekticídov.	Veľkoplošné holoruby využívané na viac ako 10 % rozlohy lesov, pokles rozlohy starých listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov viac ako 10 %, pokles výmery TTP za 5 rokov je viac ako 10 %, intenzívne používanie insekticídov.

Tabuľka č. 9: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu žlna sivá

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
P	1.1. Populačná hustota / veľkosť populácie	3	3	9
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
	1.4. Areálový trend	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	2	4
	2.3. Biotop počas zimovania	2	1	2
O	3.3. Populácia	2	2	4
	3.4. Biotop	2	1	2
<b>Dosiahnutá hodnota spolu:</b>				<b>41</b>
Maximálna možná hodnota ( $\Sigma$ váh $\times$ 3):				57

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 10: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu žlna sivá

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
	72 %	

### Zhodnotenie

Stav druhu v CHVÚ Strážovské vrchy je hodnotený ako priaznivý – priemerný - B. Je to spôsobené najmä poklesom podielu listnatých lesov nad 80 rokov z celkovej výmery lesných pozemkov v CHVÚ. Pri bežnom obhospodarovani lesov dochádza k odstraňovaniu hrubého mŕtveho dreva a dutinových stromov počas celého roka. To má za následok úbytok vhodných

hniezdných stromov<sup>3</sup> a teda zhoršovanie stavu hniezdných biotopov. Lesnatosť na území má stúpajúci trend, nakoľko neudržiavané nelesné plochy sukcesne zarastajú a ďalšie nelesné plochy sú umelo zalesňované za účelom lesohospodárskeho využívania a tým sa zmenšuje potravný biotop druhu. Populácia tohto druhu je pritom stabilná. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa druh nachádza v priemernom stave.

#### 1.6.3.1.4. Definovanie stavu druhu orol skalný CHVÚ Strážovské vrchy

##### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa odhaduje výskyt **4 - 5 hniezdných párov** orla skalného (dáta z monitoringu), čo predstavuje približne 5 % slovenskej hniezdnej populácie druhu. Populácia orla skalného v CHVÚ je klasifikovaná ako stabilná populácia s maximálnou zmenuou  $\pm 20\%$ . Druh je pomerne rovnomerne rozptýlený po území aj vzľadom na to, že obsadzuje rozľahlé hniezdne teritóriá. Potravné teritórium jedného páru je veľké a v závislosti na dostupnosti potravy a charaktere krajiny dosahuje aj okolo 100 km<sup>2</sup>. Orol skalný v CHVÚ Strážovské vrchy hniezdi v podhorských a horských oblastiach spravidla od nadmorskej výšky 450 m n. m. Obýva zvyčajne väčšie lesné komplexy, v ktorých vyhľadáva málo antropicky vyrušované staršie lesné porasty nedaleko lovísk, ktoré tvorí otvorená poľnohospodárska krajina, zastúpená pasienkami a extenzívne využívanými lúkami. Ako hniezdič v Strážovských vrchoch preferuje stromové hniezda. Hniezdo býva umiestnené na starších stromoch (smrek, jedľa) v starších porastoch. Hniezdiská sú dlhodobo stabilné. Orly však môžu nepravidelne hniezda meniť aj vyše 1 km od seba v závislosti od podmienok na začiatku hniezdenia (napr. stav hniezdnego porastu, vyrušovanie človekom a pod.). Hniezdiskami môžu byť (podľa skúseností v iných územiach) tiež skalné útvary a komplexy, kde nachádza vhodné miesta pre stavbu hniezd bez vyrušovania človekom.

Tabuľka č. 11: Definovanie stavu druhu orol skalný

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
populácia	1.1. Veľkosť populácie	V CHVÚ hniezdi minimálne 5 párov.	V CHVÚ hniezdi 2 - 5 párov.
	1.2. Populačný trend	Populácia za 5 rokov stúpla o viac ako 2 páry.	Populácia je za 5 rokov stabilná ( $\pm 1$ páry).
	1.3. Veľkosť areálu	Územia nevhodné pre druh (urbanizované priestory) nezaberajú viac ako 5 % celkovej výmery CHVÚ.	Územia nevhodné pre druh (urbanizované priestory) nezaberajú viac ako 5 - 10 % celkovej výmery CHVÚ.
	1.4. Areálový trend	Rozloha urbanizovaných plôch v CHVÚ za 5 rokov nestúpla o viac ako 10 % z ich rozlohy.	Rozloha urbanizovaných plôch v CHVÚ za 5 rokov stúpla o 10 - 20 % z ich rozlohy.
biotop	2.1. Hniezdný biotop	Výmera lesných porastov nad 80 rokov je minimálne 20 % z celkovej výmery lesa v CHVÚ a ich rozmiestnenie je v území mozaikovité.	Výmera lesných porastov nad 80 rokov je 10 - 20 % z celkovej výmery lesa v CHVÚ a ich rozmiestnenie je v území nerovnomerné.
			Výmera lesných porastov nad 80 rokov je pod 10 % z celkovej výmery lesa v CHVÚ a ich rozmiestnenie je v území sústredené na 1 – 2 lokality.

<sup>3</sup> Hniezdný strom je drevina, na ktorej dochádza k hniezdeniu chráneného vtáčieho druhu. To môže byť jednak v korune stromu, ale aj v dutine. Podľa nárokov jednotlivých druhov ide o postavenie hniezda chráneným vtáčim druhom, alebo využitie hniezda či dutiny iného (i nechráneného) druhu chráneným vtáčim druhom, či o hniezdo vybudované človekom (napr. bûdka, umelé hniezdo).

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV			NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
<b>ohrozenia</b>	2.2. Potravný biotop	V poľnohospodárskej krajine zaberajú TTP vyše 90 % z celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ.	V poľnohospodárskej krajine zaberajú TTP 50 - 90 % z celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ.	V poľnohospodárskej krajine zaberajú TTP pod 50 % z celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ.
	2.3. Biotopy počas zimovania	V poľnohospodárskej krajine zaberajú TTP vyše 90 % z celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ.	V poľnohospodárskej krajine zaberajú TTP 50 - 90 % z celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ.	V poľnohospodárskej krajine zaberajú TTP pod 50 % z celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ.
	3.1. Nepriame ohrozenie druhu	Minimálne 75 % všetkých stĺpov 22 kV vzdušného elektrického vedenia v CHVÚ je chránených proti úhynu vtákov.	50 - 75 % všetkých stĺpov 22 kV vzdušného elektrického vedenia v CHVÚ je chránených proti úhynu vtákov.	Pod 50 % všetkých stĺpov 22 kV vzdušného elektrického vedenia v CHVÚ je chránených proti úhynu vtákov.
	3.2. Priame ohrozenie druhu	Za 5 rokov neboli zaznamenané žiadne prípady priameho prenasledovania človekom (vyberanie mláďat alebo vajec, odstrel, trávenie, odchyt do želiez).	Za 5 rokov boli zaznamenané do 2 prípadov priameho prenasledovania človekom (vyberanie mláďat alebo vajec, odstrel, trávenie, odchyt do želiez).	Za 5 rokov bolo zaznamenaných viac ako 3 prípady priameho prenasledovania človekom (vyberanie mláďat alebo vajec, odstrel, trávenie, odchyt do želiez).
	3.3. Ohrozenie hniezdných biotopov	Za 5 rokov je výmera lesných porastov starších ako 80 rokov stabilná ( $\pm 5\%$ z ich celkovej výmery).	Za 5 rokov došlo k poklesu výmery lesných porastov starších ako 80 rokov maximálne o 20 % z ich celkovej výmery.	Za 5 rokov došlo k poklesu výmery lesných porastov starších ako 80 rokov o vyše 20 % z ich celkovej výmery.
<b>P</b>	3.4. Ohrozenie potravných biotopov	Výmera TTP za 5 rokov poklesla kvôli zarastaniu náletom drevín, zmenou na ornú pôdu alebo zastavaním do 5 % z ich celkovej výmery.	Výmera TTP za 5 rokov poklesla kvôli zarastaniu náletom drevín, zmenou na ornú pôdu alebo zastavaním o 5 - 10 % z ich celkovej výmery.	Výmera TTP za 5 rokov poklesla kvôli zarastaniu náletom drevín, zmenou na ornú pôdu alebo zastavaním o vyše 10 % z ich celkovej výmery.
	3.5. Ohrozenia migračného biotopu / biotopu počas zimovania	Výmera TTP za 5 rokov poklesla kvôli zarastaniu náletom drevín, zmenou na ornú pôdu alebo zastavaním do 5 % z ich celkovej výmery.	Výmera TTP za 5 rokov poklesla kvôli zarastaniu náletom drevín, zmenou na ornú pôdu alebo zastavaním o 5 - 10 % z ich celkovej výmery.	Výmera TTP za 5 rokov poklesla kvôli zarastaniu náletom drevín, zmenou na ornú pôdu alebo zastavaním o vyše 10 % z ich celkovej výmery.

Tabuľka č. 12: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu orol skalný

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
<b>P</b>	1.1 Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	3	2	6
	1.4. Areálový trend	3	2	6
<b>B</b>	2.1. Hniezdný biotop	3	3	9
	2.2. Potravný biotop	2	3	6
	2.3. Biotopy počas zimovania	2	1	2
<b>O</b>	3.1. Nepriame ohrozenia druhu	2	1	2

3.2. Priame ohrozenia druhu	3	3	9
3.3. Ohrozenie hniezdných biotopov	2	3	6
3.4. Ohrozenie potravných biotopov	3	1	3
3.5. Ohrozenia migračných biotopu/biotopu počas zimovania	3	1	3
<b>Dosiahnutá hodnota spolu:</b>	<b>64</b>		
Maximálna možná hodnota ( $\Sigma$ váh $\times$ 3):	78		

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 13: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu orol skalný

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
82 %		

### Zhodnotenie

Na základe zadefinovaných kritérií pre hodnotenie stavu je druh orol skalný v CHVÚ Strážovské vrchy klasifikovaný stupňom A – dobrý, priaznív stav.

#### 1.6.3.1.5. Definovanie stavu druhu bocian čierny v CHVÚ Strážovské vrchy

##### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa odhaduje výskyt **12 - 16 hniezdných párov** bociana čierneho (dáta z monitoringu), čo predstavuje 3 % slovenskej hniezdnej populácie druhu (400 – 600). Trend populácie bociana čierneho je klasifikovaný ako stabilný s maximálnou zmenou  $\pm 20\%$ , priemerná hustota populácie je 1-4 páry/100 km<sup>2</sup>. Hniezdne páry sú rozmiestnené podľa vhodnosti, teda kvality hniezdných biotopov a najmä potravnej dostupnosti v krajinе. Biotopom druhu sú zachovalé prirodzené komplexy lesov v blízkosti dolín s potravným biotopom (zachovalé aluviálne podhorské vodné tokov, mokrade v otvorenej krajinе). Hlavné biotopy sa nachádzajú v Súľovských vrchoch (Súľovské skaly) a v Strážovských vrchoch (centrálna a východná oblasť). Biotopy druhu sa v území nachádzajú od 100 - 1000 m n. m. Podmienkou je dostatok starých stromov na umiestnenie hniezda a kľud bez vyrušovania ľudskou činnosťou. Jeho prítomnosť v území ovplyvňuje dostatok potravy.

Tabuľka č. 14: Definovanie stavu druhu bocian čierny

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV			NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
populácia	1.1. Veľkosť populácie	Populácia má 31 a viac obsadených teritórií.	Populácia má 11 - 30 obsadených teritórií.	Populácia má 10 a menej obsadených teritórií.
	1.2. Populačný trend	Populácia má v období 5 rokov dlhodobo rastúci trend o vyše 20 %.	Populácia je v období 5 rokov stabilná, alebo kolísce ( $\pm 20\%$ ).	Populácia v období 5 rokov má klesajúci trend o vyše 20 %.
	1.3. Areálový trend	Areál má dlhodobo rastúci trend (viac ako 20 %).	Areál je stabilný, alebo kolísce ( $\pm 20\%$ ).	Areál má dlhodobo klesajúci trend (viac ako 20 %).

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV			NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
<b>biotop</b>	2.1. Hniezdny biotop	Výmera lesov nad 80 rokov je vyše 40 % z lesných pozemkov v CHVÚ, ich distribúcia je rovnomerná, mladiny tvoria do 20 % porastov.	Výmera lesov nad 80 rokov je 20 - 40 % z lesných pozemkov v CHVÚ, ich distribúcia je ostrovčekovitá a rovnomerne rozptýlená v území, mladiny tvoria 20 - 60 % porastov.	Výmera lesov nad 80 rokov je pod 20 % z lesných pozemkov v CHVÚ, vyskytujú sa nerovnomerne, mladiny tvoria nad 60 % porastov.
	2.2. Potravný biotop	Plocha lovísk s dostatkom zarybnených vhodných vodných tokov a mokradí narastá o viac ako 10 % za posledných 10 rokov, resp. podiel vodných plôch dosahuje vyše 3 % rozlohy CHVÚ.	Plocha lovísk s dostatkom zarybnených vhodných vodných tokov a mokradí je stabilná ( $\pm 10\%$ ) za posledných 10 rokov, resp. podiel vodných plôch dosahuje 1 - 3 % rozlohy CHVÚ.	Plocha lovísk s dostatkom zarybnených vhodných vodných tokov a mokradí klesá o viac ako 10 % za posledných 10 rokov, resp. podiel vodných plôch dosahuje menej ako 1 % rozlohy CHVÚ.
	2.3. Biotopy počas migrácie a translokácie	Miera znečistenia a vyrušovania na lokalitách mokradí klesá o viac ako 10 % za posledných 5 rokov.	Miera znečistenia a vyrušovania na lokalitách mokradí je stabilná ( $\pm 10\%$ ) za posledných 5 rokov.	Miera znečistenia a vyrušovania na lokalitách mokradí narastá o viac ako 10 % za posledných 5 rokov.
<b>ohrozenia</b>	3.1. Stupeň ohrozenia druhu (vyrušovanie)	Žiadny prípad zmareného hniezdenia v dôsledku lesohospodárskych prác alebo vyrušovania (turistika a pod.).	Počet prípadov zmareného hniezdenia v dôsledku lesohospodárskych prác alebo vyrušovania (turistika a pod.) 1 až 3 za rok.	Počet prípadov zmareného hniezdenia v dôsledku lesohospodárskych prác alebo vyrušovania (turistika a pod.) 4 a viac za rok.
	3.2. Stupeň ohrozenia hniezdneho biotopu	Podiel starých porastov nad 80 rokov rastie o viac ako 5 % za posledných 10 rokov.	Podiel starých porastov nad 80 rokov sa nemení ( $\pm 5\%$ ) za posledných 10 rokov.	Podiel starých porastov nad 80 rokov a výstavkov klesá o viac ako 5 % za posledných 10 rokov.
	3.3. Stupeň ohrozenia potravného biotopu	Znečistenie a degradácia mokradí má klesajúci trend o viac ako 10 % za posledných 10 rokov (mokrade sa revitalizujú).	Znečistenie a degradácia mokradí je stabilná ( $\pm 10\%$ ) za posledných 10 rokov.	Znečistenie a degradácia mokradí má stúpajúci trend o viac ako 10 % za posledných 10 rokov.
	3.4. Stupeň ohrozenia migračného biotopu			

Tabuľka č. 15: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu bocian čierny

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
<b>P</b>	1.1 Veľkosť populácie	2	2	4
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Areálový trend	2	2	4
<b>B</b>	2.1. Hniezdny biotop	3	3	9
	2.2. Potravný biotop	2	3	6
	2.3. Biotopy počas migrácie a translokácie	2	1	2
<b>O</b>	3.1. Stupeň ohrozenia druhu	2	3	6
	3.2. Stupeň ohrozenia hniezdneho biotopu	1	3	3
	3.3. Stupeň ohrozenia potravného biotopu	2	3	6
	3.4. Stupeň ohrozenia migračného biotopu	2	1	2

<b>Dosiahnutá hodnota spolu:</b>	<b>48</b>
Maximálna možná hodnota ( $\Sigma$ váh $\times$ 3):	72

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 16: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu bocian čierny

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
	67 %	

### Zhodnotenie

Na základe zadefinovaných kritérií hodnotenia bol bocian čierny v celkovom hodnotení v CHVÚ Strážovské vrchy zaradený do stavu B (priemerný) s hodnotou 67 %.

#### 1.6.3.1.6. Definovanie stavu druhu včelár lesný v CHVÚ Strážovské vrchy

##### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa odhaduje výskyt **30 - 40 hniezdných párov** včelára lesného (Karaska et al.2015), čo predstavuje 3-4 % slovenskej hniezdznej populácie druhu (900-1 300). Trend populácie je klasifikovaný ako stabilný s maximálnou zmenou  $\pm 20\%$ . Priemerná hustota populácie včelára lesného v CHVÚ Strážovské vrchy je 1-4 páry/100 km<sup>2</sup>. Obýva celé CHVÚ vo vhodnom prostredí, hniezdzne páry sú rozmiestnené najmä podľa potravnej dostupnosti v krajinе. Vyššie hustoty dosahuje podľa pozorovaní v oblasti Súľovských vrchov, v južných okrajoch Strážovských vrchov a v okolí Valaskej Belej. Hlavné biotopy sa nachádzajú prevažne v mozaikovitej časti krajin CHVÚ (Súľovské vrchy, centrálna časť – Zliechovská hornatina, celý južný okraj CHVÚ), kde sa vyskytuje popri lesných porastoch dostaok trávnych porastov (lúky, extenzívne pasienky), kroviny, poľné lesíky, ovocné sady. Optimálne biotopy pritom nachádza v teplejších polohách v listnatých lesoch v susedstve s lúkami, pasienkami a rozptýlenou drevinovou vegetáciou. Jeho prítomnosť v území ovplyvňuje dostaok potravy. V oblasti súvislých lesných komplexov sú jeho hniezdiská koncentrovanejšie smerom k okrajom do blízkosti otvorenej krajinys dostatkom potravných príležitostí.

Tabuľka č. 17: Definovanie stavu druhu včelár lesný

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV			NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
populácia	1.1. Veľkosť populácie	V CHVÚ je obsadených minimálne 50 hniezdných okrskov.	V CHVÚ je obsadených 20 - 50 hniezdných okrskov.	V CHVÚ je obsadených do 20 hniezdných okrskov.
	1.2. Populačný trend	Početnosť za 5 rokov vzrástla o vyše 20 %.	Početnosť je za 5 rokov stabilná (alebo na úrovni prirodzenej fluktuácie $\pm 20\%$ ).	Početnosť za 5 rokov zmenšila o vyše 20 %.
	1.3. Veľkosť areálu	Viac ako 90 % tetrád kvadrátov DFS*.	70 - 90 % tetrád kvadrátov DFS.	menej ako 70 % tetrád kvadrátov DFS.
biotop	2.1. Hniezdný biotop	Výmera lesných porastov nad 80 rokov je minimálne 20 % z celkovej výmery lesa v CHVÚ a ich rozmiestnenie je v území mozaikovité.	Výmera lesných porastov nad 80 rokov je 10 - 20 % z celkovej výmery lesa v CHVÚ a ich rozmiestnenie je v území nerovnomerné.	Výmera lesných porastov nad 80 rokov je pod 10 % z celkovej výmery lesa v CHVÚ a ich rozmiestnenie je v území nerovnomerné.

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV			NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
2.2. Potravný biotop	Výmera TTP je viac ako 90 % z celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ.	Výmera TTP je 70 - 90 % z celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ.	Výmera TTP je maximálne 70 % z celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ.	
2.3. Migračný biotop	Výmera TTP je viac ako 90 % z celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ.	Výmera TTP je 70 - 90 % z celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ.	Výmera TTP je maximálne 70 % z celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ.	
ohrozenia	3.1. Vyrúšovanie na hniezdiskách	Za 5 rokov nebolo zaznamenané porušenie ochranných pásiem okolo hniezd v hniezdom období.	Za 5 rokov bolo zaznamenaných max.5 prípadov vyrúšovania počas hniezdenia ľudskými aktivitami a porušenie ochranných pásiem okolo hniezd.	Za 5 rokov bolo zaznamenaných viac ako 5 prípadov porušenia ochranných pásiem okolo hniezd lesohospodárskou činnosťou s prípadmi neúspešného hniezdenia z antropických príčin.
	3.2. Stupeň ohrozenia hniezdisk	Za 5 rokov je výmera lesných porastov starších ako 80 rokov stabilná ( $\pm 5\%$ z ich celkovej výmery).	Za 5 rokov došlo k poklesu výmery lesných porastov starších ako 80 rokov maximálne o 10 % z ich celkovej výmery.	Za 5 rokov došlo k poklesu výmery lesných porastov starších ako 80 rokov o vyše 10 % z ich celkovej výmery.
	3.3. Stupeň ohrozenia lovísk	Výmera TTP za 5 rokov sa nemení (tolerancia $\pm 1\%$ ) zmenou na ornú pôdu alebo zastavaním do 5 % z ich celkovej výmery, na lesných pozemkoch a TTP sa nepoužívajú insekticídy.	Výmera TTP za 5 rokov poklesla zmenou na ornú pôdu alebo zastavaním o 2 - 10 % z ich celkovej výmery, na TTP sa používajú insekticídy nepravidelne a maximálne na 10 % výmery a na lesných pozemkoch sa insekticídy neaplikujú.	Výmera TTP za 5 rokov poklesla zmenou na ornú pôdu alebo zastavaním o vyše 10 % z ich celkovej výmery, opakovaná aplikácia insekticídov na TTP a lesných pozemkoch.
	3.4. Stupeň ohrozenia migračného biotopu	Výmera TTP za 5 rokov poklesla sa nemení (tolerancia $\pm 1\%$ ) zmenou na ornú pôdu alebo zastavaním do 5 % z ich celkovej výmery, na lesných pozemkoch a TTP sa nepoužívajú insekticídy.	Výmera TTP za 5 rokov poklesla zmenou na ornú pôdu alebo zastavaním o 2 - 10 % z ich celkovej výmery, na TTP sa používajú insekticídy nepravidelne a maximálne na 10 % výmery a na lesných pozemkoch sa insekticídy neaplikujú.	Výmera TTP za 5 rokov poklesla zmenou na ornú pôdu alebo zastavaním o vyše 10 % z ich celkovej výmery, aplikácia insekticídov na TTP a lesných pozemkoch.

\* Databanka fauny Slovenska <http://www.sopsr.sk/istb/index.php?m=klienti&ac=7&k=1>

Tabuľka č. 18: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu včelár lesný

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	3	2	6

<b>B</b>	2.2. Hniezdny biotop	3	3	9
	2.3. Potravný biotop	2	3	6
	2.4. Migračný biotop	2	1	2
<b>O</b>	3.1. Vyrušovanie na hniezdiskách	2	2	4
	3.2. Stupeň ohrozenia hniezdisk	2	2	4
	3.3. Stupeň ohrozenia lovísk	3	2	6
	3.4. Stupeň ohrozenia migračného biotopu	3	1	3
<b>Dosiahnutá hodnota spolu:</b>				<b>52</b>
Maximálna možná hodnota ( $\sum$ váh $\times$ 3):				66

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 19: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu včelár lesný

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
79 %		

### Zhodnotenie

Na základe zhodnotenia kritérií stavu je stav včelára lesného v CHVÚ Strážovské vrchy klasifikovaný stupňom A – dobrý, priaznivý stav.

#### 1.6.3.1.7. Definovanie stavu druhu tetrov hlucháň v CHVÚ Strážovské vrchy

##### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa v súčasnosti **tetrov hlucháň ako hniezdič nevyskytuje**. Sporadicky sa ešte v území vyskytnú jednotlivé exempláre zatúlané zo susedných území. Hniezdna populácia tetrova hlucháňa z CHVÚ Strážovské vrchy vymizla podľa aktuálneho mapovania v r. 2014. Hlavné biotopy sa nachádzali prevažne v centrálnej časti CHVÚ v oblasti Sádockých vrchov, v Zliechovskej hornatine na Suchom vrchu pod Valaskou Belou, v oblasti Nitrických vrchov od Závadskej Poľany po Capáru na hrebeňových partiach (700-920 m n. m.) severovýchodne od obce Kšinná. Optimálnym biotopom sú staré prirodzené horské lesy (od horských bučín po smrečiny) s rozvoľnenou štruktúrou. Vhodný biotop sa vyznačuje nižšou pokryvnosťou stromovej etáže 60 – 70 %, resp. nižším zakmenením (pod 0,7) ideálne so svetlinami s bobuľonosnými kríkmi (*Vaccinium sp.*, *Rubus sp.*). Hustým tmavým porastom bez bylinnej etáže sa vyhýba. Z pôvodného vhodného biotopu pre výskyt tetrova hlucháňa ostali už len fragmenty s veľmi nízkou výmerou a tým pádom majú biotopy nevyhovujúcu kvalitu. Za hlavné ohrozenie sa pokladá intenzívna ťažba starých lesných porastov vhodných na hniezdenie, zimovanie, a celkovo intenzívna lesohospodárska činnosť (vyrušovanie, likvidácia hniezdisk fragmentáciou lesných porastov) negatívne vplýva na druh. Druh s oslabenou početnosťou a reprodukčnou schopnosťou prežívajúci v území na extinkčný dlh je veľmi citlivý na akýkoľvek predáčný tlak. Veľmi negatívny dopad na druh má zvyšovanie úživnosti revírov pre diviačiu zver a nepriamo aj lov vlkov - predátora diviačej zveri.

Tabuľka č. 20: Definovanie stavu druhu tetrov hlucháň

Kritéria hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV	
	A – dobrý	B – priemerný		
po du	1.1. Veľkosť populácie	V CHVÚ sa vyskytuje viac ako 15 kohútov.	V CHVÚ sa vyskytuje 5 - 15 kohútov.	V CHVÚ sa vyskytuje do 5 kohútov.

Kritéria hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV			NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
1.2. Populačný trend	Populácia za obdobie 5 rokov rastie o minimálne 10 %.	Populácia za obdobie 5 rokov je stabilná, alebo rastie do 10 %.	Populácia sa za obdobie 5 rokov klesá, alebo populácia úplne zanikla.	
	Počet obsadených hniezdných lokalít stúpa minimálne o 10 % za obdobie 5 rokov.	Počet obsadených tokanísk je stabilný alebo stúpa do 10 % za obdobie 5 rokov.	Počet obsadených tokanísk klesá za obdobie 5 rokov, alebo populácia úplne zanikla.	
	Početnosť populácie v Poľsku a Českej republike a v okolitých územiach na Slovensku stúpa o vyše 20 %.	Početnosť populácie v Poľsku a Českej republike a v okolitých územiach na Slovensku je stabilná alebo s miernymi výkyvmi do 20 %.	Početnosť populácie v Poľsku a Českej republike a v okolitých územiach na Slovensku klesá o viac ako 20 %.	
2.1. Hniezdný biotop	Lesné porasty nad 80 rokov s nižšou zapojenosťou porastov (50 - 70 %) v lokalitách výskytu sú celistvé a presahujú 200 ha.	Lesné porasty (nad 80 rokov) s nižšou zapojenosťou porastov (50 - 70 %) v lokalitách výskytu sú celistvé a presahujú 100 ha.	Lesné porasty (nad 80 rokov) s nižšou zapojenosťou porastov (50 - 70 %) v lokalitách výskytu nie sú celistvé a nepresahujú 100 ha.	
	Zastúpenie lesných porastov nad 80 rokov s porastmi čučoriedok dosahujúcich minimálne 30 % pokryvnosti zaberajú na lokalitách výskytu viac ako 300 ha. Aplikácia chemických látok na lokalitách je vylúčená.	Zastúpenie lesných porastov nad 80 rokov s porastmi čučoriedok dosahujúcich minimálne 30 % pokryvnosti zaberajú na lokalitách výskytu viac ako 200 ha. Aplikácia chemických látok na lokalitách výskytu je len výnimcočná a bodová.	Zastúpenie lesných porastov nad 80 rokov s porastmi čučoriedok dosahujúcich minimálne 30 % pokryvnosti zaberajú na lokalitách výskytu menej ako 200 ha.	
ohrozenia	3.1. Priame ohrozenie druhu	Menej ako 15 hniezdných lokalít je v čase toku a hniezdenia (1.3. - 1.7.) ovplyvnených lesotechnickými zásahmi alebo vyrušovaním.	15 až 30% hniezdných lokalít je v čase toku a hniezdenia (1.3. - 1.7.) ovplyvnených lesotechnickými zásahmi alebo vyrušovaním.	Viac ako 30% hniezdných lokalít je v čase toku a hniezdenia (1.3. - 1.7.) ovplyvnených lesotechnickými zásahmi alebo vyrušovaním.
	3.2. Deštrukcia hniezdných/ potravných biotopov	Viac ako 90 % lokalít zostało za obdobie 5 rokov bez negatívnej zmeny biotopu.	75 - 90 % lokalít zostało za obdobie 5 rokov bez negatívnej zmeny biotopu.	Menej ako 75 % lokalít zostało bez negatívnej zmeny biotopy.
	3.3 Fragmentácia biotopu	Viac ako 90 % lokalít je vo vzdialnosti menšej ako 15 km od iných lokalít s vhodnými biotopmi.	60 - 90 % lokalít je vo vzdialnosti menšej ako 15 km od iných lokalít s vhodnými biotopmi.	Menej ako 60 % lokalít je vo vzdialosti menšej ako 15 km od iných lokalít s vhodnými biotopmi.

Poznámka: Za vhodný biotop možno považovať starší smrekový alebo zmiešaný porast nad 80 rokov, so zapojenosťou 50-70%, s pokryvnosťou čučoriedky min 30 %.

Tabuľka č. 21: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu tetrov hlucháň

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
<b>P</b>	1.1. Veľkosť populácie	1	3	3
	1.2. Populačný trend	1	3	3
	1.3. Areálový trend	1	3	3
	1.4. Trend v okolitých štátocach a územiach	1	2	2
<b>B</b>	2.1. Hniezdny biotop	1	3	3
	2.2. Potravný biotop a biotopy počas migrácie	1	3	3
<b>O</b>	3.1. Priame ohrozenie druhu	1	3	3
	3.2. Deštrukcia hniezdných/potravných biotopov	1	3	3
	3.3. Fragmentácia biotopu	1	2	2
<b>Dosiahnuté body</b>				<b>25</b>
Možný počet bodov				75

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 22: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu tetrov hlucháň

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
		33%

### Zhodnotenie

Na základe zadefinovaných kritérií hodnotenia bol druh tetrov hlucháň zaradený v celkovom hodnotení v CHVÚ Strážovské vrchy do nepriaznivého stavu C s hodnotou 33 % z maximálneho bodového ohodnotenia priaznivého stavu.

#### 1.6.3.1.8. Definovanie stavu druhu kuvik kapcavý v CHVÚ Strážovské vrchy

##### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

Veľkosť populácie v CHVÚ Strážovské vrchy sa odhaduje na **10 - 15 párov** (dáta z monitoringu), čo predstavuje približne necelé 1 % slovenskej hniezdejnej populácie druhu (1 600+). Trend populácie je klasifikovaný ako stabilný s maximálnou zmenou  $\pm 20\%$ . Najvyššia denzita druhu bola zistená v oblasti Suchá duša a Strážov. Rozptyl jedincov v území je nepravidelný, významne závislý od vhodnosti biotopov. Vhodnými biotopmi druhu sú pritom horské bukové, zmiešané lesy a ihličnaté od 600 m n.m. po najvyššie partie územia (1200 m n. m.). Početnejší je v centrálnej oblasti od Pružiny po Gápel, kde sú najsúvislejšie oblasti podhorských a horských bukových a bukovo-jedľových lesov. Rozloha biotopov je znižovaná ťažbou posledných zvyškov starých lesov a ochranných lesov, čím dochádza aj k výrubu starých porastov s hniezdnymi možnosťami kuvika kapcavého.

Tabuľka č. 23: Definovanie stavu druhu kuvik kapcavý

Kritériá hodnotenia	Priaznivý stav		Nepriaznivý stav
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
<b>populácia</b>	1.1. Veľkosť populácie	V CHVÚ vyše 30 hniezdných teritórií.	V CHVÚ 10 - 30 hniezdných teritórií.
	1.2. Populačný trend	V CHVÚ populačný nárast o vyše 20 %, na skúmaných plochách populačný nárast o vyše 20 %.	V CHVÚ stabilný trend resp. na skúmaných plochách s osciláciou do 20 %.

	1.3. Veľkosť areálu	Veľkosť areálu v CHVÚ je 30 % lesných pozemkov.	Veľkosť areálu v CHVÚ je 10 - 30 % lesných pozemkov.	Veľkosť areálu v CHVÚ je menej ako 10 % lesných pozemkov.
	1.4. Areálový trend	Rozloha smrekových a zmiešaných lesov nad 80 rokov sa nemení.	Rozloha lesov nad 80 rokov sa za 5 rokov znížila o 10 %.	Rozloha lesov nad 80 rokov sa za 5 rokov znížila o vyše 10 %.
biotop	2.1. Hniezdny biotop	Ihličnaté alebo zmiešané lesy nad 80 rokov zaberajú minimálne 30 % z plochy lesov CHVÚ.	Výskyt porastov nad 80 rokov vhodnej druhovej a vekovej štruktúry s dutinami po tesároch čiernych zaberá 25 % lesných pozemkov.	Lesný porast nad 80 rokov je na 20 % lesných pozemkov v CHVÚ.
	2.2. Potravný biotop	Do 1 km od hniezda, resp. v lovnom areáli, sú otvorené plochy (lúky a rúbane) v optimálnej rozlohe 20 %.	Výskyt odlesnených plôch, rúbaní a mladín je okolo 10 % v okruhu 1 km od hniezda.	Prevažujú súvislé lesné porasty alebo prevládajú veľké odlesnené plochy a mladiny.
	2.3. Biotopy počas zimovania			
ohrozenia	3.1. Stupeň ohrozenia druhu (prenasledovanie, vyrušovanie)	Menej ako 20 % areálu rozšírenia v CHVÚ podlieha stresovým faktorom (napr. ťažba, vyrušovanie, stavebné práce, lyžiarske strediská, cesty, hluk).	20 - 30 % areálu podlieha stresovým faktorom (napr. ťažba, vyrušovanie, stavebné práce, lyžiarske strediská, cesty, hluk).	30 - 50 % areálu podlieha stresovým faktorom (napr. ťažba, vyrušovanie, stavebné práce, lyžiarske strediská, cesty, hluk).
	3.2. Stupeň ohrozenia hniezdneho biotopu	Podiel lesov vo veku nad 80 rokov za 5 rokov vzrástol o 5 %.	Podiel lesov vo veku nad 80 rokov sa za posledných 5 rokov nemenil.	Podiel lesov vo veku nad 80 rokov sa za 5 rokov zmenšil o 10 %.
	3.3. Stupeň ohrozenia biotopu počas zimovania			

Tabuľka č. 24: Zhodnotenie stavu druhu kuvik kapcavý

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	3	6
	1.4. Areálový trend	1	3	3
B	2.1. Hniezdny biotop	3	3	9
	2.2. Potravný biotop	2	3	6
	2.3. Biotopy počas zimovania	2	3	6
O	3.1. Stupeň ohrozenia druhu	2	3	6
	3.2. Stupeň ohrozenia hniezdneho biotopu	1	3	3
	3.3. Stupeň ohrozenia biotopu počas zimovania	1	3	3
<b>Dosiahnutá hodnota spolu:</b>				<b>54</b>
Maximálna možná hodnota ( $\Sigma$ váh $\times$ 3):				90

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 25: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu kuvik kapcavý

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
	60 %	

### Zhodnotenie

Na základe zadefinovaných kritérií v celkovom hodnotení je kuvik kapcavý v CHVÚ Strážovské vrchy v stave B – priemernom priaznivom s hodnotou 60 % maximálnej možnej bodovej hodnoty stavu.

#### 1.6.3.1.9. Definovanie stavu druhu lelek lesný v CHVÚ Strážovské vrchy

##### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ Strážovské vrchy sa veľkosť populácie lelka lesného odhaduje na **5 - 20 párov** (Karaska et al. 2015). Trend populácie je v území neznámy, vyskytuje sa rozptylene. Najväčšie množstvo záznamov priamych pozorovaní z hniezdneho obdobia je evidovaných v oblasti Zliechovskej hornatiny od Suchej duše po Strážov. Druh sa vyskytuje v presvetlených lesných porastoch prelinajúcich sa so zarastajúcimi pasienkami, predovšetkým na teplých stráňach s rúbaňami a jednotlivými ponechanými stromami v lesnej centrálnej časti CHVÚ, taktiež bol zaznamenaný na okrajoch borovicových lesov v severnej časti CHVÚ pri Pružine. Hlavnými biotopmi lelka lesného sú okraje lesných porastov alebo rúbaní so solitérnymi stromami, (dôležitý je dostatok lietajúceho hmyzu s nočnou aktivitou), zarastajúce borievkové pasienky so solitérnymi stromami.

Tabuľka č. 26: Definovanie stavu druhu lelek lesný

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV	
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
populácia	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	V CHVÚ hniezdi viac ako 50 párov.	V CHVÚ hniezdi 5 - 50 párov.	V CHVÚ hniezdi menej ako 5 párov.
	1.2. Populačný trend	Hustota populácie vzrástá z dlhodobejšieho hľadiska o 10 - 20 %.	Hustota populácie je z dlhodobejšieho hľadiska stabilná, prípadne s menšími krátkodobými výkyvmi nepresahujúcimi 20 % stavu početnosti.	Hustota populácie sa z dlhodobejšieho hľadiska zmenšuje.
	1.3. Veľkosť areálu	Druh sa vyskytuje na viac ako 20 % CHVÚ.	Druh sa vyskytuje na 10 - 20 % CHVÚ.	Druh sa vyskytuje na menej ako 10 % CHVÚ.
	1.4. Areálový trend	Areál druhu sa v danom území zväčšuje; vhodné biotopy sú obsadzované hniezdiacimi párami pravidelne po viacero rokov.	Areál druhu je v danom území z dlhodobejšieho hľadiska stabilný, prípadne s menšími krátkodobými výkyvmi; vhodné biotopy sú obsadzované hniezdiacimi párami pravidelne po viacero rokov.	Areál druhu sa v danom území zmenšuje; hniezdiacimi párami nie sú pravidelne obsadzované ani vhodné biotopy.

<b>biotop</b>	2.1. Hniezdny biotop	Prevažne zmiešané alebo ihličnaté lesy s nesúvislým korunovým zápojom prerusované čistinami; okraje redších lesov a ich stred s bezlesnou krajinou s výskytom krovín s nelesnou drevinovou vegetáciou (NDV).	Lesy s nesúvislým korunovým zápojom s rúbaniskami a lesné okraje bez plynulého prechodu na nelesné pozemky.	Lesy mladšieho veku so súvislým korunovým zápojom bez strelcov s otvorenou krajinou alebo rúbaniskami; prevaha smrekových monokultúr aj v nižších častiach územia.
	2.2. Potravný biotop a migračný biotop	Prevažne zmiešané alebo ihličnaté lesy s nesúvislým korunovým zápojom prerusované čistinami; okraje redších lesov a ich stred s bezlesnou krajinou s výskytom krovín a NDV; prostredia nezačažené chemickými postrekmi znižujúcimi diverzitu hmyzu.	Lesy s nesúvislým korunovým zápojom s rúbaniskami a lesné okraje bez plynulého prechodu na nelesné pozemky; prostredia len málo začažené chemickými postrekmi znižujúcimi diverzitu hmyzu.	Lesy mladšieho veku so súvislým korunovým zápojom bez strelcov s otvorenou krajinou alebo rúbaniskami; prostredia vo väčšej miere začažené chemickými postrekmi znižujúcimi diverzitu hmyzu.
<b>ohrozenia</b>	3.1. Ohrozenie populácie	Druh nie je prenasledovaný; počas obdobia hniezdenia nie je na hniezdiskách vyrušovaný lesohospodárskou činnosťou a zberom lesných plodov; potravná základňa nie je degradovaná aplikáciou chemických postrekov.	Druh nie je priamo prenasledovaný a počas obdobia hniezdenia je na hniezdiskách v menšej miere vyrušovaný občasnou lesohospodárskou činnosťou; potravová základňa nie je degradovaná aplikáciou chemických postrekov.	Druh nie je prenasledovaný ale počas obdobia hniezdenia je vyrušovaný sústavnou alebo dlhodobou lesohospodárskou činnosťou; potravová základňa je degradovaná aplikáciou chemických postrekov.
	3.2. Ohrozenie biotopu	Zachovávanie a zvyšovanie podielu vhodných hniezdných biotopov v celej rozlohe daného územia; najmä v nižších nadmorských výškach CHVÚ pri strete s otvorenou krajinou zachovávanie (prípadne zvyšovanie podielu) ihličnatých porastov s nesúvislým korunovým zápojom, najmä borín; vylúčenie používania chemických prostriedkov znižujúcich diverzitu hmyzu a tým potravnú základňu daného druhu.	Zachovávanie podielu vhodných hniezdných biotopov v celej rozlohe daného územia; najmä v nižších nadmorských výškach pri strete s otvorenou krajinou zachovávanie ihličnatých porastov s nesúvislým korunovým zápojom, najmä borín; len sporadické používanie chemických prostriedkov znižujúcich diverzitu hmyzu a tým potravnú základňu daného druhu.	Znižovanie podielu vhodných hniezdných biotopov v celej rozlohe daného územia; najmä v nižších nadmorských výškach pri strete s otvorenou krajinou znižovanie podielu riedkych ihličnatých porastov, najmä borín; používanie chemických prostriedkov znižujúcich diverzitu hmyzu a tým potravnú základňu daného druhu.

Tabuľka č. 27: Zhodnotenie stavu druhu lelek lesný

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
P	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6

	1.3. Veľkosť areálu	1	2	2
	1.4. Areálový trend	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný a migračný biotop	2	2	4
O	3.1. Ohrozenie populácie	2	3	6
	3.2. Ohrozenie biotopu	2	2	4
<b>Dosiahnutá hodnota spolu:</b>				<b>38</b>
Maximálna možná hodnota ( $\Sigma$ váh $\times$ 3):				60

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 28: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu lelek lesný

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
	63 %	

### Zhodnotenie

Na základe zadefinovaných kritérií hodnotenia bol druh lelek lesný v CHVÚ Strážovské vrchy zaradený v celkovom hodnotení do stavu B – priemerný, priaznivý stav s hodnotou 63 %.

#### 1.6.3.1.10. Definovanie stavu druhu chriašteľ poľný v CHVÚ Strážovské vrchy

##### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa veľkosť populácie chriašteľa poľného odhaduje na **35 - 40 párov** (Karaska et al. 2015), čo predstavuje približne 1 % slovenskej hniezdznej populácie druhu (3 000-5 000), pričom trend populácie sa klasifikuje ako stabilný s maximálnou zmenou  $\pm 20\%$ . Hustota populácie sa pohybuje v optimálnych biotopoch od 0,16-0,48 hniezdných párov/10 ha. Chriašteľ poľný sa vyskytuje v najvyšších denzitách v centrálnej časti CHVÚ: okolie Čičmian, Zliechova, Valaskej Belej, kde sa nachádza vysoký podiel zachovalých podhorských, podmáčaných a mokrých lúk. Biotopom sú u druhu predovšetkým podhorské kosné lúky, podmáčané lúky, porasty vysokých burín na trvalých trávnych porastoch. Biotopy chriašteľa poľného predstavujú bylinné porasty vyššie ako 20 cm (Danko et al. 2002, Polák a Sáxa 2005). V jarnom období preferuje chriašteľ rýchlo rastúcu vegetáciu, napríklad v okolí hnojísk. V menšej miere, ale pravidelne, sa vyskytuje na kultúrnych kosných lúkach, v lucerne alebo na mokradiach, menej často aj na poliach (obilné, repka), vyhýba sa pravidelne spásaným pasienkom. Chriašteľ poľný je ako hniezdič rozšírený na celom území poľnohospodárskej krajiny CHVÚ.

Tabuľka č. 29: Definovanie stavu druhu chriašteľ poľný

Kritéria hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
populácia	1.1. Veľkosť populácie	V CHVÚ sa vyskytuje viac ako 150 volajúcich samcov za obdobie 5 rokov.	V CHVÚ sa vyskytuje 30 - 150 volajúcich samcov za obdobie 5 rokov.
	1.2. Populačný trend	Populácia za obdobie 5 rokov rastie o minimálne 20 %.	Populácia za obdobie 5 rokov je stabilná s výkyvmi do $\pm 20\%$ .
			Populácia za obdobie 5 rokov klesá o viac ako 20 %.

	1.3. Veľkosť areálu	Volajúce samce sú zaznamenané na viac ako 75 % poľnohospodárskych pozemkov počas 5 rokov.	Volajúce samce sú zaznamenané na 50 – 75 % poľnohospodárskych pozemkov počas 5 rokov.	Volajúce samce sú zaznamenané na menej ako 50 – 75 % poľnohospodárskych pozemkov počas 5 rokov.
	1.4. Areálový trend	Počet miest s chrapkajúcimi samcami stúpa minimálne o 20 % za obdobie 5 rokov.	Počet miest s chrapkajúcimi samcami je stabilný, prípadne kolíše v rozsahu 20 % za obdobie 5 rokov.	Počet miest s chrapkajúcimi samcami klesá za obdobie 5 rokov o viac ako 20 %.
biotop ohrozenia	2.1. Hniezdzny biotop	Poloprirodzené a prirodzené lúky kosené 1 x ročne zaberajú viac ako 30 % poľnohospodárskych pozemkov.	Poloprirodzené a prirodzené lúky kosené 1 x ročne zaberajú 20 - 30 % poľnohospodárskych pozemkov.	Poloprirodzené a prirodzené lúky kosené 1 x ročne zaberajú menej ako 20 % poľnohospodárskych pozemkov.
	2.2. Potravný biotop	Výmera TTP v CHVÚ rastie o viac ako 5 % za obdobie 5 rokov*1.	Zmeny vo TTP v CHVÚ nepresahujú 5 % za obdobie 5 rokov*1.	Výmera TTP v CHVÚ klesá o viac ako 5 % za obdobie 5 rokov *1.
	2.3. Biotopy dôležité počas migrácie	Počas obdobia migrácie (august – september) tvorí rozsah nevykosených plôch alebo iných bylinných porastov vyšších ako 30 cm, viac ako 10 % otvorennej krajiny.	Počas obdobia migrácie (august – september) tvorí rozsah nevykosených plôch alebo iných bylinných porastov vyšších ako 30 cm 5 - 10 % otvorennej krajiny.	Počas obdobia migrácie (august – september) je rozsah nevykosených plôch alebo iných bylinných porastov vyšších ako 30 cm menej ako 5 % otvorennej krajiny.
	3.1. Nepriame ohrozenie druhu	Viac ako 70 % lokalít je v čase hniezdenia (15.5. – 1.8.) bez agrotechnických a iných negatívnych zásahov, za obdobie 5 rokov *2.	45 - 70 % lokalít je v čase hniezdenia(15.5. – 1.8.) bez agrotechnických a iných negatívnych zásahov, za obdobie 5 rokov*2.	Menej ako 45 % lokalít je v čase hniezdenia bez agrotechnických a iných negatívnych zásahov, za obdobie 5 rokov *2.
	3.2. Priame ohrozenie druhu	Viac ako 75 % lúk v CHVÚ je kosených spôsobom od stredu k okrajom alebo pásmi.	50 - 75 % lúk v CHVÚ je kosených spôsobom od stredu k okrajom alebo pásmi.	Menej ako 50 % lúk v CHVÚ je kosených od stredu k okrajom alebo pásmi.
	3.3. Deštrukcia hniezdných a potravných biotopov	Stav biotopu sa na lokalitách nezhoršil za obdobie 5 rokov *3.	Stav biotopu sa zhoršil na menej ako 30 % lokalít za obdobie 5 rokov*3.	Stav biotopu sa zhoršil na viac ako 30 % lokalít za obdobie 5 rokov *3.

\*1 K znižovaniu výmery TTP môže dôjsť jednak zastavaním, rozoraním, zalesnením a podobne. Je vhodné vychádzať z aktuálnych podkladov skutočného stavu napr. jednotiek LPIS (nie údajov podľa katastra, nakoľko stav katastra neodráža skutočný stav).

\*2 Najmä kosenie, intenzívna pastva, mulčovanie, hnojenie a iná činnosť ktorá by mohla spôsobiť priame usmrtenie mláďať alebo dospelých jedincov

\*3 Zhoršenie stavu biotopu môže predstavovať – zalesnenie (prirodzené sukcesiou, alebo zámerné, zmena trvalého trávneho porastu na pasienok alebo ornú pôdu, zmena úhoru alebo prirodzenej lúky na intenzívne obhospodarovaný trávnatý porast, vyravnanie medzi, odvodnenie a podobne. Naopak zlepšenie biotopu môže predstavovať premenu časti ornej pôdy na trávnatý porast, zmena pasienka na kosnú lúku a podobne.

Tabuľka č. 30: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu chriašteľ poľný

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
<b>P</b>	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
	1.4. Areálový trend	2	2	4
<b>B</b>	2.1. Hniezdzny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	2	4
	2.3. Biotopy dôležité počas migrácie	2	3	6
<b>O</b>	3.1. Nepriame ohrozenie druhu	1	3	3
	3.2. Priame ohrozenie druhu	1	2	2
	3.3. Deštrukcia hniezdných a potravných biotopov	2	3	6
<b>Dosiahnuté body</b>				<b>47</b>
<b>Možný počet bodov</b>				<b>78</b>

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 31: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu chriašteľ poľný

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
	60 %	

### Zhodnotenie

Na základe zadefinovaných kritérií hodnotenia je druh chriašteľ poľný v CHVÚ Strážovské vrchy v celkovom hodnotení klasifikovaný do priaznivého stavu B - priemerný s hodnotou 60%.

#### 1.6.3.1.11. Definovanie stavu druhu ďateľ čierny v CHVÚ Strážovské vrchy

### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa odhaduje na **75 - 110 párov** (Karaska et al. 2015), čo predstavuje 2 % slovenskej hniezdznej populácie druhu (5 500+), t. j. je splnené kritérium viac ako 1 % národnej populácie. Obýva podhorské a horské listnaté a zmiešané lesy po najvyššie partie územia (1200 m n. m.). Hustota populácie v hlavných biotopoch dosahuje priemerne 0,30 – 0,5 obsadených teritorií/km<sup>2</sup>. Rozptyl jedincov v území je roztrúsený, v závislosti od vhodnosti biotopov. Najvyššie hustoty boli zistené v častiach s najväčším podielom zachovalých listnatých a zmiešaných lesov s dostatočným zastúpením starých porastov a to najmä v centrálnej oblasti CHVÚ a v severnej časti CHVÚ. Početnejší je v tejto severnej časti CHVÚ (Súľovské vrchy) a v centrálnej oblasti od Pružiny po Gápel, kde sú najsúvislejšie oblasti podhorských a horských bukových a bukovo- jedľových lesov s podielom starých porastov. Xerotermné svahy (čisté dubiny) na južných úpätiach obýva zriedkavejšie. Preferuje výskyt starých porastov, aj keď sú už porasty značne fragmentované.

Ďateľ čierny nie je hniezdnym biotopom viazaný na prírodné dutiny, keďže páry si vydlabávajú dutiny samostatne (Hudec 1983), preto sú pre tento druh vhodné na hniezdenie aj o niečo mladšie lesy ako pre iné druhy naviazané ekologicky na vekovo staršie dreviny (mucháriky alebo žľtochvosty). Zastúpenie porastov vo veku nad 80 rokov v CHVÚ Strážovské vrchy je v súčasnosti ešte dostatočné. Je potrebné zdôrazniť, že ďateľ čierny má najväčšie hniezdzne teritórium zo všetkých našich ďatľov (rádovo km<sup>2</sup>). Takisto nie je až tak citlivý na fragmentáciu lesných porastov ako iné druhy ďatľov. Populácia druhu v CHVÚ je hodnotená ako stabilná.

Tabuľka č. 32: Definovanie stavu druhu ďateľ čierny

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV	
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
populácia	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	Veľkosť populácie je vyššia ako 150 hniezdných párov.	Veľkosť populácie dosahuje 50 - 150 hniezdných párov.	Veľkosť populácie je nižšia ako 50 hniezdných párov.
	1.2. Populačný trend	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov stúpa o viac ako 20 %.	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov je stabilná, s fluktuáciou do $\pm 20\%$ .	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov klesá o viac ako 20 %.
	1.3. Veľkosť areálu	Viac ako 90 % tetrád kvadrátov DFS.	70 - 90 % tetrád kvadrátov DFS.	Menej ako 70 % tetrád kvadrátov DFS.
	1.4. Areálový trend	Areál je stabilný, alebo sa zväčšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.	Areál je stabilný, zmeny sú v rozpätí $\pm 20\% / 5$ rokov.	Areál sa zmenšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.
biotop	2.1. Hniezdzny biotop	Viac ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú lesy s prevahou drevín nad 100 rokov.	Viac ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú lesy s prevahou drevín nad 80 rokov.	Menej ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú lesy s prevahou drevín nad 80 rokov.
	2.2. Potravný biotop	Lesy s prevahou drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú viac ako 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Lesy s prevahou nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú 50 - 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Lesy s prevahou drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú menej ako 50 % rozlohy lesov nad 80 rokov.
	2.3. Biotop počas zimovania	Lesy s prevahou drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú viac ako 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Lesy s prevahou nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú 50 - 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Lesy s prevahou drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú menej ako 50 % rozlohy lesov nad 80 rokov.
ohrozenia	3.1. Ohrozenie populácie	Podiel lesov nad 80 rokov za 5 rokov vzrástol o vyše 10 %.	Podiel lesov nad 80 rokov je za 5 rokov stabilný (tolerancia $\pm 10\%$ ).	Podiel lesov nad 80 rokov za 5 rokov poklesol o vyše 10 %.
	3.2. Ohrozenie biotopu	Bez veľkoplošného holorubného spôsobu obhospodarovania lesných porastov, pokles rozlohy lesov nad 80 rokov menej ako 5 %, pokles výmery TTP za 5 rokov je menej ako 5 %, vylúčené používanie insekticídov.	Veľkoplošné holoruby využívané na max. 10 % rozlohy lesov, pokles rozlohy lesov nad 80 rokov 5 - 10 %, pokles výmery TTP za 5 rokov je 5 - 10 %, obmedzené používanie insekticídov.	Veľkoplošné holoruby využívané na viac ako 10 % rozlohy lesov, pokles rozlohy lesov nad 80 rokov viac ako 10 %, pokles výmery TTP za 5 rokov je viac ako 10 %, intenzívne používanie insekticídov.

Tabuľka č. 33: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu ďateľ čierny

Kritérium	Stav*	Váha parametra**	Počet bodov	
P	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
	1.4. Areálový trend	2	2	4

<b>B</b>	2.1. Hniezdzny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	2	4
	2.3. Biotop počas zimovania	2	1	2
<b>O</b>	3.1. Ohrozenie populácie	2	2	4
	3.2. Ohrozenie biotopu	2	1	2
<b>Dosiahnutá hodnota spolu:</b>				<b>38</b>
Maximálna možná hodnota ( $\Sigma$ váh $\times$ 3):				57

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 34: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu ďatel' čierny

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
	67 %	

### Zhodnotenie

V súčasnosti môžeme hodnotiť stav ďatľa čierneho v CHVÚ Strážovské vrchy ako priemerný priaznivý – B.

#### 1.6.3.1.12. Definovanie stavu druhu ďatel' bielochrbty v CHVÚ Strážovské vrchy

##### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa aktuálne početnosť ďatľa bielochrbtého pohybuje na úrovni **150 - 160 párov** (dáta z monitoringu), čo predstavuje približne 4 % slovenskej hniezdnej populácie druhu (4 250+). CHVÚ Strážovské vrchy je charakteristikou pomerne vysokou lesnatostou, čo umožňuje jeho pomerne rovnomerný výskyt. Vďaka vhodným podmienkam pre výskyt niektoré lokality vykazujú vyššiu denzitu druhu, početnejší je v severnej časti CHVÚ (Súľovské vrchy) a v centrálnej oblasti od Pruziny po Zliechov (masív Strážova), kde sú najsúvislejšie oblasti s výskytom ochranných lesov, prevažne podhorských bukových a bukovo-jedľových lesov s podielom porastov pralesovitého charakteru. Xerotermné lesné svahy (čisté dubiny) na južných úpätiach obýva zriedkavejšie. Hustota populácie v hlavných biotopoch dosahuje 0,2 - 0,5 obsadených teritórií/100 ha.

Najvyššie hustoty boli zistené v častiach s najväčším podielom zachovalých listnatých a zmiešaných lesov s dostatočným zastúpením starých porastov. Preferovanými biotopom sú porasty pralesovitého charakteru, čo zväčša spĺňajú ochranné lesy s dostatkom mŕtveho dreva. Druh je pomerne citlivý na fragmentáciu lesných porastov. Zastúpenie starých porastov v hospodárskych lesov značne klesá v dôsledku zvyšovania ťažby dreva - teda obnovy a rekonštrukcie starých porastov. Je diskutabilné, či zastúpenie porastov vo veku nad 100 rokov v CHVÚ Strážovské vrchy je v súčasnosti dostačné pre stabilný trend populácie. Aktuálne sa odhaduje mierny pokles populácie druhu v CHVÚ (do - 50 %).

Tabuľka č. 35: Definovanie stavu druhu ďatel' bielochrbty

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV			NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
populácia	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	Veľkosť populácie je vyššia ako 200 hniezdných párov.	Veľkosť populácie dosahuje 100 - 200 hniezdných párov.	Veľkosť populácie je nižšia ako 100 hniezdných párov.
	1.2. Populačný trend	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov stúpa o viac ako 20 %.	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov je stabilná, s fluktuáciou do $\pm 20 \%$ .	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov klesá o viac ako 20 %.
	1.3. Veľkosť areálu	Viac ako 90 % tetrád kvadrátov DFS.	50 - 90 % tetrád kvadrátov DFS.	Menej ako 50 % tetrád kvadrátov DFS.

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV			NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
1.4. Areálový trend	Areál je stabilný alebo sa zväčšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.	Areál je stabilný, zmeny sú v rozpäti ±20 % / 5 rokov.	Areál sa zmenšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.	
<b>biotop</b>	2.1. Hniezdzny biotop	Viac ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 100 rokov.	Viac ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov.	Menej ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov.
	2.2. Potravný biotop	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú viac ako 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú 50 - 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú menej ako 50 % rozlohy lesov nad 80 rokov.
	2.3. Biotop významný počas zimovania	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú viac ako 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú 50 - 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú menej ako 50 % rozlohy lesov nad 80 rokov.
<b>ohrozenia</b>	3.1. Ohrozenie populácie	Podiel listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov za 5 rokov vzrástol o vyše 10 %.	Podiel listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov je za 5 rokov stabilný (tolerancia ±10 %).	Podiel listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov za 5 rokov poklesol o vyše 10 %.
	3.2. Ohrozenie biotopu	Bez veľkoplošného holorubného spôsobu obhospodarovania lesných porastov, pokles rozlohy starých listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov menej ako 5 %.	Veľkoplošné holoruby využívané na max. 10 % rozlohy lesov, pokles rozlohy starých listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov 5 - 10 %.	Veľkoplošné holoruby využívané na viac ako 10 % rozlohy lesov, pokles rozlohy starých listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov viac ako 10 %.

Tabuľka č. 36: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu ďatel' bielochrbty

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
<b>P</b>	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	1	3	3
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
	1.4. Areálový trend	2	2	4
<b>B</b>	2.1. Hniezdzny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	2	4
	2.3. Biotop významný počas zimovania	2	1	2
<b>O</b>	3.1. Ohrozenie populácie	2	2	4
	3.2. Ohrozenie biotopu	2	1	2
<b>Dosiahnutá hodnota spolu:</b>				<b>35</b>

Maximálna možná hodnota ( $\Sigma$ vág × 3):	57
--	----

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 37: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu ďateľ bielochrbtý

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
	61 %	

### Zhodnotenie

Stav druhu ďateľ bielochrbtý v CHVÚ Strážovské vrchy je hodnotený ako priemerný priaznivý - B.

#### 1.6.3.1.13. Definovanie stavu druhu jariabok hôrny v CHVÚ Strážovské vrchy

#### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa odhaduje veľkosť populácie jariabka na **20 - 25 párov** (Karaska et.al. 2015), čo predstavuje približne 1 % slovenskej hniezdznej populácie druhu (3 000-5 000). U druhu bol v území zistený mierny pokles populácie o 20-50 %, pravdepodobne spôsobený zmenou biotopov (znižovanie podielu úživných drevín ako lieska, jarabina, breza, osika v lesných porastoch), ale najmä silným predačným tlakom diviačej zveri, ktorej stav v území silne narastá. Hustota populácie sa pohybuje v optimálnych biotopoch v rozmedzí od 0,16 do 0,48 páru/10 ha. Jariabok hôrny sa vyskytuje v najvyšších denzitách v centrálnej časti CHVÚ. Najväčšia hustota bola zistená v lokalitách Suchá Duša, Gápel a Fačkov, kde sa nachádzajú zarastajúce pasienky a rúbane s lieskou, smrekovcom a brezou. Typickým prostredím jariabka hôrneho sú ihličnaté, zmiešané i listnaté lesy v stredných a vyšších horských polohách. Dôležitým biotopom sú aj zarastajúce pasienky v pokročilom štádiu sukcesie, zmiešané i listnaté lesy v stredných horských polohách. Výskyt liesky, brezy, jelše ako aj rôznych bobuľonosných kríkov predstavuje jednu z kľúčových charakteristik biotopu tohto vtáčieho druhu. Druh preferuje hraničné línie medzi porastmi so zárastom pionierskych drevín. Takéto podmienky sa nachádzajú v strednej časti CHVÚ Strážovské vrchy .

Tabuľka č. 38: Definovanie stavu druhu jariabok hôrny

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV			NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
populácia	1.1. Veľkosť populácie	Veľkosť populácie je vyššia ako 150 hniezdných párov.	Veľkosť populácie dosahuje 30 - 150 hniezdných párov.	Veľkosť populácie je nižšia ako 30 párov.
	1.2. Populačný trend za 10 rokov	Populácia stúpla o vyše 20 %.	Populácia je stabilná alebo s miernymi výkyvmi (do 20 %).	Pokles populácie o vyše 20 %.
	1.3. Areálový trend	Areál sa zväčšuje o viac ako 20 % počas 5 rokov.	Areál je stabilný, prípadne oscilácia (do 20 %) počas 5 rokov.	Areál sa zmenšuje o viac ako 10 % počas 5 rokov.
biotop	2.1. Hniezdny a potravný biotop	Lesné porasty s vhodnou vekovo-druhovo-priestorovou štruktúrou v lokalitách výskytu sú celistvé a presahujú 50 ha.	Lesné porasty s vhodnou vekovo-druhovo-priestorovou štruktúrou v lokalitách výskytu sú celistvé na ploche 25 - 50 ha.	Lesné porasty s vhodnou vekovo-druhovo-priestorovou štruktúrou v lokalitách výskytu nie sú celistvé a nepresahujú 25 ha.
ohrozenia	3.1. Populácia	Predačný tlak diviačej zveri a ich celkové stavy sú nízke (podpriemerné).	Predačný tlak zveri a ich celkové stavy sú na priemernej úrovni.	Predačný tlak diviačej zveri a ich celkové stavy sú vysoké (nadpriemerné).

	3.2. Hniezdny a potravný biotop	Vyše 90 % hniezdných a potravných biotopov ostáva do budúceho roka bez negatívnej zmeny (zmeny rôznorodosti vekovo-druhovo-priestorovej štruktúry drevín).	75 - 90 % hniezdných a potravných biotopov ostáva do budúceho roka bez negatívnej zmeny (zmeny rôznorodosti vekovo-druhovo-priestorovej štruktúry drevín).	Menej ako 75 % hniezdných a potravných biotopov ostáva do budúceho roka bez negatívnej zmeny (zmeny rôznorodosti vekovo-druhovo-priestorovej štruktúry drevín).
--	---------------------------------	--	--	---

Tabuľka č. 39: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu jariabok hôrny

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
<b>P</b>	1.1. Veľkosť populácie	1	3	3
	1.2. Populačný trend za 10 rokov	1	3	3
	1.3. Areálsový trend	1	3	3
<b>B</b>	2.1. Hniezdny a potravný biotop	3	3	9
	3.1. Populácia	1	3	3
<b>O</b>	3.2. Hniezdny a potravný biotop	2	2	4
	<b>Dosiahnutá hodnota spolu:</b>			<b>25</b>
Maximálna možná hodnota ( $\Sigma$ váh $\times$ 3):				51

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 40: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu jariabok hôrny

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	<b>54 - 33 %</b>
		<b>49 %</b>

### Zhodnotenie

Na základe zadefinovaných kritérií v celkovom hodnotení je jariabok hôrny v CHVÚ Strážovské vrchy v stave C - nepriaznivý s hodnotou 49 % z maximálnej možnej bodovej hodnoty stavu.

#### 1.6.3.1.14. Definovanie stavu druhu penica jarabá v CHVÚ Strážovské vrchy

### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa aktuálne odhaduje výskyt **30 - 40 hniezdných párov** (dáta z monitoringu), čo predstavuje menej ako 1 % slovenskej hniezdejnej populácie druhu (15 000). CHVÚ v súčasnom vymedzení hraníc nezahŕňa dostatok vhodných biotopov pre druh, veľká časť sa nachádza mimo aktuálnej hranice CHVÚ. Preto je pri prípadnej optimalizácii hraníc potrebné zvážiť príčlenenie niektorých lokalít umiestnených pri hranici územia. Trend populácie druhu v území sa klasifikuje ako stabilný s maximálnou zmenou  $\pm 20\%$ . Priemerná hustota populácie je v oblastiach výskytu v otvorenej poľnohospodárskej krajine s dostatkom vhodných biotopov od 0,16- 0,48 páru/10 ha. Hniezdne páry sú rozptýlené v poľnohospodárskej krajine podľa dostupnosti hniezdných biotopov. Biotopom sú polootvorené nelesné krovínové formácie s trnítými krami na výslnných kamenistých stráňach v teplých a suchých polohách, extenzívne obhospodarované, opustené a zarastajúce suché pasienky, krovité medze, remízky, okraje riedkych listnatých lesov, staré sady, vinice. Hlavné biotopy penice jarabej sú v Súľovských vrchoch a v južných okrajoch Nitrických vrchov, tiež na južne orientovaných stráňach s pasienkami s rozptýlenými krovinami v širšom okolí obce Valaská Belá do nadmorskej výšky 900 m. Napriek tomu, že rozloha biotopu je dostačne veľká a stabilná pre dlhodobé prežívanie populácie penice jarabej, je dôležité sledovať, aby sa práve kvalita biotopov nezhoršovala úplnou sukcesnou premenou na les (ako sa to v súčasnosti deje na južných

okrajoch CHVÚ v okolí Vesteníc) a na druhej strane intenzifikáciou poľnohospodárstva. Na niektorých lokalitách sa za posledné roky kvalita biotopov zhoršila v dôsledku veľkoplošného odstraňovania rozptýlenej zelene z poľnohospodárskych pozemkov pre neefektívne nastavený dotačný systém poľnohospodárskych platieb. Niektoré lokality zanikli aj v dôsledku zalesnenia pasienkov v južných okrajoch CHVÚ.

Tabuľka č. 41: Definovanie stavu druhu penica jarabá

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV			NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
populácia	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	Veľkosť populácie je vyššia ako 100 hniezdných párov.	Veľkosť populácie dosahuje 30 - 100 hniezdných párov.	Veľkosť populácie je nižšia ako 30 hniezdných párov.
	1.2. Populačný trend	Populácia stúpa za obdobie 5 rokov o vyše 20 %.	Populácia je za obdobie 5 rokov stabilná alebo osciluje do ±20 %.	Populácia klesá za obdobie 5 rokov o vyše 20 %.
	1.3. Veľkosť areálu	Viac ako 90 % tetrád kvadrátov DFS.	70 - 90 % tetrád kvadrátov DFS.	Menej ako 70 % tetrád kvadrátov DFS.
	1.4. Areálový trend	Areál je stabilný alebo sa zväčšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.	Areál je stabilný, zmeny sú v rozpätí ±20 % / 5 rokov.	Areál sa zmenšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.
biotop	2.1. Hniezdný biotop	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítych krov sú na viac ako 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítych krov sú na 50 - 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítych krov sú na menej ako 50 % rozlohy vhodených biotopov.
	2.2. Potravný biotop	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítych krov sú na viac ako 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítych krov sú na 50 - 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítych krov sú na menej ako 50 % rozlohy vhodených biotopov.
	2.3. Migračný biotop	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítych krov sú na viac ako 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítych krov sú na 50 - 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítych krov sú na menej ako 50 % rozlohy vhodených biotopov.
ohrozenia	3.1. Ohrozenie populácie	V hniezdom období (od 1. 5. do 31.7.) je na hniezdiskách neúmyselne vyrušovaná (pasenie, zber húb a pod.) na menej ako 10 % vhodných biotopov.	V hniezdom období (od 1. mája do 31.7.) je na hniezdiskách neúmyselne vyrušovaná (pasenie, zber húb a pod.) na 10 - 30 % vhodných biotopov.	V hniezdom období (od 1. mája do 31.7.) je na hniezdiskách neúmyselne vyrušovaná (pasenie, zber húb a pod.) na viac ako 30 % vhodných biotopov.
	3.2. Ohrozenie biotopu	Zanechanie tradičného obhospodarovania (kosenie, pasenie a pod.) a následná sukcesia sa prejavuje na menej ako 10 % plochy vhodných biotopov.	Zanechanie tradičného obhospodarovania (kosenie, pasenie a pod.) a následná sukcesia sa prejavuje na 10 - 30 % plochy vhodných biotopov.	Zanechanie tradičného obhospodarovania (kosenie, pasenie a pod.) a následná sukcesia sa prejavuje na viac ako 30 % plochy vhodných biotopov.

Tabuľka č. 42: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu penica jarabá

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
P	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
	1.4. Areálový trend	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	1	3	3
	2.2. Potravný biotop	1	2	2
	2.3. Migračný biotop	1	1	1
O	3.1. Ohrozenie populácie	2	3	6
	3.2. Ohrozenie biotopu	2	1	2
<b>Dosiahnutá hodnota spolu:</b>				<b>34</b>
Maximálna možná hodnota ( $\Sigma$ váh $\times$ 3):				60

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 43: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu penica jarabá

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
	57 %	

### Zhodnotenie

Populácia penice jarabej je v CHVÚ stabilná a celkový stav je hodnotený ako priemerný priaznivý - stupeň B.

#### 1.6.3.1.15. Definovanie stavu druhu ďateľ prostredný v CHVÚ Strážovské vrchy

##### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa odhaduje na **120 - 150 párov** (Karaska et al. 2015), čo predstavuje približne 2 % slovenskej hniezdznej populácie druhu (6 100+). Aktuálne je trend populácie hodnotený ako stabilný. Hustota populácie v hlavných biotopoch dosahuje priemerne 0,8 - 2 páry/100 ha. Rozšírenie druhu v CHVÚ je závislé od vhodnosti biotopov. Najvyššie hustoty boli zistené v južných častiach Strážovských vrchov s najväčším podielom zachovalých listnatých dubových a dubovo-bukových lesov s dostatočným zastúpením starých porastov. Početnejší je v južných oblastiach CHVÚ v Nitrických vrchoch, kde sú najsúvislejšie oblasti s výskytom starých ochranných lesov s podielom porastov pralesovitého charakteru (Rokoš, Kňaží stôl, Žrebíky, Baske). Výskyt bol zaznamenaný aj v čistých bučinách okolo Pružiny, avšak v omnoho nižšej hustote. Preferovaným biotopom sú zachovalé staré porasty (do 700-950 m n. m.), optimálne pralesovitého charakteru, čo zväčša splňajú ochranné lesy s dostatkom mŕtveho dreva. Druh je pomerne citlivý na fragmentáciu lesných porastov. Zastúpenie porastov vo veku nad 80 - 100 rokov v južnej časti CHVÚ Strážovské vrchy je v súčasnosti relativne ešte dostatočné pre stabilný trend populácie.

Tabuľka č. 44: Definovanie stavu druhu ďateľ prostredný

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV	
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
populácií	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	Veľkosť hniezdznej populácie je vyššia ako 200 párov.	Veľkosť hniezdznej populácie dosahuje 100 - 200 párov.	Veľkosť hniezdznej populácie je nižšia ako 100 párov.

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
1. Populačný trend	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov stúpa o viac ako 20 %.	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov je stabilná, s fluktuáciou do $\pm 20\%$ .	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov klesá o viac ako 20 %.
	Viac ako 90 % tetrád kvadrátov DFS.	70 - 90 % tetrád kvadrátov DFS.	Menej ako 70 % tetrád kvadrátov DFS.
	Areál je stabilný, alebo sa zväčšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.	Areál je stabilný, zmeny sú v rozpätí $\pm 20\% / 5$ rokov.	Areál sa zmenšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.
biotop	Viac ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 100 rokov.	Viac ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov.	Menej ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov.
	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 $m^3/ha$ zaberajú viac ako 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 $m^3/ha$ zaberajú 50 - 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 $m^3/ha$ zaberajú menej ako 50 % rozlohy lesov nad 80 rokov.
	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 $m^3/ha$ zaberajú viac ako 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 $m^3/ha$ zaberajú 50 - 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 $m^3/ha$ zaberajú menej ako 50 % rozlohy lesov nad 80 rokov.
ohrozenia	Podiel listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov za 5 rokov vzrástol o vyše 10 %.	Podiel listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov je za 5 rokov stabilný (tolerancia $\pm 10\%$ ).	Podiel listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov za 5 rokov poklesol o vyše 10 %.
	Bez veľkoplošného holorubného spôsobu obhospodarovania lesných porastov, pokles rozlohy starých listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov menej ako 5 %.	Veľkoplošné holoruby využívané na max. 10 % rozlohy lesov, pokles rozlohy starých listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov 5 - 10 %.	Veľkoplošné holoruby využívané na viac ako 10 % rozlohy lesov, pokles rozlohy starých listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov viac ako 10 %.

Tabuľka č. 45: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu ďatel prostredný

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
P	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6

	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
	1.4. Areálový trend	2	2	4
B	2.1. Hniezdný biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	2	4
O	2.3. Biotop významný počas zimovania	2	1	2
	3.1. Ohrozenie populácie	2	2	4
	3.2. Ohrozenie biotopu	2	1	2
<b>Dosiahnutá hodnota spolu:</b>				<b>38</b>
Maximálna možná hodnota ( $\sum$ váh $\times$ 3):				57

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 46: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu ďateľ prostredný

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
	67 %	

#### Zhodnotenie

Stav druhu ďateľ prostredný v CHVÚ Strážovské vrchy je hodnotený ako priemerný priaznivý – B.

#### 1.6.3.1.16. Definovanie stavu druhu muchárik červenohrdlý v CHVÚ Strážovské vrchy

##### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa odhaduje na **70 - 100 párov** muchárika červenohrdlého (dáta z monitoringu), čo predstavuje približne 1-1,4 % slovenskej hniezdznej populácie druhu (5 000-10 000). Bol zistený mierny pokles populácie so zmenou do - 50 %, hustota populácie v hlavných biotopoch dosahuje priemerne 0,5-0,62 párov/10 ha. Výskyt jedincov v území je roztrúsený, v závislosti od vhodnosti biotopov. Najvyššie hustoty boli zistené v častiach s najväčším podielom zachovalých listnatých a zmiešaných bukovo-jedľových lesov s dostatočným zastúpením starých porastov pralesovitého charakteru (lesné rezervácie a ochranné lesy). Typickým prostredím druhu sú staré listnaté až zmiešané lesy od bukovo-dubových po bukovo-jedľové lesy a najvyššie partie územia (1 200 m. n. m.) s dostatkom mŕtveho dreva a dutinových stromov. Početnejší je v severnej časti CHVÚ (Súľovské vrchy) a v centrálnej oblasti CHVÚ od Pruziny po Zliechov (masív Strážova), kde sú najsúvislejšie oblasti s výskytom ochranných lesov, prevažne podhorských bukových a bukovo-jedľových lesov s podielom porastov pralesovitého charakteru.

Tabuľka č. 47: Definovanie stavu druhu muchárik červenohrdlý

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV	
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
populácia	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	Hniezdna populácia je vyššia ako 200 párov.	Hniezdna populácia dosahuje 100 - 200 párov.	Hniezdna populácia je nižšia ako 100 párov.
	1.2. Populačný trend	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov stúpa o viac ako 20 %.	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov je stabilná, s fluktuáciou do $\pm 20 \%$ .	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov klesá o viac ako 20 %.
	1.3. Veľkosť areálu	Viac ako 90 % tetrád kvadrátov DFS.	50 - 90 % tetrád kvadrátov DFS.	Menej ako 50 % tetrád kvadrátov DFS.

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
1.4. Areálsový trend	Areál je stabilný, alebo sa zväčšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.	Areál je stabilný, zmeny sú v rozpätí ±20 % / 5 rokov.	Areál sa zmenšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.
<b>biotop</b>	2.1. Hniezdny biotop	Viac ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 100 rokov.	Viac ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov.
	2.2. Potravný biotop	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú viac ako 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú 50 - 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.
	2.3. Biotop významný počas migrácie	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú viac ako 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú menej ako 50 % rozlohy lesov nad 80 rokov.
<b>ohrozenia</b>	3.1. Ohrozenie populácie	Podiel listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov za 5 rokov vzrástol o vyše 10 %.	Podiel listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov je za 5 rokov stabilný (tolerancia ±10 %).
	3.2. Ohrozenie biotopu	Bez veľkoplošného holorubného spôsobu obhospodarovania lesných porastov, pokles rozlohy starých listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov menej ako 5 %.	Veľkoplošné holoruby využívané na max. 10 % rozlohy lesov, pokles rozlohy starých listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov 5 - 10 %.

Tabuľka č. 48: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu muchárik červenohrdlý

Kritérium	Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
P	1.1. Populačná hustota / veľkosť populácie	1	3
	1.2. Populačný trend	1	3
	1.3. Veľkosť areálu	2	2
	1.4. Areálsový trend	1	2
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3
	2.2. Potravný biotop	2	2
	2.3. Biotop významný počas migrácie	2	1
O	3.1. Ohrozenie populácie	2	2
	3.2. Ohrozenie biotopu	2	1

Dosiahnutá hodnota spolu:	32
Maximálna možná hodnota ( $\Sigma$ váh $\times$ 3):	57

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 49: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu muchárik červenohrdlý

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
	56 %	

### Zhodnotenie

V súčasnosti môžeme hodnotiť stav muchárika červenohrdlého v CHVÚ Strážovské vrchy ako priemerný priaznivý – B, avšak tento stav je iba tesne nad hranicou pre klasifikovanie druhu v stave C. Ďalšie zhoršenie hodnotenia jednotlivých kritérií priaznivého stavu povedie aj k celkovej zmene stavu.

#### 1.6.3.1.17. Definovanie stavu druhu muchárik bielokrký v CHVÚ Strážovské vrchy

##### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa odhaduje populácia muchárika bielokrkého na úrovni na **800 - 1 300 párov** (dáta z monitoringu), čo predstavuje približne 1 % slovenskej hniezdnej populácie druhu (70 000-150 000 párov). Trend populácie je hodnotený ako stabilný. Hustota populácie v hlavných biotopoch dosahuje premerne 2 páry/10 ha. Výskyt jedincov v území je roztrúsený, v závislosti od vhodnosti biotopov. Najvyššie hustoty boli zistené v častiach s najväčším podielom zachovalých listnatých a zmiešaných lesov s dostatočným zastúpením starších lesných porastov s dostatkom dutín (ochranné lesy vyššieho veku, lesné porasty nad 80 rokov a lesy s podielom porastov pralesovitého charakteru, napr. lokality Strážov, Rokoš, Baske, Súľovské skaly, Podhradská lesostep, Ostrá Malenica). Biotopmi druhu sú staré listnaté až zmiešané lesy od dubových po bukovo-jedľové lesy po najvyššie partie územia (1 200 m. n. m.). Vyhýba sa smrekovým a borovicovým porastom, taktiež mladinám a mladým porastom bez dostatku dutinových stromov.

Tabuľka č. 50: Definovanie stavu druhu muchárik bielokrký

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV	
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
populácia	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	Hniezdna populácia je vyššia ako 1 500 párov.	Hniezdna populácia dosahuje 500 – 1 500 párov.	Hniezdna populácia je menšia ako 500 párov.
	1.2. Populačný trend	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov stúpa o viac ako 20 %.	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov je stabilná, s fluktuáciou do $\pm 20\%$ .	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov klesá o viac ako 20 %.
	1.3. Veľkosť areálu	Viac ako 90 % tetrád kvadrátov DFS.	70-90 % tetrád kvadrátov DFS.	Menej ako 70 % tetrád kvadrátov DFS.
	1.4. Areálový trend	Areál je stabilný, alebo sa zväčšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.	Areál je stabilný, zmeny sú v rozpätí $\pm 20\% / 5$ rokov.	Areál sa zmenšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.
biotop	2.1. Hniezdny biotop	Viac ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú listnaté a zmiešané lesy	Viac ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú listnaté a zmiešané lesy	Menej ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú listnaté a zmiešané lesy

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
<b>O</b> hrozenia		s prevahou listnatých drevín nad 100 rokov.	s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov.
	2.2. Potravný biotop	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú viac ako 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú 50 - 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.
	2.3. Biotop počas zimovania	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú viac ako 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú menej ako 50 % rozlohy lesov nad 80 rokov.
	3.1. Ohrozenie populácie	Podiel listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov za 5 rokov vzrástol o vyše 10 %.	Podiel listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov je za 5 rokov stabilný (tolerancia ±10 %).
	3.2. Ohrozenie biotopu	Bez veľkoplošného holorubného spôsobu obhospodarovania lesných porastov, pokles rozlohy starých listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov menej ako 5 %.	Veľkoplošné holoruby využívané na max. 10 % rozlohy lesov, pokles rozlohy starých listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov 5 - 10 %.

Tabuľka č. 51: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu muchárik bielokrký

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
<b>P</b>	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
	1.4. Areálový trend	2	2	4
<b>B</b>	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	2	4
	2.3. Biotop počas zimovania	2	1	2
<b>O</b>	3.1. Ohrozenie populácie	2	2	4
	3.2. Ohrozenie biotopu	2	1	2
<b>Dosiahnutá hodnota spolu:</b>				<b>38</b>
Maximálna možná hodnota ( $\sum$ váh × 3):				57

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 52: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu muchárik bielokrký

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
	67 %	

### Zhodnotenie

V súčasnosti môžeme hodnotiť stav muchárika bielokrkého v CHVÚ Strážovské vrchy ako priemerný priaznivý – B.

#### 1.6.3.1.18. Definovanie stavu druhu strakoš červenochrbtý v CHVÚ Strážovské vrchy

##### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa odhaduje výskyt **300 - 400 hniezdných párov** strakoša červenochrbtého (Karaska et al. 2015). Trend populácie je klasifikovaný ako mierny pokles o 20-50 %, pravdepodobne spôsobený zmenou a poškodzovaním biotopov (odstraňovanie poľných remízok a krovín mulčovaním a na druhej strane zmenou na les). Priemerná hustota populácie je v oblastiach výskytu v otvorennej poľnohospodárskej krajine 0,8-2 páry /10ha. Hniezdne páry sú rozptýlené v poľnohospodárskej krajine podľa dostupnosti hniezdných biotopov. Biotopom sú polootvorené nelesné krovínové formácie s trnítymi krami a solitérne stromy v teplých a suchých polohách, extenzívne obhospodarované, opustené a zarastajúce suché pasienky, lúky, krovitέ medze, remízky, okraje redších listnatých lesov, staré sady, vinice, záhrady a parky. Hlavné biotopy strakoša červenochrbtého sa nachádzajú v Súľovských vrchoch a v južných okrajoch Strážovských vrchov, tiež v centrálnej časti - Čičmany, Zliechov, Valaská Belá, kde je krajina ovplyvnená tradičným ovčiarstvom a lazničkým osídlením v minulosti, krajinná mozaika je pestrá s dôstatkom rozptýlenej zelene.

Napriek tomu, že rozloha biotopu je dostačne veľká a stabilná, pre dlhodobé prežívanie populácie strakoša červenochrbtého je dôležité sledovať, aby sa práve kvalita nezhoršovala intenzifikáciou poľnohospodárstva. Na niektorých lokalitách sa za posledné roky kvalita biotopov zhoršila v dôsledku veľkoplošného odstraňovania rozptýlenej zelene z poľnohospodárskych pozemkov pre neefektívne nastavený dotačný systém poľnohospodárskych platieb. Niektoré lokality zanikli aj v dôsledku zalesnenia pasienkov a lúk, najmä v oblasti Súľovských vrchov.

Tabuľka č. 53: Definovanie stavu druhu strakoš červenochrbtý

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV	
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
populácia	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	Veľkosť populácie je vyššia ako 1 200 hniezdných párov.	Veľkosť populácie dosahuje 300 – 1 200 hniezdných párov.	Veľkosť populácie je nižšia ako 300 hniezdných párov.
	1.2. Populačný trend	Populácia stúpa za obdobie 5 rokov o viac ako 20 %.	Populácia je za obdobie 5 rokov stabilná alebo osciluje do ±20 %.	Populácia klesá za obdobie 5 rokov o viac ako 20 %.
	1.3. Veľkosť areálu	Viac ako 90 % tetrád kvadrátov DFS.	70 - 90 % tetrád kvadrátov DFS.	Menej ako 70 % tetrád kvadrátov DFS.
	1.4. Areálový trend	Areál je stabilný, alebo sa zväčšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.	Areál je stabilný, zmeny sú v rozpätí ±20 % / 5 rokov.	Areál sa zmenšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.
biotop	2.1. Hniezdný biotop	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dôstatkom trnítých krov sú na viac ako 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dôstatkom trnítých krov sú na 50 - 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dôstatkom trnítých krov sú na menej ako 50 % rozlohy vhodných biotopov.

<b>ohrozenia</b>	2.2. Potravný biotop	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov sú na viac ako 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov sú na 50 - 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov sú na menej ako 50 % rozlohy vhodených biotopov.
	2.3. Migračný biotop	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov sú na viac ako 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov sú na 50 - 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov sú na menej ako 50 % rozlohy vhodených biotopov.
<b>P</b>	3.1. Ohrozenie populácie	V hniezdom období (od 1. 5. do 31.7.) je na hniezdiskách neúmyselne vyrušovaná (pasenie, zber húb a pod.) na menej ako 10 % vhodných biotopov.	V hniezdom období (od 1. mája do 31.7.) je na hniezdiskách neúmyselne vyrušovaná (pasenie, zber húb a pod.) na 10 - 30 % vhodných biotopov.	V hniezdom období (od 1. mája do 31.7.) je na hniezdiskách neúmyselne vyrušovaná (pasenie, zber húb a pod.) na viac ako 30 % vhodných biotopov.
	3.2. Ohrozenie biotopu	Zanechanie tradičného obhospodarovania (kosenie, pasenie a pod.) a následná sukcesia sa prejavuje na menej ako 10 % plochy vhodných biotopov.	Zanechanie tradičného obhospodarovania (kosenie, pasenie a pod.) a následná sukcesia sa prejavuje na 10 - 30 % plochy vhodných biotopov.	Zanechanie tradičného obhospodarovania (kosenie, pasenie a pod.) a následná sukcesia sa prejavuje na viac ako 30 % plochy vhodných biotopov.

Tabuľka č. 54: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu strakoš červenochrbtý

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
<b>P</b>	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	1	3	3
	1.3. Veľkosť areálu	3	2	6
	1.4. Areálový trend	2	2	4
<b>B</b>	2.1. Hniezdny biotop	1	3	3
	2.2. Potravný biotop	1	2	2
	2.3. Migračný biotop	1	1	1
<b>O</b>	3.1. Ohrozenie populácie	2	3	6
	3.2. Ohrozenie biotopu	2	1	2
<b>Dosiahnutá hodnota spolu:</b>				<b>33</b>
Maximálna možná hodnota ( $\Sigma$ váh $\times$ 3):				60

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 55: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu strakoš červenochrbtý

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
	55 %	

### Zhodnotenie

Stav strakoša červenochrbtého v CHVÚ je celkovo hodnotený ako priemerný priaznivý (stupeň B), no toto hodnotenie je na dolnej hranici intervalu stupňa B. Pri ďalšom zhoršení stavu druhu môže jeho hodnotenie klesnúť na stupeň C – nepriaznivý.

#### 1.6.3.1.19. Definovanie stavu druhu strakoš sivý v CHVÚ Strážovské vrchy

##### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa odhaduje aktuálny výskyt **3 - 4 hniezdných párov** (dáta z monitoringu), čo predstavuje približne 1 % slovenskej hniezdznej populácie druhu (500-1 000). Trend populácie strakoša sivého je klasifikovaný ako mierny pokles. Priemerná hustota populácie je v oblastiach výskytu v otvorennej poľnohospodárskej krajine 0,32 párov/100 ha. Hniezdzne páry sú rozptýlené v poľnohospodárskej krajine podľa kvality hniezdných a potravných biotopov. Biotopom je krajina s dostatkom zachovalých lúk, podmáčaných lúk, pasienkov s krami a solitérnymi stromami, stromoradiami v podhorských oblastiach CHVÚ. Hlavné biotopy strakoša sivého sa nachádzajú v centrálnej časti CHVÚ Strážovské vrchy - v okolí obcí Čičmany, Zliechov, Valaská Belá, kde je krajina ovplyvnená tradičným ovčiarstvom a lazničkým osídlením v minulosti, krajinná mozaika je pestrá s dostatkom rozptýlenej zelene. Napriek tomu, že rozloha biotopu je dostatočne veľká a stabilná pre dlhodobé prežívanie populácie strakoša sivého, je dôležité sledovať, aby sa práve kvalita nezhoršovala intenzifikáciou poľnohospodárstva. Na niektorých lokalitách sa za posledné roky kvalita biotopov zhoršila v dôsledku odstraňovania rozptýlenej zelene (remízok a stromoradí) z poľnohospodárskych pozemkov pre neefektívne nastavený dotačný systém poľnohospodárskych platieb a zhodnocovanie biomasy ako paliva.

Tabuľka č. 56: Definovanie stavu druhu strakoš sivý

Kritéria hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV	
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
populácia	1.1. Veľkosť populácie	V CHVÚ sa vyskytuje viac ako 15 hniezdných párov za obdobie 5 rokov.	V CHVÚ sa vyskytuje 5 - 15 hniezdných párov za obdobie 5 rokov.	V CHVÚ sa vyskytuje do 5 hniezdných párov, za obdobie 5 rokov.
	1.2. Populačný trend	Populácia za obdobie 5 rokov rastie o minimálne 20 %.	Populácia za obdobie 5 rokov je stabilná, alebo kolíše do 10 %.	Populácia sa za obdobie 5 rokov klesá o viac ako 10 %.
	1.3. Veľkosť areálu	Hniezdzne lokality sa nachádzajú na viac ako 30 % poľnohospodárskych pozemkov.	Hniezdzne lokality sa nachádzajú na 10 až 30 % poľnohospodárskych pozemkov.	Hniezdzne lokality sa nachádzajú na menej ako 10 % poľnohospodárskych pozemkov.
	1.4. Areálový trend	Počet obsadených hniezdných lokalít stúpa minimálne o 20 % za obdobie 5 rokov.	Počet obsadených hniezdných lokalít je stabilný, alebo kolíše v rozsahu do 20 % za obdobie 5 rokov.	Počet obsadených hniezdných lokalít klesá za obdobie 5 rokov o viac ako 20 %.
biotop	2.1. Hniezdný biotop	Mozaikovitá poľnohospodárska krajina s rozptýlenou zeleňou pokrýva minimálne 50 % výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ.	Mozaikovitá poľnohospodárska krajina s rozptýlenou zeleňou pokrýva 30 - 50 % výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ.	Mozaikovitá poľnohospodárska krajina s rozptýlenou zeleňou pokrýva menej ako 30 % výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ.
	2.2. Potravný biotop	Výmera TTP z celkovej rozlohy CHVÚ rastie o viac ako 10 % za 5 rokov.	Výmera TTP z celkovej rozlohy CHVÚ kolíše v rozsahu do 10 % za obdobie 5 rokov.	Výmera TTP z celkovej rozlohy CHVÚ klesá o viac ako 10 % za obdobie 5.
	2.3. Migračný biotop	Výmera TTP z celkovej rozlohy CHVÚ rastie o viac ako 10 % za 5 rokov.	Výmera TTP z celkovej rozlohy CHVÚ kolíše v rozsahu do 10 % za obdobie 5 rokov.	Výmera TTP z celkovej rozlohy CHVÚ klesá o viac ako 10 % za obdobie 5.

	3.1. Ohrozenie populácie	Na hniezdných lokalitách neboli zaznamenaný žiadny výrub stromov vhodných na hniezdenie za obdobie 5 rokov.	Na hniezdných lokalitách neboli zaznamenaný výrub hniezdných stromov a žiadny výrub stromov vhodných na hniezdenie v hniezdom období za obdobie 5 rokov.	Na hniezdných lokalitách bol zaznamenaný výrub hniezdných stromov alebo výrub v hniezdom období za obdobie 5 rokov.
<b>ohrozenia</b>	3.2. Ohrozenie biotopu	Podiel mozaikovej poľnohospodárskej krajiny s rozptýlenou zeleňou rastie o viac ako 10 % z celkovej výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ za 5 rokov.	Podiel mozaikovej poľnohospodárskej krajiny s rozptýlenou zeleňou je stabilný, s výkyvmi do 10 % z výmery poľnohospodárskych pozemkov CHVÚ za 5 rokov.	Podiel mozaikovej poľnohospodárskej krajiny s rozptýlenou zeleňou sa znížil o viac ako 10 % výmery poľnohospodárskych pozemkov v CHVÚ za 5 rokov.

Tabuľka č. 57: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu strakoš sivý

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
<b>P</b>	1.1. Veľkosť populácie	1	3	3
	1.2. Populačný trend	1	3	3
	1.3. Veľkosť areálu	1	2	2
	1.4. Areálsový trend	2	2	4
<b>B</b>	2.1. Hniezdný biotop	1	3	3
	2.2. Potravný biotop	2	2	2
	2.3. Migračný biotop	2	2	2
<b>O</b>	3.1. Populácia	3	2	6
	3.2. Biotop	2	3	6
<b>Dosiahnuté body</b>				<b>31</b>
Možný počet bodov				66

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 58: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu strakoš sivý

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
		47 %

### Zhodnotenie

Na základe uvedených kritérií hodnotenia bol celkový stav druhu strakoš sivý klasifikovaný ako nepriaznivý - stupeň C.

#### 1.6.3.1.20. Definovanie stavu druhu prepelica poľná v CHVÚ Strážovské vrchy

##### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa odhaduje veľkosť populácie prepelice poľnej na **25 - 40 párov** (dáta z monitoringu), čo predstavuje približne 1 % slovenskej hniezdnej populácie druhu (2 000-6 000). Trend populácie sa klasifikuje ako stabilný s maximálnou zmenou  $\pm 20\%$ . Hustota populácie sa pohybuje v hlavných biotopoch od 0,48 do 0,8 páru/10 ha. Prepelica poľná sa vyskytuje v najvyšších hustotách v severnej časti CHVÚ (Súľovská kotlina, okolie obcí Bodina, Prečín, Vrchteplá) a v centrálnej časti CHVÚ v okolí Čičmian, Zliechova, Valaskej Belej, kde

sa nachádza vysoký podiel zachovalých, podmáčaných, mokrých lúk a maloplošne obhospodarovanej ornej pôdy. V CHVÚ Strážovské vrchy sú biotopmi najmä extenzívne obhospodarované lúky, často s prítomnosťou rozptylených krovín alebo ruderálnej vegetácie, vyskytuje sa tiež na kultúrnych kosných lúkach, v lucerne, obilných poliach alebo podmáčaných lúkach. Hlavnými oblasťami výskytu sú časti dolín s poľnohospodárskou krajinou v Strážovských a Súľovských vrchoch.

Tabuľka č. 59: Definovanie stavu druhu prepelica poľná

Kritéria hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV	
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
populácia	1.1. Veľkosť populácie	V CHVÚ sa vyskytuje viac ako 100 volajúcich samcov za obdobie 5 rokov.	VCHVÚ sa vyskytuje 20 - 100 volajúcich samcov za obdobie 5 rokov.	V CHVÚ sa vyskytuje do 20 volajúcich samcov za obdobie 5 rokov.
	1.2. Populačný trend	Populácia za obdobie 5 rokov rastie o minimálne 20 %.	Populácia za obdobie 5 rokov je stabilná s výkyvmi do $\pm 20\%$ .	Populácia za obdobie 5 rokov klesá o viac ako 20 %.
	1.3. Veľkosť areálu	Volajúce samce sú zaznamenané na viac ako 75 % poľnohospodárskych pozemkov počas 5 rokov.	Volajúce samce sú zaznamenané na 50 - 75 % poľnohospodárskych pozemkov počas 5 rokov.	Volajúce samce sú zaznamenané na menej ako 50 - 75 % poľnohospodárskych pozemkov počas 5 rokov.
	1.4. Areálový trend	Počet miest s volajúcimi samcami stúpa minimálne o 20 % za obdobie 5 rokov.	Počet miest s volajúcimi samcami je stabilný, prípadne kolíše v rozsahu 20 % za obdobie 5 rokov.	Počet miest s volajúcimi samcami klesá za obdobie 5 rokov o viac ako 20 %.
biotop	2.1. Hniezdny biotop	Poloprirodzené a prirodzené lúky kosené 1x ročne zaberajú viac ako 30 % poľnohospodárskych pozemkov.	Poloprirodzené a prirodzené lúky kosené 1x ročne zaberajú 20 - 30 % poľnohospodárskych pozemkov.	Poloprirodzené a prirodzené lúky kosené 1x ročne zaberajú menej ako 20 % poľnohospodárskych pozemkov.
	2.2. Potravny biotop	Výmera TTP v CHVÚ rastie o viac ako 5 % za obdobie 5 rokov*1.	Zmeny vo výmere TTP v CHVÚ nepresahujú 5 % za obdobie 5 rokov*1.	Výmera TTP v CHVÚ klesá o viac ako 5 % za obdobie 5 rokov *1.
	2.3. Biotopy počas migrácie	Počas obdobia migrácie (august – september) tvorí rozsah nevykosených plôch alebo iných bylinných porastov vyšších ako 30 cm, viac ako 10 % otvorennej krajiny.	Počas obdobia migrácie (august – september) tvorí rozsah nevykosených plôch alebo iných bylinných porastov vyšších ako 30 cm 5 - 10 % otvorennej krajiny.	Počas obdobia migrácie (august – september) je rozsah nevykosených plôch alebo iných bylinných porastov vyšších ako 30 cm menej ako 5 % otvorennej krajiny.
	3.1. Nepriame ohrozenie druhu	Viac ako 70 % lokalít je v čase hniezdenia (15.5. – 1.8.) bez agrotechnických a iných negatívnych zásahov, za obdobie 5 rokov *2.	45 - 70 % lokalít je v čase hniezdenia(15.5. – 1.8.) bez agrotechnických a iných negatívnych zásahov, za obdobie 5 rokov*2.	Menej ako 45 % lokalít je v čase hniezdenia bez agrotechnických a iných negatívnych zásahov, za obdobie 5 rokov *2.
ohrozenia	3.2. Priame ohrozenie druhu	Viac ako 75 % lúk v CHVÚ je kosených spôsobom od stredu k okrajom alebo pásmi.	50 - 75 % lúk v CHVÚ je kosených spôsobom od stredu k okrajom alebo pásmi.	Menej ako 50 % lúk v CHVÚ je kosených od stredu k okrajom alebo pásmi.

	3.3. Deštrukcia hniezdných a potravných biotopov	Stav biotopu sa na lokalitách nezhoršil za obdobie 5 rokov * <sup>3</sup> .	Stav biotopu sa zhoršil na menej ako 30 % lokalít za obdobie 5 rokov* <sup>3</sup> .	Stav biotopu sa zhoršil na viac ako 30 % lokalít za obdobie 5 rokov * <sup>3</sup> .
--	--	---	--	--

\*<sup>1</sup> K znižovaniu výmery TTP môže dôjsť jednak zastavaním, rozoraním, zalesnením a podobne. Je vhodné vychádzať z aktuálnych podkladov skutočného stavu napr. jednotiek LPIS (nie údajov podľa katastra, nakoľko stav katastra neodráža skutočný stav).

\*<sup>2</sup> Najmä kosenie, intenzívna pastva, mulčovanie, hnojenie a iná činnosť ktorá by mohla spôsobiť priame usmrtenie mláďat alebo dospelých jedincov

\*<sup>3</sup> Zhoršenie stavu biotopu môže predstavovať – zalesnenie (prirodzené sukcesiou, alebo zámerné, zmena trvalého trávneho porastu na pasienok alebo ornú pôdu, zmena úhoru alebo prirodzenej lúky na intenzívne obhospodarovaný trávnatý porast, vyrovnanie medzí, odvodnenie a podobne. Naopak zlepšenie biotopu môže predstavovať premenu časti ornej pôdy na trávnatý porast, zmena pasienka na kosnú lúku a podobne.

Tabuľka č. 60: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu prepelica poľná

	Kritérium	Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
	1.4. Areálsový trend	2	2	4
B	2.1. Hniezdný	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	2	4
	2.3. Biotopy počas migrácie	2	3	6
O	3.1. Nepriame ohrozenie druhu	1	3	3
	3.2. Priame ohrozenie druhu	1	2	2
	3.3. Deštrukcia hniezdných a potravných biotopov	2	3	6
<b>Dosiahnuté body</b>				<b>47</b>
Možný počet bodov				78

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 61: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu prepelica poľná

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
	60 %	

### Zhodnotenie

Na základe zadefinovaných kritérií hodnotenia je druh prepelica poľná v celkovom hodnotení klasifikovaný v CHVÚ Strážovské vrchy do priaznivého stavu B – priemerný s hodnotou 60 %.

#### 1.6.3.1.21. Definovanie stavu druhu krutihlav hnedý v CHVÚ Strážovské vrchy

##### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa odhaduje výskyt **45 - 95 hniezdných párov** krutihlava hnedého (Karaska et al. 2015), čo predstavuje približne 2 % slovenskej hniezdnej populácie druhu (2 500 - 4 000). Trend populácie je klasifikovaný ako stabilný so zmenou do 20 %. Priemerná hustota populácie je v oblastiach výskytu v otvorenej poľnohospodárskej krajine 0,32 - 0,48 páru/10 ha. Hniezdzne páry sú rozptýlené v poľnohospodárskej krajine podľa vhodnosti potravných biotopov a hniezdných možností. Biotopom je zachovalá poľnohospodárska krajina s pestrou mozaikovitou štruktúrou s dostatkom rozptýlenej zelene (poľné lesíky, okraje lesov, brehové porasty a staré ovocné extenzívne obhospodarované sady a záhrady) s dostatkom

stromových dutín a mravenísk. Ťažiskom výskytu týchto biotopov sú okraje lesných oblastí susediacich s otvorenou zachovalou poľnohospodárskou krajinou, najmä v nižších polohách do 600 m n. m. Rozšírený je rozptýlene po celom CHVÚ, okrem súvislých lesných komplexov. Typickým prostredím krutihlav hnedého sú extenzívne obhospodarované, opustené staré sady, vinice, záhrady, okraje redších listnatých lesov, poľné lesíky a brehové porasty s prítomnosťou dutinových stromov. Podmienkou je prítomnosť dostatočného množstva mravenísk ako zdroja potravy. Rozšírený je pomerne rovnomerne v otvorenej krajine CHVÚ okrem súvislejších komplexov lesov. Zastúpenie vhodných biotopov je v území pomerne malé percento rozlohy CHVÚ. Pomerne pravidelne sa vyskytuje v Súľovských vrchoch a južných okrajoch CHVÚ, od Hornej Poruby juhozápadným smerom.

Tabuľka č. 62: Definovanie stavu druhu krutihlav hnedý

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV			NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
populácia	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	Veľkosť populácie je vyššia ako 150 hniezdných párov.	Veľkosť populácie dosahuje 50 - 150 hniezdných párov.	Veľkosť populácie je nižšia ako 50 hniezdných párov.
	1.2. Populačný trend	Populácia stúpa za obdobie 5 rokov o vyše 20 %.	Populácia je za obdobie 5 rokov stabilná alebo osciluje do ±20 %.	Populácia klesá za obdobie 5 rokov o vyše 20 %.
	1.3. Veľkosť areálu	Viac ako 90 % tetrád kvadrátov DFS.	70 - 90 % tetrád kvadrátov DFS.	Menej ako 70 % tetrád kvadrátov DFS.
	1.4. Areálsový trend	Areál je stabilný, alebo sa zväčšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.	Areál je stabilný, zmeny sú v rozpätí ±20 % / 5 rokov.	Areál sa zmenšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.
biotop	2.1. Hniezdný biotop	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, NDV sú na viac ako 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, NDV sú na 50 - 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, NDV sú na menej ako 50 % rozlohy vhodených biotopov.
	2.2. Potravný biotop	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, NDV sú na viac ako 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, NDV sú na 50 - 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, NDV sú na menej ako 50 % rozlohy vhodených biotopov.
	2.3. Migračný biotop	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, NDV sú na viac ako 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, NDV sú na 50 - 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, NDV sú na menej ako 50 % rozlohy vhodených biotopov.
ohrozenia	3.1. Ohrozenie populácie	V hniezdom období (od 1. 5. do 31.7.) je na hniezdiskách neúmyselné vyrušovaná (pasenie, zber húb a pod.) na menej ako 10 % vhodných biotopov.	V hniezdom období (od 1. mája do 31.7.) je na hniezdiskách neúmyselné vyrušovaná (pasenie, zber húb a pod.) na 10 - 30 % vhodných biotopov.	V hniezdom období (od 1. mája do 31.7.) je na hniezdiskách neúmyselné vyrušovaná (pasenie, zber húb a pod.) na viac ako 30 % vhodných biotopov.
	3.2. Ohrozenie biotopu	Zanechanie tradičného obhospodarovania (kosenie, pasenie a pod.) a následná sukcesia sa prejavuje na menej ako 10 % plochy vhodných biotopov.	Zanechanie tradičného obhospodarovania (kosenie, pasenie a pod.) a následná sukcesia sa prejavuje na 10 - 30 % plochy vhodných biotopov.	Zanechanie tradičného obhospodarovania (kosenie, pasenie a pod.) a následná sukcesia sa prejavuje na viac ako 30 % plochy vhodných biotopov.

Tabuľka č. 63: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu krutihlav hnedý

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
P	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
	1.4. Areálový trend	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	2	4
	2.3. Migračný biotop	2	1	2
O	3.1. Ohrozenie populácie	2	3	6
	3.2. Ohrozenie biotopu	2	1	2
Dosiahnutá hodnota spolu:				40
Maximálna možná hodnota ( $\Sigma$ váh $\times$ 3):				60

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 64: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu krutihlav hnedý

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
	67 %	

### Zhodnotenie

Stav krutihlava hnedého v CHVÚ je hodnotený stupňom B - priemerný priaznivý.

#### 1.6.3.1.22. Definovanie stavu druhu príhaviar čiernochlavý v CHVÚ Strážovské vrchy

##### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa odhaduje výskyt **40 - 65 hniezdných párov** príhaviara čiernochlavého (dáta z monitoringu). CHVÚ nezahŕňa v súčasnom vymedzení hraníc dostatok vhodných biotopov pre druh, ich veľká časť sa nachádza mimo hranice CHVÚ. Preto je vhodné zvážiť príčlenie niektorých lokalít priľahlých ku CHVÚ pri prípadnej optimalizácii hraníc. Trend populácie príhaviara je klasifikovaný ako stabilný s maximálnou zmenou  $\pm 20\%$ . Priemerná hustota populácie je v oblastiach výskytu v otvorenej poľnohospodárskej krajine 0,48 - 0,8 páru/10ha. Hniezdne páry sú rozptýlené v poľnohospodárskej krajine podľa dostupnosti hniezdných biotopov. Optimálnym biotopom druhu je zachovalá pestrá poľnohospodárska krajina s dostatkom remízok, kde nachádza vhodné miesta na hniezdenie a biotopy poskytujú dostatok hmyzu ako zdroja potravy. CHVÚ Strážovské vrchy zahŕňa len málo poľnohospodárskej krajiny, preto aj tento druh nie je v území príliš početný. Typickým prostredím je otvorená poľnohospodárska krajina s dostatkom remízok, na ktorých nachádza vyvýšené posedy z vegetácie na lov potravy. Využíva často ruderálne plochy, priekopy okolo poľných ciest, okrajové plochy ornej pôdy a trávne porasty zarastené burinou. Biotopy príhaviara čiernochlavého sa v CHVÚ Strážovské vrchy vyskytujú rozptýlene v mozaikovitej poľnohospodárskej krajine. Druh je rozšírený mozaikovite v celom CHVÚ, okrem lesných oblastí. Najpočetnejší je v oblasti Čičmian, Zliechova, Valaskej Belej.

Tabuľka č. 65: Definovanie stavu druhu príhľaviar čiernochhlavý

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV			NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý	
populácia	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	Veľkosť populácie je vyššia ako 120 hniezdných párov.	Veľkosť populácie dosahuje 40 - 120 hniezdných párov.	Veľkosť populácie je nižšia ako 40 hniezdných párov.
	1.2. Populačný trend	Populácia stúpa za obdobie 5 rokov o vyše 20 %.	Populácia je za obdobie 5 rokov stabilná alebo osciluje do $\pm 20\%$ .	Populácia klesá za obdobie 5 rokov o vyše 20 %.
	1.3. Veľkosť areálu	Viac ako 90 % tetrád kvadrátov DFS.	70 - 90 % tetrád kvadrátov DFS.	Menej ako 70 % tetrád kvadrátov DFS.
	1.4. Areálový trend	Areál je stabilný alebo sa zväčšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.	Areál je stabilný, zmeny sú v rozpätí $\pm 20\%$ / 5 rokov.	Areál sa zmenšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.
biotop	2.1. Hniezdný biotop	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, remízok vegetácie sú na viac ako 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, remízok vegetácie sú na 50 - 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, remízok vegetácie sú na menej ako 50 % rozlohy vhodných biotopov.
	2.2. Potravný biotop	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, remízok vegetácie sú na viac ako 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, remízok vegetácie sú na 50 - 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, remízok vegetácie sú na menej ako 50 % rozlohy vhodných biotopov.
	2.3. Migračný biotop	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, remízok vegetácie sú na viac ako 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, remízok vegetácie sú na 50 - 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, remízok vegetácie sú na menej ako 50 % rozlohy vhodných biotopov.
ohrozenia	3.1. Ohrozenie populácie	V hniezdom období (od 1. 5. do 31.7.) je na hniezdiskách neúmyselne vyrušovaná (pasenie, zber húb a pod.) na menej ako 10 % vhodných biotopov.	V hniezdom období (od 1. mája do 31.7.) je na hniezdiskách neúmyselne vyrušovaná (pasenie, zber húb a pod.) na 10 - 30 % vhodných biotopov.	V hniezdom období (od 1. mája do 31.7.) je na hniezdiskách neúmyselne vyrušovaná (pasenie, zber húb a pod.) na viac ako 30 % vhodných biotopov.
	3.2. Ohrozenie biotopu	Zanechanie tradičného obhospodarovania (kosenie, pasenie a pod.) a následná sukcesia sa prejavuje na menej ako 10 % plochy vhodných biotopov.	Zanechanie tradičného obhospodarovania (kosenie, pasenie a pod.) a následná sukcesia sa prejavuje na 10 - 30 % plochy vhodných biotopov.	Zanechanie tradičného obhospodarovania (kosenie, pasenie a pod.) a následná sukcesia sa prejavuje na viac ako 30 % plochy vhodných biotopov.

Tabuľka č. 66: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu príhľaviar čiernochhlavý

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
P	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4

	1.4. Areálový trend	2	2	4
B	2.2. Hniezdný biotop	2	3	6
	2.3. Potravný biotop	2	2	4
O	2.4. Migračný biotop	2	1	2
	3.2. Ohrozenie populácie	2	3	6
	3.3. Ohrozenie biotopu	2	1	2
<b>Dosiahnutá hodnota spolu:</b>				<b>40</b>
Maximálna možná hodnota ( $\Sigma$ váh $\times$ 3):				60

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 67: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu príhľaviar čiernohlavý

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
	67 %	

### Zhodnotenie

Stav príhľaviara čiernohlavého v CHVÚ je hodnotený ako priemerný priaznivý - stupeň B.

#### 1.6.3.1.23. Definovanie stavu druhu hrdlička poľná v CHVÚ Strážovské vrchy

### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa odhaduje výskyt **80 - 120 hniezdných párov** hrdličky poľnej (dáta z monitoringu), čo predstavuje približne 5 % slovenskej hniezdznej populácie druhu. Trend populácie hrdličky je klasifikovaný ako stabilný so zmenou do 20 %. Priemerná hustota populácie dosahuje v oblastiach výskytu v otvorenej poľnohospodárskej krajine 0,32 páru/10 ha. Hniezdne páry sú rozptýlené v poľnohospodárskej krajine podľa vhodnosti biotopov. Biotopom je zachovalá poľnohospodárska krajina s pestrou mozaikovitou štruktúrou s dostatkom rozptýlenej zelene (krovité remízky, poľné lesíky, okraje lesov s vyuvinutým krovitým prechodom, brehové porasty a staré ovocné extenzívne obhospodarované sady a záhrady). Čažisko výskytu týchto biotopov sú južné okraje lesných oblastí susediace s otvorenou zachovalou poľnohospodárskou krajinou. Rozšírená je rozptýlene po celom území CHVÚ. Vyhýba sa súvislým lesom, je pomerne rovnomerne rozšírený v otvorenej krajine CHVÚ. Vystupuje do 1 300 m n. m.

Tabuľka č. 68: Definovanie stavu druhu hrdlička poľná

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
populácia	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	Veľkosť populácie je vyššia ako 300 hniezdných párov.	Veľkosť populácie dosahuje 100 - 300 hniezdných párov.
	1.2. Populačný trend	Populácia stúpa za obdobie 5 rokov o vyše 20 %.	Populácia je za obdobie 5 rokov stabilná alebo osciluje do $\pm 20 \%$ .
	1.3. Veľkosť areálu	Viac ako 90 % tetrád kvadrátov DFS.	70 - 90 % tetrád kvadrátov DFS.
	1.4. Areálový trend	Areál je stabilný, alebo sa zväčšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.	Menej ako 70 % tetrád kvadrátov DFS.

	2.1. Hniezdny biotop	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, NDV sú na viac ako 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, NDV sú na 50 - 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, NDV sú na menej ako 50 % rozlohy vhodných biotopov.
	2.2. Potravný biotop	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, NDV sú na viac ako 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, NDV sú na 50 - 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, NDV sú na menej ako 50 % rozlohy vhodných biotopov.
	2.3. Migračný biotop	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, NDV sú na viac ako 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, NDV sú na 50 - 70 % rozlohy vhodných biotopov.	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnítých krov, NDV sú na menej ako 50 % rozlohy vhodných biotopov.
ohrozenia	3.1. Ohrozenie populácie	V hniezdom období (od 1. 5. do 31.7.) je na hniezdiskách neúmyselne vyrušovaná (pasenie, zber húb a pod.) na menej ako 10 % vhodných biotopov.	V hniezdom období (od 1. mája do 31.7.) je na hniezdiskách neúmyselne vyrušovaná (pasenie, zber húb a pod.) na 10 - 30 % vhodných biotopov.	V hniezdom období (od 1. mája do 31.7.) je na hniezdiskách neúmyselne vyrušovaná (pasenie, zber húb a pod.) na viac ako 30 % vhodných biotopov.
	3.2. Ohrozenie biotopu	Zanechanie tradičného obhospodarovania (kosenie, pasenie a pod.) a následná sukcesia sa prejavuje na menej ako 10 % plochy vhodných biotopov.	Zanechanie tradičného obhospodarovania (kosenie, pasenie a pod.) a následná sukcesia sa prejavuje na 10 - 30 % plochy vhodných biotopov.	Zanechanie tradičného obhospodarovania (kosenie, pasenie a pod.) a následná sukcesia sa prejavuje na viac ako 30 % plochy vhodných biotopov.

Tabuľka č. 69: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu hrdlička poľná

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
P	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
	1.4. Areálový trend	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	2	4
	2.3. Migračný biotop	2	1	2
O	3.1. Ohrozenie populácie	2	3	6
	3.2. Ohrozenie biotopu	2	1	2
<b>Dosiahnutá hodnota spolu:</b>				<b>40</b>
Maximálna možná hodnota ( $\Sigma$ váh $\times$ 3):				60

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 70: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu hrdlička poľná

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
	<b>67 %</b>	

## Zhodnotenie

Stav hrdličky poľnej v CHVÚ je hodnotený ako priemerný priaznivý - stupeň B.

### 1.6.3.1.24. Definovanie stavu druhu žltochvost lesný v CHVÚ Strážovské vrchy

#### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa aktuálne odhaduje výskyt **30 - 50 hniezdných párov** žltochvosta lesného (dáta z monitoringu), čo predstavuje prudký pokles oproti stavu z minulosti. Podobná zmena početnosti však bola zaznamenaná aj v iných územiach na Slovensku. Pokles o 20-50 % je spôsobený pravdepodobne zmenou a poškodzovaním biotopov, celkovým úbytkom druhu, negatívnymi zmenami na zimoviskách. Samostatnou príčinou poklesu nebude zánik hniezdných alebo potravných biotopov v Strážovských vrchoch (ale ani na Slovensku). Vzhľadom na pokračujúci pokles populácie vo viacerých krajinách západnej Európy (BirdLife 2004), je situácia obdobná ako u nás. Je možné predpokladať, že príčiny tejto situácie ležia aj na zimoviskách v subsaharskej Afrike, kde prebieha veľmi intenzívne odlesňovanie (Hansen et al. 2013) a paralelne tu prebieha aj nelegálny lov migrujúceho vtáctva (predovšetkým Blízky východ).

Biotopom žltochvosta lesného v CHVÚ Strážovské vrchy sú staré lesy z rozvoľnenou štruktúrou, dostatkom dutinových stromov, ide zväčša o ochranné lesy a lesné rezervácie, predovšetkým dubové bučiny, bučiny, menej jedľo-bučiny. Rozšírený je pomerne ostrovčekovite v lesnej krajine, kde sa vyhýba súvislým intenzívne obhospodarovaným lesným porastom, teda mladinám a porastom do 80-100 rokov bez zastúpenia starých porastov. Okrem toho sa vyskytuje jednotliво v intravilánoch obcí s vysokou stromovou vegetáciou - záhrady, parky, extenzívne staré sady.

Tabuľka č. 71: Definovanie stavu druhu žltochvost lesný

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV	
	A - dobrý	B - priemerný	C - nepriaznivý	
populácia	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	Hniezdna populácia je vyššia ako 500 párov.	Hniezdna populácia dosahuje 250 - 500 párov.	Hniezdna populácia je nižšia ako 250 párov.
	1.2. Populačný trend	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov stúpa o viac ako 20 %.	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov je stabilná, s fluktuáciou do ±20 %.	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov klesá o viac ako 20 %.
	1.3. Veľkosť areálu	Viac ako 90 % tetrád kvadrátov DFS.	50 - 90 % tetrád kvadrátov DFS.	Menej ako 50 % tetrád kvadrátov DFS.
	1.4. Areálový trend	Areál je stabilný, alebo sa zväčšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.	Areál je stabilný, zmeny sú v rozpätí ±20 % / 5 rokov.	Areál sa zmenšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.
biotop	2.1. Hniezdný biotop	Viac ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú lesy s prevahou drevín nad 100 rokov.	Viac ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú lesy s prevahou drevín nad 80 rokov.	Menej ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú lesy s prevahou drevín nad 80 rokov.
	2.2. Potravný biotop	Lesy s prevahou drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú viac ako 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Lesy s prevahou drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú 50 - 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Lesy s prevahou drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú menej ako 50 % rozlohy lesov nad 80 rokov.
	2.3. Biotop počas zimovania	Lesy s prevahou drevín nad 80 rokov s podielom	Lesy s prevahou drevín nad 80 rokov	Lesy s prevahou drevín nad 80 rokov s podielom

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
	A - dobrý	B - priemerný	C - nepriaznivý
	mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú viac ako 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú 50 - 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú menej ako 50 % rozlohy lesov nad 80 rokov.
<b>ohrozenia</b>	3.1. Ohrozenie populácie	Podiel lesov nad 80 rokov za 5 rokov vzrástol o vyše 10 %.	Podiel lesov nad 80 rokov je za 5 rokov stabilný (tolerancia $\pm 10\%$ ).
	3.2. Ohrozenie biotopu	Bez veľkoplošného holorubného spôsobu obhospodarovania lesných porastov, pokles rozlohy lesov nad 80 rokov menej ako 5 %.	Veľkoplošné holoruby využívané na max. 10 % rozlohy lesov, pokles rozlohy lesov nad 80 rokov 5 - 10 %.

Tabuľka č. 72: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu žltouchost lesný

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
P	1.1. Populačná hustota / veľkosť populácie	1	3	3
	1.2. Populačný trend	1	3	3
	1.3. Veľkosť areálu	1	2	2
	1.4. Areálový trend	1	2	2
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	2	4
	2.3. Biotop počas zimovania	2	1	2
O	3.1. Ohrozenie populácie	2	2	4
	3.2. Ohrozenie biotopu	2	1	2
<b>Dosiahnutá hodnota spolu:</b>				<b>28</b>
Maximálna možná hodnota ( $\sum$ váh $\times$ 3):				57

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 73: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu žltouchost lesný

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
		49 %

### Zhodnotenie

Stav žltouchosta lesného v CHVÚ Strážovské vrchy je hodnotený stupňom C - nepriaznivý.

#### 1.6.3.1.25. Definovanie stavu druhu muchár sivý v CHVÚ Strážovské vrchy

##### Rozšírenie, početnosť a charakteristika druhu:

V CHVÚ sa odhaduje veľkosť populácie muchára sivého na **450 - 600 párov** (Karaska et al. 2015), čo predstavuje približne 1 % slovenskej hniezdnej populácie druhu (65 000- 150 000 párov). Trend populácie je aktuálne klasifikovaný ako stabilný s maximálnou zmenou  $\pm 20\%$ . Hustota populácie v hlavných biotopoch dosahuje priemerne 0,16 - 0,32 páru/10 ha. Rozptyl jedincov v území je viac-menej rovnomerný, v závislosti od vhodnosti biotopov. Najvyššie hustoty boli zistené v častiach CHVÚ s najväčším podielom listnatých lesov s dostatočným zastúpením starých porastov s pestrou rozvoľnenou štruktúrou (ekotonový charakter).

Biotopmi druhu v území sú staré listnaté lesy od dubových po bukové lesy. Preferuje nižšie polohy. Využíva aj poľné lesíky, staré sady a záhrady s dutinovými stromami. Najpočetnejší je v oblastiach, kde sú najviac zastúpené dutinové stromy. Vyhýba sa smrekovým a borovicovým porastom, tiež mladinám a mladým porastom bez dostatku dutinových stromov. Typickým prostredím muchára sivého sú ekotony na okrajoch starých listnatých lesoch a staré lesné porasty pralesovitého charakteru s dostatkom dutinových stromov a čo najviac rozvinutým vertikálnym zápojom - pestrá štruktúra lesa (možnosti zberu potravy z korunového priestoru). Taktiež využíva aj menšie skupiny starých stromov v otvorenej krajine (háje, staré sady, záhrady, parky, cintoríny, aleje).

Tabuľka č. 74: Definovanie stavu druhu muchár sivý

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
populácia	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	Hniezdná populácia je vyššia ako 1 000 párov.	Veľkosť hnieznej populácie dosahuje 250 - 1 000 párov.
	1.2. Populačný trend	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov stúpa o viac ako 20 %.	Populácia resp. populačná hustota za 5 rokov je stabilná, s fluktuáciou do ±20 %.
	1.3. Veľkosť areálu	Viac ako 90 % tetrád kvadrátov DFS.	70 - 90 % tetrád kvadrátov DFS.
	1.4. Areálový trend	Areál je stabilný, alebo sa zväčšuje o viac ako 20 % / 5 rokov.	Areál je stabilný, zmeny sú v rozpäti ±20 % / 5 rokov.
biotop	2.1. Hniezdný biotop	Viac ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 100 rokov.	Viac ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ zaberajú listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov.
	2.2. Potravný biotop	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú viac ako 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú 50 - 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.
	2.3. Biotop počas zimovania	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú viac ako 70 % rozlohy lesov nad 80 rokov.	Listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín nad 80 rokov s podielom mŕtveho dreva nad 20 m <sup>3</sup> /ha zaberajú menej ako 50 % rozlohy lesov nad 80 rokov.
ohrození	3.1. Populácia	Podiel listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov za 5 rokov vzrástol o vyše 10 %.	Podiel listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov je za 5 rokov stabilný (tolerancia ±10 %).
			Podiel listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov za 5 rokov poklesol o vyše 10 %.

Kritériá hodnotenia	PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
	A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
3.2. Biotop	Bez veľkoplošného holorubného spôsobu obhospodarovania lesných porastov, pokles rozlohy starých listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov menej ako 5 %.	Veľkoplošné holoruby využívané na max. 10 % rozlohy lesov, pokles rozlohy starých listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov 5 - 10 %.	Veľkoplošné holoruby využívané na viac ako 10 % rozlohy lesov, pokles rozlohy starých listnatých a zmiešaných lesov nad 80 rokov viac ako 10 %.

Tabuľka č. 75: Zhodnotenie jednotlivých kritérií stavu druhu muchár sivý

Kritérium		Stav*	Váha parametra**	Počet bodov
P	1.1. Populačná hustota/veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	3	2	6
	1.4. Areálsový trend	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	2	4
	2.3. Biotop počas zimovania	2	1	2
O	3.1. Populácia	2	2	4
	3.2. Biotop	2	1	2
<b>Dosiahnutá hodnota spolu:</b>				<b>40</b>
Maximálna možná hodnota ( $\sum$ váh $\times$ 3):				57

P – populácia; B – biotop; O – ohrozenia;

\* Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod.

\*\* Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1 – 3.

Tabuľka č. 76: Celkové vyhodnotenie súčasného stavu druhu muchár sivý

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 - 78 %	77 - 55 %	54 - 33 %
	70 %	

### Zhodnotenie

Stav muchára sivého v CHVÚ Strážovské vrchy je hodnotený ako B - priemerný priaznivý.

#### 1.6.3.2. Stav druhov vtákov na ochranu ktorých sa vyhlasuje CHVÚ a ich biotopov

Hodnotenie stavu vtákov vychádza predovšetkým z monitoringu vtáctva a stavu ich populácie v CHVÚ v r. 2010-2012, ak nie je uvedené inak.

##### 1.6.3.2.1. Sokol sťahovaný

Stav veľkosti populácie sokola sťahovavého sa podľa aktuálnej definície priaznivého stavu hodnotí stupňom A ako dobrý, priaznivý. V prípade populačného a areálsového trendu je hodnotenie na stupni A, Ide o druh s mierne narastajúcou početnosťou obsadených teritórií. Celkový stav druhu je klasifikovaný stupňom **A – dobrý, priaznivý stav**.

#### 1.6.3.2.2. Výr skalný

Stav veľkosti populácie, populačného a areálového trendu, veľkosti areálu, hniezdneho a potravného biotopu a biotopov dôležitých počas zimovania výra skalného sa podľa aktuálnej definície priaznivého stavu hodnotí na stupni B, ako priemerný priaznivý stav. Celkový stav druhu v území je tiež klasifikovaný stupňom **B – priemerný, priaznivý stav.**

#### 1.6.3.2.3. Žlna sivá

Stav veľkosti populácie, populačného a areálového trendu, veľkosti areálu, hniezdneho a potravného biotopu a biotopov dôležitých počas zimovania sa podľa aktuálnej definície priaznivého stavu žlny sivej hodnotí na stupni B, ako priemerný priaznivý stav. Je to spôsobené najmä poklesom podielu listnatých lesov nad 80 rokov z celkovej výmery lesov v CHVÚ. Celkový stav žlny sivej v CHVÚ Strážovské vrchy je v súčasnosti hodnotený stupňom **B – priemerný, priaznivý stav.**

#### 1.6.3.2.4. Orol skalný

V súčasnosti je stav populácie orla skalného odhadovaný na úrovni 4-5 párov v CHVÚ. Počet obsadených hniezdných teritorií neklesá za sledované obdobie. Tento stav je porovnateľný s vedeckým návrhom CHVÚ, preto je stav trendu populácie hodnotený ako stabilný s miernym nárastom. Stav orla skalného v území je aktuálne klasifikovaný na stupni **A ako dobrý, priaznivý stav.**

#### 1.6.3.2.5. Bocian čierny

V súčasnosti je stav populácie bociana čierneho odhadovaný na úrovni 12-16 párov na území CHVÚ. Tento stav je porovnateľný s vedeckým návrhom CHVÚ, preto je stav trendu populácie hodnotený ako stabilný. Celkový stav bociana čierneho v CHVÚ Strážovské vrchy je klasifikovaný stupňom **B – priemerný, priaznivý stav.**

#### 1.6.3.2.6. Včelár lesný

Pri hodnotení stavu populácie včelára lesného v území odhadnutý na výskyt 30-40 hniezdných párov. Stav trendu populácie je hodnotený ako stabilný. Kvalita a stav hniezdných biotopov sa nezhoršil. Celkový stav včelára lesného v CHVÚ Strážovské vrchy je hodnotený stupňom **A – dobrý, priaznivý stav.**

#### 1.6.3.2.7. Tetrov hlucháč

V prípade tetrova hlucháča je hodnotenie stavu populácie druhu v CHVÚ Strážovské vrchy najhoršie medzi druhami, ktoré sú v území predmetom ochrany. Veľkosť populácie dosahuje 0 jedincov od r. 2014. Na základe tejto skutočnosti a kvalitatívneho zhoršenia stavu biotopov je celkový stav druhu v CHVÚ klasifikovaný ako **nepriaznivý – stupňom C.**

#### 1.6.3.2.8. Kuvik kapcavý

Na základe aktuálneho monitoringu bol stav populácie určený na 10-15 párov. Tento stav je porovnateľný s vedeckým návrhom CHVÚ. Sledovanie stavu biotopov druhu poukázalo na zhoršenie, v dôsledku poklesu rozlohy vhodných hniezdných biotopov. Celkový stav kuvika kapcavého v CHVÚ Strážovské vrchy je klasifikovaný stupňom **B – priemerný priaznivý stav.**

#### 1.6.3.2.9. Lelek lesný

Na základe aktuálneho monitoringu boli zistené v CHVÚ len jednotlivé výskytu lelka, s odhadom početnosti na 5-10 párov. Celkový stav druhu v CHVÚ Strážovské vrchy je klasifikovaný stupňom **B – priemerný priaznivý stav.**

#### 1.6.3.2.10. Chriašteľ poľný

V súčasnosti je stav populácie chriašteľa poľného odhadovaný na 30-40 párov. Tento stav je porovnatelný s predošlými odhadmi, preto je stav trendu populácie hodnotený ako stabilný. Kvalita a stav hniezdných biotopov sa pozorovateľne nezhoršil. Avšak druh je ohrozený posúvaním termínov kosenia na lúkach do skorších dátumov a tiež nevhodným spôsobom kosenia, čo sa môže prejaviť na zmenách populácie s oneskorením. Celkový stav chriašteľa poľného v CHVÚ je klasifikovaný stupňom **B – priemerný priaznivý stav**.

#### 1.6.3.2.11. Ďatel' čierny

V súčasnosti je stav populácie ďatľa čierneho odhadovaný na 75-110 párov. Tento stav je porovnatelný s predošlými odhadmi, preto je stav trendu populácie hodnotený ako stabilný. Sledovanie stavu biotopov druhu poukázalo na zhoršenie ich stavu v dôsledku poklesu rozlohy vhodných biotopov. Celkový stav druhu je **B – priemerný priaznivý stav**.

#### 1.6.3.2.12. Ďatel' bielochrbtý

V súčasnosti je stav populácie ďatľa bielochrbtého odhadovaný na 150-160 párov. Tento stav je porovnatelný s predošlými odhadmi, preto je stav trendu populácie hodnotený ako stabilný. Sledovanie stavu biotopov druhu poukázalo na zhoršenie ich stavu v dôsledku poklesu rozlohy vhodných biotopov. Celkový stav ďatľa bielochrbtého v CHVÚ Strážovské vrchy je klasifikovaný stupňom **B – priemerný priaznivý stav**.

#### 1.6.3.2.13. Jariabok hôrny

Hodnotenie aktuálneho stavu populácie poukázali na úroveň 20 – 25 párov. Stav populácie hodnotený postupným poklesom najmä v dôsledku silného predačného tlaku diviače zveri, ktorej stav v území silne narastá a tiež v dôsledku odstraňovania liesky, brezy, jarabiny z lesných rúbaní pri pestovaní lesa. Celkový stav jariabka hôrneho v CHVÚ Strážovské vrchy je klasifikovaný stupňom **C - nepriaznivý**.

#### 1.6.3.2.14. Penica jarabá

V súčasnosti je stav populácie penice jarabej odhadovaný na 30-40 párov. Tento stav je porovnatelný s predošlými odhadmi, preto je stav trendu populácie hodnotený ako stabilný. Celkový stav druhu v území je klasifikovaný stupňom **B – priemerný priaznivý**.

#### 1.6.3.2.15. Ďatel' prostredný

V súčasnosti je stav populácie ďatľa prostredného odhadovaný na 120 -150 párov. Tento stav je porovnatelný s predošlými odhadmi, preto je stav trendu populácie hodnotený ako stabilný. Celkový stav ďatľa prostredného v CHVÚ Strážovské vrchy je klasifikovaný stupňom **B – priemerný priaznivý stav**.

#### 1.6.3.2.16. Muchárik červenohrdlý

Hodnotenie stavu populácie preukázalo jej mierny pokles na úroveň 70 – 100 párov v rokoch 2010-2014, ako aj zhoršenie kvality biotopov v dôsledku poklesu ich rozlohy. Celkový stav muchárika červenohrdlého v CHVÚ je klasifikovaný stupňom **B – priemerný priaznivý stav**.

#### 1.6.3.2.17. Muchárik bielokrký

V súčasnosti je stav populácie muchárika bielokrkého odhadovaný na 800-1 300 párov. Tento stav je porovnatelný s predošlými odhadmi, preto je stav trendu populácie hodnotený ako stabilný. Celkový stav muchárika bielokrkého v CHVÚ Strážovské vrchy je klasifikovaný stupňom **B – priemerný priaznivý stav**.

#### 1.6.3.2.18. Strakoš červenochrbtý

V súčasnosti je stav populácie strakoša červenochrbtého odhadovaný na 300-400 párov. Tento stav je porovnateľný s predošlými odhadmi, preto je stav trendu populácie hodnotený ako stabilný. Sledovanie stavu biotopov druhu poukázalo na mierne zhoršenie v dôsledku poklesu ich rozlohy. Celkový stav strakoša červenochrbtého je klasifikovaný stupňom **B – priemerný priaznivý stav.**

#### 1.6.3.2.19. Strakoš sivý

Pri hodnotení aktuálneho stavu populácie boli v území zistené 3-4 páry. Kvalita a stav hniezdných biotopov sa pozorovateľne nezhoršil. Na základe nízkeho stavu populácie a nepriaznivého hodnotenia ostatných kritérií je aj celkový stav druhu v CHVÚ Strážovské vrchy klasifikovaný ako **nepriaznivý – stupňom C.**

#### 1.6.3.2.20. Prepelica poľná

Hodnotenie aktuálneho stavu populácie poukázali na úroveň 25-40 párov. Stav populácie hodnotený ako stabilný. Kvalita a stav hniezdných biotopov sa pozorovateľne nezhoršil. Avšak druh je ohrozovaný posúvaním termínov kosenia na lúkach do skorších dátumov a taktiež nevhodným spôsobom kosenia, čo sa môže prejaviť na zmenách populácie s oneskorením. Celkový stav prepelice poľnej v CHVÚ Strážovské vrchy je klasifikovaný stupňom **B – priemerný priaznivý stav.**

#### 1.6.3.2.21. Krutihlav hnedý

V súčasnosti je stav populácie krutihlava hnedého odhadovaný na úrovni 45-90 párov. Tento stav je porovnateľný s predošlými odhadmi, preto je stav trendu populácie hodnotený ako stabilný. Celkový stav krutihlava v CHVÚ je klasifikovaný ako **B – priemerný priaznivý.**

#### 1.6.3.2.22. Pŕhľaviar čiernohlavý

V súčasnosti je stav populácie pŕhľaviara čiernohlavého odhadovaný na 40- 65 párov. Tento stav je porovnateľný s predošlými odhadmi, preto je stav trendu populácie hodnotený ako stabilný. Celkový stav druhu v území je klasifikovaný stupňom **B – priemerný priaznivý.**

#### 1.6.3.2.23. Hrdlička poľná

Hodnotenie stavu populácie druhu na 80-120 párov. Stav kvality biotopov je pomerne priaznivý, pokiaľ sa zachová pestrá krajinná mozaika s nelesnou drevinovou vegetáciou. Celkový stav hrdličky poľnej v území je klasifikovaný stupňom **B – priemerný priaznivý stav.**

#### 1.6.3.2.24. Žltouchvost lesný

Hodnotenie stavu populácie druhu preukázalo jej pokles na úroveň 30-50 hniezdných párov, ako aj zhoršenie kvality biotopov v dôsledku poklesu ich rozlohy. Tento stav je spôsobený o. i. celkovým poklesom populácie druhu na Slovensku. Na základe nepriaznivého vývoja populačných kritérií je aj celkový stav druhu v území klasifikovaný ako **C – nepriaznivý.**

#### 1.6.3.2.25. Muchár sivý

V súčasnosti je stav populácie muchára sivého v CHVÚ Strážovské vrchy odhadovaný na 450 - 600 párov. Tento stav je porovnateľný s predošlými odhadmi, preto je stav trendu populácie hodnotený ako stabilný. Celkový stav muchára sivého v CHVÚ Strážovské vrchy je klasifikovaný stupňom **B – priemerný priaznivý stav.**

#### 1.6.3.3. Cieľový stav druhu

Cieľový stav druhu bol určený u jednotlivých druhov na základe významu druhu pre zachovanie populácie druhu na Slovensku, resp. v sústave CHVÚ, podľa dosiahnuteľnosti cieľu ako aj výnimocnosti daného druhu ako zástupcu danej taxonomickej skupiny.

##### *1.6.3.3.1. Sokol sťahovaný*

CHVÚ Strážovské vrchy sú najvýznamnejším územím pre ochranu sokola sťahovavého na Slovensku. Preto kvôli významu tohto územia pre jeho ochranu by malo byť cieľom **udržanie súčasného celkového priaznivého stavu na úrovni A – dobrý priaznivý stav**.

##### *1.6.3.2.2. Výr skalný*

Celkový priaznivý stav výra skalného v CHVÚ je hodnotený stupňom B – priemerný, priaznivý stav. Vzhľadom na dôležitosť výra skalného ako významného predmetu ochrany v CHVÚ Strážovské vrchy celkovo je dôležité zabezpečiť udržanie početnosti populácie na minimálne 20 obsadených revírov a teda **zachovanie súčasného stavu v stupni B**.

##### *1.6.3.2.3. Žlina sivá*

Celkový priaznivý stav žlny sivej v CHVÚ Strážovské vrchy je v súčasnosti hodnotený stupňom B - priemerný priaznivý stav. Ochrana tohto druhu by mala mať vysokú prioritu, aj preto, že tento druh je významný pre tvorenie hniezdných dutín ďalších predmetov ochrany v CHVÚ Strážovské vrchy. Preto je cieľom opatrení pri manažmente územia **zlepšenie súčasného priaznivého stavu na úroveň A – dobrý priaznivý stav**.

##### *1.6.3.2.4. Orol skalný*

Súčasný odhad populácie orla skalného v CHVÚ Strážovské vrchy je 4-5 hniezdných párov, stav populácie je hodnotený ako stabilný. Celkovým cieľom pre ochranu tohto druhu by malo byť **udržanie stavu populácie orla skalného v CHVÚ Strážovské vrchy a celkového priaznivého stavu na stupni A**.

##### *1.6.3.2.5. Bocian čierny*

Súčasný odhad populácie bociana čierneho v CHVÚ Strážovské vrchy je 12-16 hniezdných párov, stav populácie je hodnotený ako stabilný. Celkovým cieľom pre ochranu tohto druhu by malo byť **minimálne udržanie celkového stavu v stupni B**.

##### *1.6.3.2.6. Včelár lesný*

Vzhľadom na veľký význam územia (vdaka vhodnosti biotopov a rozľahlosti vhodných biotopov) je pre ochranu tohto druhu potrebné **zachovať súčasný priaznivý stav - A**.

##### *1.6.3.2.7. Tetrov hlucháň*

V čase vymedzovania sústavy CHVÚ na Slovensku bola celková populácia tetrova hlucháňa v CHVÚ Strážovské vrchy odhadnutá na úrovni min. 5-6 kohútov. V súčasnosti v dôsledku prudkého poklesu hniezdzna populácia druhu z CHVÚ Strážovské vrchy vymizla. Cieľom je **zvrátenie tohto stavu** a to prostredníctvom komplexných prípravných opatrení na ochranu a tvorbu jeho vhodného biotopu. O zvrátení stavu vymiznutia druhu z Strážovských vrchoch bude možné hovoriť vtedy, ak sa prirodzené navráti do územia hniezdzna populácia tetrova hlucháňa.

#### 1.6.3.2.8. *Kuvik kapcavý*

Cieľom programu starostlivosti je zvýšiť populáciu druhu prostredníctvom opatrení na zachovanie vyššieho podielu starých porastov - nad 80 rokov (ochrane napomôžu aj opatrenia pre ďalšie lesné druhy, napríklad pre ďatľa čierneho). Cieľom programu starostlivosti je **minimálne udržanie aktuálneho priaznivého stavu druhu v stupni B.**

#### 1.6.3.2.9. *Lelek lesný*

Na základe aktuálneho monitoringu bol stav druhu v území klasifikovaný ako priemerný priaznivý, v **stupni B**. Cieľom programu starostlivosti je tento stav minimálne udržať.

#### 1.6.3.2.10. *Chriašteľ poľný*

Cieľom ochrany v území je udržanie alebo mierne zlepšenie stavu druhu s fluktuáciami v závislosti od poveternostných podmienok. Cieľom programu starostlivosti je teda minimálne **udržanie aktuálneho priaznivého stavu druhu v území v stupni B.**

#### 1.6.3.2.11. *Ďatel' čierny*

Vzhľadom na význam druhu pre ostatné dutinové hniezdiče pri tvorbe hniezdnych dutín (kuvika kapcavého, ďatľa bielochrbtého, muchárika červenohrdlého, ďatľa prostredného, žltochvosta lesného) je cieľom programu starostlivosti pre ďatľa čierneho **minimálne udržanie aktuálneho priaznivého stavu druhu v území v stupni B.**

#### 1.6.3.2.12. *Ďatel' bielochrbtý*

Cieľom programu starostlivosti je **minimálne udržanie aktuálneho priaznivého stavu druhu v území v stupni B.**

#### 1.6.3.2.13. *Jariabok hôrny*

Cieľom ochrany je zlepšenie súčasného stavu s fluktuáciami v závislosti od podmienok prostredia. Cieľom programu starostlivosti je preto **zlepšenie nepriaznivého stavu druhu v stupni C do stavu kategórie B – priemerný priaznivý stav.**

#### 1.6.3.2.14. *Penica jarabá*

Cieľom opatrení je zachovanie minimálne súčasnej úrovne druhu v CHVÚ na úrovni 30-40 párov, alebo jej nárast a to prostredníctvom zachovávania dostatočného porastu krovín a nelesnej vegetácie v poľnohospodárskej krajine a prostredníctvom opatrení, ktoré tlma sukcesnú premenu krovitých strán na zapojený les. Cieľom programu starostlivosti je **minimálne udržanie aktuálneho priaznivého stavu druhu v území v stupni B.**

#### 1.6.3.2.15. *Ďatel' prostredný*

Je dôležité, aby sa zachovala početnosť tohto druhu minimálne na aktuálnej úrovni a zabránilo sa ďalšiemu poklesu populácie v dôsledku zhoršovania stavu jeho biotopov. Cieľom programu starostlivosti je teda **minimálne udržanie aktuálneho priaznivého stavu druhu v území v stupni B.**

#### 1.6.3.2.16. Muchárik červenohrdlý

Cieľom programu starostlivosti je zvýšiť početnosť a to prostredníctvom opatrení na zachovanie vyššieho podielu starých porastov (nad 80 rokov). Cieľom programu starostlivosti je aspoň **udržanie aktuálneho priaznivého stavu druhu v území v stupni B.**

#### 1.6.3.2.17. Muchárik bielokrký

Je dôležité, aby sa zachovala početnosť tohto druhu minimálne na aktuálnej úrovni a zabránilo sa ďalšiemu poklesu populácie v dôsledku zhoršovania stavu hniezdneho biotopu druhu. Cieľom programu starostlivosti je teda **minimálne udržanie aktuálneho priaznivého stavu druhu v území v stupni B.**

#### 1.6.3.2.18. Strakoš červenochrbtý

Cieľom opatrení je zachovanie minimálne súčasnej úrovne strakoša červenochrbtého v CHVÚ alebo jej nárast a to prostredníctvom zachovávania dostatočného porastu krovín a nelesnej vegetácie v poľnohospodárskej krajine a prostredníctvom opatrení, ktoré sú zamerané pre iné poľnohospodárske druhy, ako je napríklad strakoš sivý. Cieľom programu starostlivosti je teda **aspoň udržanie aktuálneho priaznivého stavu v stupni B.**

#### 1.6.3.2.19. Strakoš sivý

Cieľom opatrení je zlepšenie súčasného stavu strakoša sivého v CHVÚ a to prostredníctvom zachovávania dostatočného zastúpenia mokrých a podmáčaných lúk, mozaikovitých porastov krovín a nelesnej vegetácie v poľnohospodárskej krajine, t. j. **zlepšenie nepriaznivého stavu druhu v stupni C do stavu kategórie B – priemerný priaznivý.**

#### 1.6.3.2.20. Prepelica poľná

Cieľom ochrany druhu prepelice v CHVÚ je udržanie alebo mierne zlepšenie tohto stavu s fluktuáciami v závislosti od poveternostných podmienok, pričom pre udržanie stavu prepelice primerane postačujú opatrenia uvedené pre chriašteľa poľného. Cieľom programu starostlivosti je teda **minimálne udržanie aktuálneho priaznivého stavu druhu v stupni B.**

#### 1.6.3.2.21. Krutihlav hnedý

Cieľom opatrení je zachovanie súčasnej úrovne krutihlava hnedého v CHVÚ alebo jej nárast a to prostredníctvom zachovávania dostatočného množstva dutinových stromov, mozaikovitého porastu drevinovej vegetácie v poľnohospodárskej krajine a prostredníctvom opatrení, ktoré sú zamerané aj pre iné poľnohospodárske druhy, ako je napríklad strakoš červenochrbtý, hrdlička poľná. Cieľom programu starostlivosti je **minimálne udržanie aktuálneho priaznivého stavu druhu v území v stupni B.**

#### 1.6.3.2.22. Přhlaviar čiernohlavý

Cieľom opatrení je zachovanie súčasnej úrovne druhu v CHVÚ alebo jej nárast a to prostredníctvom zachovávania dostatočného zastúpenia medzí, remízok, podmáčaných lúk a celkovo pestrej mozaikovitej štruktúry poľnohospodárskej krajiny. Cieľom programu starostlivosti je **minimálne udržanie aktuálneho priaznivého stavu druhu v stupni B.**

#### 1.6.3.2.23. Hrdlička poľná

Cieľom opatrení je zachovanie súčasnej úrovne druhu v CHVÚ na úrovni 80-120 párov alebo jej nárast a to prostredníctvom zachovávania dostatočného množstva stromov, mozaikovitého porastu drevinovej vegetácie v poľnohospodárskej krajine a prostredníctvom opatrení, ktoré

sú zamerané aj pre iné poľnohospodárske druhy, ako je napríklad strakoš červenochrbtý a krutihlav hnedy. Cieľom programu starostlivosti je **minimálne udržanie aktuálneho priaznivého stavu druhu v území v stupni B.**

#### **1.6.3.2.24. Žltochvost lesný**

Cieľom programu starostlivosti je zastavenie poklesu populácie žltochvosta lesného v CHVÚ Strážovské vrchy a zvýšenie a udržanie jeho stavu a to prostredníctvom opatrení na zachovanie vhodného hniezdneho biotopu (vyššieho podielu starých porastov s vhodnou štruktúrou a dostatkom dutinových stromov), aby sa dosiahlo preradenie stavu druhu zo stupňa C – nepriaznivý stav do **stupňa B – priemerný priaznivý stav.**

#### **1.6.3.2.25. Muchár sivý**

Je dôležité, aby sa zachovala početnosť tohto druhu minimálne na aktuálnej úrovni a zabránilo sa ďalšiemu poklesu populácie v dôsledku zhoršovania stavu hniezdneho biotopu. Cieľom programu starostlivosti je preto **minimálne udržanie aktuálneho priaznivého stavu druhu v území v stupni B.**

### **1.6.3.4. Osobitné záujmy**

#### **1.6.3.4.1. Sokol sťahovaný**

V prípade sokola sťahovavého ako symbolu ohrozenosti a elegancie, verejnosť všeobecne akceptuje potrebu ochrany tohto druhu. Ochrana sokola sťahovavého tak nie je potrebná len ako predmetu ochrany CHVÚ, ale aj ako kultúrneho dedičstva. Ochrana druhu môže zasiahnuť do záujmov lesného hospodárstva a to pri požiadavke na vytvorenie zón ochrany okolo jeho hniezd. Konflikt pri vytváraní takýchto zón je však riešiteľný vhodnou a včasnou formou komunikácie zainteresovaných, keďže na väčšine z plochy takýchto zón okolo hniezdisk sa požaduje len posunutie termínov lesného hospodárenia do obdobia mimo hniezdneho obdobia. Menšia, jadrová časť týchto zón ochrany okolo hniezdisk sokola sťahovavého vyžaduje ponechanie porastov bez zásahu, čo je už teraz predmetom vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z. z.. Mimo hniezdných stromov ak takéto porasty sú v rubnej dobe a tieto opatrenia nie sú uvedené v PSL, je potrebné, aby sa na obmedzenia vyplývajúce z ponechania časti porastu využili aj finančné nástroje v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 543/2002 Z. z.**“). Taktiež pri ochrane môže dochádzať ku konfliktu s komunitou horolezcov, čo však je riešiteľné cez komunikáciu a usmerňovanie systémom výnimiek do určených lokalít.

#### **1.6.3.4.2. Výr skalný**

Ochrana výra skalného a jeho hniezdisk v Strážovských vrchoch sa týka skalných útvarov a neprístupných skalných masívov. Tu môže dochádzať ku konfliktu s komunitou horolezcov, čo však je riešiteľné cez komunikáciu a usmerňovaným systémom výnimiek do určených lokalít. Ochrana tohto druhu sa nedotýka iných záujmov verejnosti.

#### **1.6.3.4.3. Žlna sivá**

Vzhľadom na celkovo pozitívne vnímanie ďalťov verejnosťou existuje záujem na ochranu týchto druhov nielen v dôsledku toho, že sú predmetmi ochrany v CHVÚ ale aj v dôsledku zachovania kultúrneho dedičstva. Pri ochrane žlny sivej môžu v CHVÚ vzniknúť konflikty pri presadzovaní ochrany hniezdných stromov. Vzhľadom na to, že ide len o jednotlivé stromy, sú tieto požiadavky na ochranu riešiteľné vhodnou a včasnou formou komunikácie. Väčším konfliktom môžu byť požiadavky na ochranu vhodných porastov.

#### 1.6.3.4.4. Orol skalný

V prípade orla skalného ako symbolu ohrozenosti a symbolu slovenských hôr verejnosť všeobecne akceptuje potrebu ochrany tohto druhu. Ochrana orla skalného tak nie je potrebná len ako predmetu ochrany CHVÚ, ale aj ako kultúrneho dedičstva. Ochrana orla skalného môže zasiahnuť do záujmov lesného hospodárstva a to pri požiadavke na vytvorenie zón ochrany okolo jeho hniezd, čo je už teraz predmetom vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z. z.. Na väčšine z plochy takýchto zón okolo hniezdisk sa požaduje len posunutie termínov lesného hospodárenia do obdobia mimo hniezdneho obdobia. Menšia, jadrová časť týchto zón ochrany okolo hniezdisk orla skalného vyžaduje ponechanie porastov bez zásahu.

#### 1.6.3.4.5. Bocian čierny

Ochrana bociana čierneho širokou verejnosťou vnímaná ako potrebná, keďže ide o vzácny druh. V prípade jeho ochrany nie sú iné priame osobitné záujmy na ochrane a využívaní tohto druhu, ktoré by boli v rozpore s cieľmi jeho ochrany. Ochrana bociana čierneho môže zasiahnuť do záujmov lesného hospodárstva a to pri požiadavke na vytvorenie zón ochrany okolo hniezd bociana čierneho. Ako v prípade ďalších druhov je vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezd bociana čierneho riešené vo vyhláške MŽP SR č. 234/2009 Z. z.. Konflikt pri vytváraní takýchto zón je riešiteľný vhodnou a včasnovou formou komunikácie zainteresovaných, nakoľko na väčšine z plochy takýchto zón okolo hniezdisk sa požaduje len posunutie termínov lesného hospodárenia do obdobia mimo hniezdneho obdobia. Menšia, jadrová časť týchto zón ochrany okolo hniezdisk bociana čierneho vyžaduje ponechanie porastov bez zásahu.

Bocian čierny je atraktívnym cieľom pre fotografov, čím vzniká potenciálny konflikt medzi fotografmi a ochranou prírody v blízkosti hniezdisk tohto druhu.

#### 1.6.3.4.6. Včelár lesný

V prípade včelára lesného ako verejnosti neznámeho druhu neexistuje žiadny iný osobitný záujem ohľadne jeho ochrany. Výnimočne v odôvodnených prípadoch môže v prípade ochrany včelára lesného vzniknúť požiadavka na vytvorenie zón ochrany okolo hniezda, pričom vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezd bociana čierneho riešené vo vyhláške MŽP SR č. 234/2009 Z. z. Konflikt pri vytváraní takýchto zón je riešiteľný vhodnou a včasnovou formou komunikácie zainteresovaných, keďže na väčšine z plochy takýchto zón okolo hniezdisk sa požaduje len posunutie termínov lesného hospodárenia do obdobia mimo hniezdneho obdobia. Menšia, jadrová časť týchto zón ochrany okolo hniezdisk včelára lesného vyžaduje ponechanie porastov bez zásahu. Tento konflikt nedosahuje potenciálne vysokú mieru obmedzení, keďže sa v prípade včelára očakáva len minimálny počet žiadostí na vytvorenie ochranných zón (aj z dôvodu ľahkej dohľadateľnosti hniezdisk tohto druhu v porastoch na území CHVÚ Strážovské vrchy).

#### 1.6.3.4.7. Tetrov hlucháň

Ochrana tetrova hlucháňa sa stretáva so záujmami poľovného využívania tohto druhu, keďže je v poľovníckej legislatíve zaradený ako zver. V dôsledku nízkej početnosti a takmer všeobecného úbytku tohto druhu na Slovensku, v súčasnosti vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov nestanovuje dobu lovú pre tetrova hlucháňa a ponecháva tento druh celoročne chránený. Ciele ochrany sú preto v súlade s rámcem poľovníckej legislatívy a spoločným cieľom je zvýšiť súčasnú nízku kritickú úroveň stavov tetrova hlucháňa. Toto však môže viesť ku konfliktu s lesným hospodárstvom, vzhľadom na to, že zastavenie úbytku tohto druhu a zvrátenie poklesu známená požiadavky na nastavenie opatrení lesného hospodárstva (ponechanie porastov nad 80 rokov vhodnej štruktúry, napr. s nižším zakmenením, úprava hospodárenia na vybraných plochách lesných porastov).

Zachovanie väčších, starších lesných porastov v dobrom stave však jednoznačne zvýši estetickú hodnotu územia a jeho atraktivitu pre turistov a pre rozvoj mäkkých foriem cestovného ruchu. Naopak rozvoj väčších stredísk cestovného ruchu, napríklad lyžiarskych, môže byť v rozpore so záujmami ochrany tetrova hlucháňa, keďže jeho lokality výskytu sú spravidla umiestnené vo vyšších polohách.

#### *1.6.3.4.8. Kuvik kapcavý*

V prípade kuvika kapcavého ako neznámeho druhu vo verejnosti neexistuje žiadny iný osobitný záujem ohľadne jeho ochrany. Ochrana kuvika kapcavého môže zasiahnuť do záujmov lesného hospodárenia. Tie sa však väčšinou týkajú len ochrany hniezdných stromov, preto potenciálny konflikt je riešiteľný vhodnou formou komunikácie.

#### *1.6.3.4.9. Lelek lesný*

Lelek lesný je veľmi nenápadný a pre širokú verejnosť ide teda o tajuplný druh, preto vo verejnosti neexistuje žiadny iný osobitný záujem ohľadne jeho ochrany. Ochrana druhu môže zasiahnuť do záujmov lesného hospodárenia v prípade premeny sukcesne zarastajúcich pasienkov (pionierskymi drevinami ako borievka, lieska, borovica) na husto zapojený pestovaný hospodársky les. Tento potenciálny konflikt je minimálny a riešiteľný vhodnou formou komunikácie.

#### *1.6.3.4.10. Chriašteľ poľný*

V prípade chriašteľa poľného ako verejnosti neznámeho druhu neexistuje žiadny iný osobitný záujem ohľadne jeho ochrany. Ochrana chriašteľa poľného môže zasiahnuť do záujmov poľnohospodárstva a to napríklad posunutím termínu kosenia na neskorší termín. Takéto posunutie zároveň znamená zníženie kvality tráv, plodín získaných pri neskoršom kosení, a teda aj negatívny dopad na hospodárenie dotknutých subjektov. Tento konflikt je riešiteľný vhodnou formou komunikácie, resp. využitím iných nástrojov.

#### *1.6.3.4.11. Ďateľ čierny*

Vzhľadom na celkovo pozitívne vnímanie ďatľov verejnosťou existuje záujem na ochranu týchto druhov nielen v dôsledku toho, že sú predmetmi ochrany v CHVÚ, ale aj v dôsledku zachovania kultúrneho dedičstva. Pri ochrane ďatľa čierneho môžu v CHVÚ vzniknúť konflikty pri presadzovaní ochrany hniezdných stromov. Nakol'ko ide len o jednotlivé stromy, sú tieto požiadavky na ochranu riešiteľné vhodnou a včasnou komunikáciou.

#### *1.6.3.4.12. Ďateľ bielochrbty*

Vzhľadom na celkovo pozitívne vnímanie ďatľov verejnosťou existuje záujem na ochranu týchto druhov nielen v dôsledku toho, že sú predmetmi ochrany v CHVÚ, ale aj v dôsledku zachovania kultúrneho dedičstva. Pri ochrane ďatľa bielochrbtého môžu v CHVÚ vzniknúť konflikty pri presadzovaní ochrany hniezdných stromov. Jeho efektívna ochrana môže zasiahnuť do záujmov lesného hospodárstva, keďže prípade tohto druhu požiadavky na jeho ochranu zahŕňajú ochranu vhodných porastov. Avšak zväčša ide o ochranné lesy.

#### *1.6.3.4.13. Jariabok hôrny*

Jariabok hôrny je v súčasnosti klasifikovaný ako poľovná zver s určenou doboou lovou. Táto doba lovou a minimálny záujem na love tohto druhu však spôsobuje, že súčasné nastavenie poľovníckej legislatívy a legislatívy ochrany prírody nie sú v rozpore s cieľmi ochrany stanovenými pre CHVÚ Strážovské vrchy. Stret záujmov môže vzniknúť pri obmedzení prikrmovania a vnadenia diviačej zveri. Diviaky predstavujú veľký predačný tlak na druh najmä v reprodukčnom období. Ochrana druhu môže zasiahnuť do záujmov lesného hospodárstva

v prípade premeny sukcesne zarastajúcich pasienkov (pionierskymi drevinami ako borievka, breza, lieska, jarabina, borovica) na husto zapojený pestovaný hospodársky les a tiež pri požiadavke na ponechanie pionierskych drevín na rúbaniach v podielu min. 20 % rozlohy rúbane. Tento potenciálny konflikt je riešiteľný vhodnou formou komunikácie.

#### *1.6.3.4.14. Penica jarabá*

V prípade penice jarabej, ako verejnosti málo známeho druhu, neexistuje žiadny iný osobitný záujem ohľadne jej ochrany. Ochrana druhu sa môže dostať do konfliktu so záujmami poľnohospodárstva, keďže na svoje prežívanie potrebuje dostatok rozptýlenej nelesnej drevinovej (krovitej) vegetácie a niektoré preferované spôsoby hospodárenia (rozorávanie TTP, výruby remízok z titulu navýšenia plôch pre dotácie) sú v rozpore s topickými požiadavkami druhu. Konflikt záujmov môže nastať s lesným hospodárstvom pri zachovávaní bezlesia, teda obmedzenia zalesňovania xerotermných krovitých strání.

#### *1.6.3.4.15. Ďatel prostredný*

Vzhľadom na celkovo pozitívne vnímanie ďatľov verejnosťou existuje záujem na ochranu týchto druhov nielen v dôsledku toho, že sú predmetmi ochrany v CHVÚ, ale aj v dôsledku zachovania kultúrneho dedičstva. Pri ochrane ďatľa prostredného môžu v CHVÚ vzniknúť konflikty pri presadzovaní ochrany hniezdných stromov. Väčším konfliktom v prípade ochrany tohto druhu však budú požiadavky na ochranu vhodných porastov. Avšak zväčša ide o ochranné lesy.

#### *1.6.3.4.16. Muchárik červenohrdlý*

V prípade muchárika červenohrdlého, ako verejnosti neznámeho druhu, neexistuje žiadny iný osobitný záujem ohľadne jeho ochrany. Ochrana druhu môže zasiahnuť do záujmov lesného hospodárstva, keďže v prípade tohto druhu požiadavky na jeho ochranu zahŕňajú ochranu vhodných porastov.

#### *1.6.3.4.17. Muchárik bielokrký*

V prípade muchárika bielokrkého, ako verejnosti málo známeho druhu, neexistuje žiadny iný osobitný záujem ohľadne jeho ochrany. Ochrana druhu môže zasiahnuť do záujmov lesného hospodárenia. Tie sa však väčšinou týkajú len ochrany hniezdných stromov, preto potenciálny konflikt je riešiteľný vhodnou formou komunikácie. Väčším konfliktom v prípade ochrany tohto druhu budú požiadavky na ochranu vhodných porastov.

#### *1.6.3.4.18. Strakoš červenochrbtý*

V prípade strakoša červenochrbtého, ako verejnosti neznámeho druhu, neexistuje žiadny iný osobitný záujem ohľadne jeho ochrany. Konflikty môžu vznikať pri požiadavkách na ponechanie dostačnej rozlohy hniezdných biotopov, t. j. krovín na ornej pôde, ktorých ponechanie zároveň znižuje dotácie pre dotknutých poľnohospodárov (pričom dnes poľnohospodári v prípade záujmu o ponechanie krovín nemajú v dôsledku platieb na rozlohu takú alternatívu v dotáciách, ktorá by im nahradila finančné strany pri ponechaní krovín). Preto je v CHVÚ potrebné pre elimináciu týchto konfliktov vhodne nastaviť režim dotácií a jednotlivé dotačné schémy, aby verejný záujem ochrany prírody a poľnohospodárske záujmy neboli v konflikte s cieľmi ochrany.

#### *1.6.3.4.19. Strakoš sivý*

V prípade strakoša sivého, ako verejnosti neznámeho druhu, neexistuje žiadny iný osobitný záujem ohľadne jeho ochrany. Ochrana strakoša sivého sa môže dostať do konfliktu so záujmami poľnohospodárskeho sektoru, keďže druh na svoje prežívanie potrebuje dostatok stromovej zelene a vhodnej potravy vrátane hmyzu. Niektoré preferované spôsoby

hospodárenia (rozorávanie trvalých trávnych porastov, výruba remízok z titulu navýšenia plôch pre dotácie) sú dnes v rozpore s jeho topickými požiadavkami.

#### *1.6.3.4.20. Prepelica poľná*

Ochrana prepelice poľnej ako symbolu poľnohospodárskej krajiny vo verejnosti je záujmom nielen z dôvodu jej určenia ako predmetu ochrany v CHVÚ Strážovské vrchy, ale aj z dôvodu zachovania kultúrneho dedičstva. Vzhľadom na to, že ide o nenáročný druh, nie je predpoklad vzniku väčšieho konfliktu s hospodárskym využitím územia z dôvodu požiadavky na špeciálne opatrenia s výnimkou obmedzenia využívania chemických prípravkov na ochranu rastlín a posúvania termínov kosenia lúk.

#### *1.6.3.4.21. Krutihlav hnedý*

V prípade krutihlava hnedého ako nenápadného a verejnosti málo známeho druhu neexistuje žiadny iný osobitný záujem ohľadne jeho ochrany. Ochrana druhu sa môže dostať do konfliktu so záujmami poľnohospodárskeho sektoru, keďže na svoje prežívanie potrebuje dostatok stromovej zelene s dutinovými stromami a vhodnej potravy vrátane hmyzu (mraveniská). Niektoré preferované spôsoby hospodárenia (rozorávanie TTP, veľkoplošné mulčovanie pasienkov - nedopaskov, výruba remízok z titulu navýšenia plôch pre dotácie) sú však v rozpore s týmito jeho topickými požiadavkami. Do konfliktu s hospodárskym využitím územia sa môže realizácia ochrany druhu dostať pri požiadavke obmedzenia využívania chemických prípravkov na ochranu rastlín - najmä insekticídov.

#### *1.6.3.4.22. Pŕhľaviar čiernochlavý*

V prípade pŕhľaviara čiernochlavého ako verejnosti neznámeho druhu neexistuje žiadny iný osobitný záujem ohľadne jeho ochrany. Ochrana pŕhľaviara je dôležitá nielen z dôvodu jej určenia ako predmetu ochrany v CHVÚ Strážovské vrchy, ale aj ako symbolu zdravej poľnohospodárskej krajiny. Vzhľadom na to, že ide o nenáročný druh, nie je predpoklad vzniku väčšieho konfliktu s hospodárskym využitím územia z dôvodu požiadavky realizácie špeciálnych opatrení s výnimkou obmedzenia využívania chemických prípravkov a veľkoplošného mulčovania nedopaskov.

#### *1.6.3.4.23. Hrdlička poľná*

V prípade hrdličky poľnej, ako verejnosti málo známeho druhu, neexistuje žiadny iný osobitný záujem ohľadne jeho ochrany. Ochrana druhu sa môže dostať do konfliktu so záujmami poľnohospodárskeho sektoru, keďže hrdlička poľná na svoje prežívanie potrebuje dostatok stromovej zelene. Niektoré preferované spôsoby hospodárenia (rozorávanie TTP, výruba remízok z titulu navýšenia plôch pre dotácie) sú v rozpore s topickými požiadavkami druhu.

#### *1.6.3.4.24. Žltouchvost lesný*

V prípade žltouchvosta lesného ako verejnosti neznámeho druhu neexistuje žiadny iný osobitný záujem ohľadne jeho ochrany. Ochrana žltouchvosta lesného môže zasiahnuť do záujmov lesného hospodárenia. Tie sa však väčšinou týkajú len ochrany hniezdných stromov, preto potenciálny konflikt je riešiteľný vhodnou formou komunikácie. Väčším konfliktom v prípade ochrany žltouchvosta môžu byť požiadavky na ochranu vhodných porastov.

#### *1.6.3.4.25. Muchár sivý*

Podobne ako žltouchvost lesný, aj muchár sivý je veľmi nenápadný a teda pre širokú verejnosť neznámy druh. Preto vo verejnosti neexistuje žiadny iný osobitný záujem ohľadne jeho ochrany. Ochrana muchára sivého môže zasiahnuť do záujmov lesného hospodárstva. Tie sa však väčšinou týkajú len ochrany hniezdných stromov, potenciálny konflikt je riešiteľný

vhodnou formou komunikácie. Väčším konfliktom v prípade ochrany tohto druhu môžu byť požiadavky na ochranu vhodných porastov.

#### **1.6.4. Hodnotenie ďalších osobitných záujmov ochrany prírody a krajiny v území**

Severná časť CHVÚ sa prekrýva s územím **Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy**, kde platí 2. stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. a je **zároveň územím európskeho významu SKUEV0256 Strážovské vrchy**. V južnej časti sa CHVÚ prekrýva s 3 ďalšími územiami európskeho významu: **SKUEV0274 Baské**, **SKUEV0275 Kňaží stôl**, **SKUEV0128 Rokoš**. Realizácia opatrení v CHVÚ nie je v rozpore so záujmami ochrany biotopov a druhov, pre ktoré sú tieto ÚEV vymedzené.

#### **V rámci národnej sústavy chránených území sa v CHVÚ nachádza 26 ďalších území:**

- Národná prírodná rezervácia Súľovské skaly (5. stupeň ochrany) a ochranné pásmo národnej prírodnej rezervácie Súľovské skaly (4. stupeň ochrany),
- Národná prírodná rezervácia Manínska tiesňava (5. stupeň ochrany) a ochranné pásmo národnej prírodnej rezervácie Manínska tiesňava (4. stupeň ochrany),
- Prírodná rezervácia Kostolecká tiesňava (5. stupeň ochrany) a ochranné pásmo prírodnej rezervácie Kostolecká tiesňava (4. stupeň ochrany),
- Národná prírodná rezervácia Podskalský Roháč (5. stupeň ochrany),
- Národná prírodná rezervácia Vápeč (5. stupeň ochrany),
- Národná prírodná rezervácia Strážov (5. stupeň ochrany),
- Národná prírodná rezervácia Rokoš (5. stupeň ochrany),
- Národná prírodná rezervácia Bradlo (5. stupeň ochrany),
- Prírodná rezervácia Pod Homôlkou (4. stupeň ochrany),
- Prírodná rezervácia Smradlavý vrch (4. stupeň ochrany),
- Prírodná rezervácia Rysia (5. stupeň ochrany),
- Prírodná rezervácia Jankov vršok (5. stupeň ochrany),
- Prírodná rezervácia Jedlie (5. stupeň ochrany),
- Prírodná rezervácia Udrina (5. stupeň ochrany),
- Prírodná rezervácia Kňaží stôl (5. stupeň ochrany),
- Prírodná rezervácia L'utovský Drieňovec (5. stupeň ochrany),
- Prírodná rezervácia Žihľavník (5. stupeň ochrany),
- Prírodná rezervácia Žrebíky (5. stupeň ochrany),
- Národná prírodná pamiatka Lánce (4. stupeň ochrany),
- Prírodná pamiatka Súľovský hrádok (4. stupeň ochrany),
- Prírodná pamiatka Prielom Nitrice (4. stupeň ochrany),
- Prírodná pamiatka Bosmany (5. stupeň ochrany),
- Prírodná pamiatka Prečínska skalka (5. stupeň ochrany),
- Prírodná pamiatka Zliechovský močiar (5. stupeň ochrany),
- Prírodná pamiatka Stará Bebrava (5. stupeň ochrany),
- Chránený areál Svarkovica (4. stupeň ochrany).

**5. stupeň ochrany** platí v rámci CHVÚ Strážovské vrchy na 2 762 ha (**4,71 %** z celkovej rozlohy CHVÚ), **4. stupeň ochrany** na 448,6 ha (**0,76 %**) a **2. stupeň ochrany** platí na ploche 55 462,4 ha (**94,53 %**). Prekryv CHVÚ Strážovské vrchy s inými chránenými územiami a územiami európskeho významu je mapovou prílohou č. 6.5.2.

V rámci CHVÚ sú evidované prvky **územného systému ekologickej stability**: provincionálne biocentrum Súľovské skaly, nadregionálne biocentrá Podhradská dolina, Podskalský Roháč, Vápeč, Maníny – Kosteľec, Strážov, Rokoš – Nitrické vrchy, ktoré sú prepojené terestrickými biokoridormi nadregionálnej úrovne a pomerne hustá sieť regionálnych prvkov.

## 1.7. Výsledky komplexného zistovania stavu lesa

Lesné pozemky sú obhospodarované podľa programov starostlivosti o lesy (PSL). Podrobnosti sú uvedené v tabuľke č. 77, č. 78, č. 79 a č. 80, údaje poskytlo Národné lesnícke centrum v septembri 2018. Porastová mapa je prílohou č. 6.5.3.

Tabuľka č. 77: Prehľad platných PSL v CHVÚ Strážovské vrchy

Lesný celok (LC)	Platnosť PSL	Výmera porastovej plochy v CHVÚ (ha)
ČIČMANY	2017 – 2026	1528,07
RAJECKO	2017 – 2026	1451,63
SÚĽOV	2017 – 2026*	2425,89
MAGURA - I	2009 – 2018	1688,79
NITRIANSKE PRAVNO - I	2009 – 2018	64,46
LESY OBCE NITRIANSKE PRAVNO	2009 – 2018	16,72
KŠINNÁ	2012 – 2021	4964,59
OPATOVÁ	2012 – 2021	1360,70
SLATINA NAD BEBRAVOU	2012 – 2021	5955,37
BELUŠA	2013 – 2022	4710,74
ILAVA	2013 – 2022	4413,96
PREČIN	2013 – 2022	6099,58
NITRIANSKE RUDNO	2015 – 2024	2994,64
UHROVEC	2015 – 2024	1499,81
VALASKÁ BELÁ	2015 – 2024	6695,72
VESTENICE	2015 – 2024	2980,01
TURIE	2015 – 2024	831,08
<b>Spolu</b>		<b>49 681,76</b>

\* PSL je v procese schvaľovania (september 2018)

Tabuľka č. 78: Zastúpenie kategórií lesa v CHVÚ Strážovské vrchy

Kategória lesa	Písmeno kategórie	ha	%
H		33607,96	<b>67,63</b>
O	a	8708,31	17,53
	d	7094,28	14,28
	<b>spolu</b>	<b>15802,59</b>	<b>31,81</b>
U	c	85,24	0,18
	d	122,16	0,25
	e	63,81	0,13

	<b>spolu</b>	271,21	<b>0,56</b>
	<b>Spolu</b>	<b>49 681,76</b>	<b>100</b>

Legenda: H – lesy hospodárske; O – lesy ochranné – subkategórie: a - lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, ako sú najmä sutiny, strže, strme svahy so súvislo vystupujúcou materskou horninou, nespevnené štrkové nánosy, rašeliniská, mokrade a inundačné územia vodných tokov; d - ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy; U – lesy osobitného určenia – subkategórie: c - prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou; d - v uznaných zverníkoch a samostatných bažantniacich; e - v chránených územiach a na lesných pozemkoch s výskytom biotopov európskeho významu alebo chránených druhov.

Porastová plocha zaberá 97,5 % lesných pozemkov, 2,5 % lesného pôdneho fondu sú plochy bez lesných porastov.

Tabuľka č. 79: Zastúpenie drevín v porastoch CHVÚ Strážovské vrchy

Drevina	BK	SM	BO	DZ	SC	JH	BC	HB	JS	CR	JD	
%	63,9	12,1	10,3	3,4	2,4	1,8	1,3	1,1	0,9	0,8	0,4	
Drevina	BR, DP, DL, JP, MK, JK		LM, DG, JL, OS, BX, JX, CS, LV, JM, AG, VB, BH, BP, OC, VV, VJ, JB, SP, VK, TI, OV, TB, TC, TX									
%	0,1 – 0,5		< 0,1									

Legenda - dreviny: AG-agát biely, BH-brest horský, BK- buk lesný, BC-borovica čierna, BO- borovica lesná, BP-brest poľný, BR-breza previsnutá, BX-jarabina brekyňová, CS-čerešňa vtácia, CR-dub cerový, DG-duglaska tisolistá, DL-dub letný, DZ-dub zimný, DP-drieň obyčajný, HB-hrab obyčajný, JB-jarabina vtácia, JD-jedľa biela, JH-javor horský, JL-jelša lepkavá, JM-javor mliečny, JP-javor poľný, JS-jaseň štíhly, JK-jaseň mannový, JX-jelša sivá, LM-lipa malolistá, LV-lipa veľkolistá, MK-jarabina mukyňová, OC-orech čierny, OV-orech vlašský, OS-topol' osikový, SC-smrekovec opadavý, SM-smrek obyčajný, SP-smrek pichľavý, TB-topol' biely, TC-topol' čierny, TI-topol' „I-214“, TX-tis obyčajný, VJ-borovica hladká, VB-vŕba biela, VF-vŕba krehká, VV-vŕba hlavová, VK-vŕba krovitá (krovité druhy)

Tabuľka č. 80: Veková štruktúra lesných porastov v CHVÚ Strážovské vrchy

Vek v rokoch	0	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-210
Zastúpenie v %	0,2	6,9	13,7	11,8	15,5	18,7	16,4	11,1	3,8	1,9

## 2. SOCIOEKONOMICKÉ POMERY (VYUŽÍVANIE ÚZEMIA A JEHO OKOLIA), POZITÍVNE A NEGATÍVNE FAKTORY

### 2.1. Historický kontext

V prvej polovici 20. storočia sa otvorená krajina okolo ľudských sídel v území Strážovských vrchov využívala **malorolníckym spôsobom**. V krajinnej pokrývke prevládali pásové políčka, teda krajinná štruktúra bola mozaikovitá a pomerne pestrá. Na pastvu sa využívali sklonité svahy s plytšími pôdami. Kosienky boli tiež v odľahlejších polohách. Napriek menej dôraznej **kolektivizácii** došlo aj v Strážovských vrchoch na väčšine miest k rozsiahlemu sceleniu pôvodných drobných políčok do veľkých lánov a k likvidácii nelesnej stromovej vegetácie. Príkladmi takýchto miest je okolie Zliechova, Čičmian, Súľova, Bodinej Hornej Poruby, Omšenia, sčasti Valaskej Belej. Takéto scelenie prispelo na niektorých miestach k zhoršeniu hniezdnych podmienok pre strakoša červenochrbtého, strakoša sivého, krutihlava hnedého, prhľaviara čiernochlavého, penice jarabej, hrdičky poľnej v dôsledku odstránenia drevinovej nelesnej vegetácie, avšak aj po scelení ostali často poľnými kultúrami v dôsledku horších

klimatických podmienok trávne porasty, v dôsledku čoho ostali zachované vhodné podmienky pre chriašteľa poľného.

Jednou zo zásadných zmien v nedávnej minulosti (v období r. 1950-2000) bolo **ukončenie pastvy, kosenia a opustenie políčok, prípadne aj časté následné cielené zalesňovanie alebo sukcesné zarastenie** týchto polôh lesom na niektorých menej dostupných lokalitách najmä na sklonitých a kamenistých svahoch, tiež na lokalitách vo vyšších polohách. Tako sa zväčšili vhodné biotopy pre niektoré druhy ako napríklad jariabok hôrny. Naopak sukcesné zarastanie v pokročilej fáze negatívne vplýva predovšetkým na druhy ako chriašteľ poľný, penica jarabá, pŕhľaviar čiernohlavý, strakoš červenochrbtý, hrdlička poľná.

Aj napriek spomínaným zmenám využívania poľnohospodárskej krajiny Strážovských vrchov si však územie zachovalo **pomerne pestrý mozaikovitý charakter s vysokou biodiverzitou**.

Ďalšou zo zásadných zmien vo využívaní územia bola veľmi **zvýšená intenzita obnovy lesných porastov**, teda prudké zvýšenie ťažby starých lesných porastov oproti stavu z r. 1950, čo malo výrazný vplyv na pokles početnosti druhov viazaných na zachovalé prirodzené lesné porasty s charakteristickou štruktúrou a dostatkom dutinových stromov.

## 2.2. Stručný opis aktuálneho stavu

### Polnohospodárstvo

V rámci CHVÚ Strážovské vrchy sa podľa evidencie LPIS aktívne **poľnohospodársky využíva 6 306,71 ha** poľnohospodárskej pôdy, čo predstavuje takmer 15 % z celkovej výmery CHVÚ. Z tejto plochy je 611,54 ha využívaných ako orná pôda, čo predstavuje takmer 10 (10,1) % z celkovej využívanej plochy. Trvalé trávnaté porasty sú na výmere 5 689,88 ha, čo predstavuje 90 % z celkovej využívanej plochy. Záhrady sú obhospodarované na výmere 3,74 ha a sady na výmere 1,55 ha. Pôda, na ktorej obhospodarovanie nie je bližšie špecifikované a zatiaľ nie je poľnohospodársky využívaná, má výmeru 229,98 ha.

### Lesné hospodárstvo

Približne **83 % výmery CHVÚ zaberajú lesné pozemky**. Zo zastúpenia vekových tried je zjavne ich relatívne rovnoramenné rozloženie. Viac ako 32 % zastúpenie ochranných lesov v CHVÚ sa významne podieľa aj na výmere porastov nad 100 rokov. V drevinovej skladbe súce prevažujú stanovištne vhodné druhy, avšak zastúpenie smreka obyčajného vzhľadom na dominantný 2 – 5 vegetačný stupeň prekračuje modelmi odporúčaný limit.

### Rekreácia a šport

Ťažiskovými aktivitami sú letná a zimná turistika. Letné aj zimné **turistické trasy** sú vybudované najmä v oblasti **Súľovských skál, Manínskej tiesňavy, Pružiny**. Zimné športy sú sústredené v CHVÚ do menších lyžiarskych stredísk v **Čičmanoch, Zliechove**. Vznik nových veľkých stredísk a nových foriem turizmu sa podľa územného plánu nepredpokladá.

### Poľovníctvo a rybárstvo

V CHVÚ Strážovské vrchy je evidovaných **42 poľovných revírov a zasahuje do jeleních poľovných oblastí J III. Strážovská hornatina J VIII. Malá Fatra a J II. Bebrava**.

Rybárska činnosť je vykonáva podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (dňa 1. januára 2019 nadobudne účinnosť zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve) a podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 238/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve v znení neskorších predpisov.

### Ťažba nerastných surovín

V CHVÚ je evidované **prieskumné územie Trenčianske Teplice** pre termálne podzemné vody a **Rajec – Vidošová** pre dolomit vhodný na chemicko-technologické spracovanie.

V rámci CHVÚ sú využívané výhradné ložiská s určeným **dobývacím priestorom Podlužany – lom Medzná I. (PD Podlužany)** s ťažbou dolomitu a **Beluša (Kameňolomy CS s.r.o. Žilina)** s ťažbou vápenca. V okolí Pružiny a Mojtína sa nachádzajú **chránené ložiskové územia pre vápenec**, kde sa s ťažbou neuvažuje. Najvýznamnejšie lomy sú Butkov pri Ladcoch, lomy pri Mojtíne a pri Mníchovej Lehote, v Rožňových Miticiach, pri Nitrianskom Rudne, v Uhrovci, pri Valaskej Belej, Gápli (dnes časti Valaskej Belej) a Tužine.

#### Vodné hospodárstvo

Prevažná časť CHVÚ je zároveň **chránenou vodohospodárskou oblasťou Strážovské vrchy**. V južnej časti sú vyhlásené povodia vodárenských tokov Tužina a Nitrica. V rámci územia sú rozsiahle pásma hygienickej ochrany podzemných zdrojov vody. Do západnej časti zasahuje **ochranné pásmo 2. a 3. stupňa prírodného liečivého zdroja Trenčianske Teplice**, v južnej časti okrajovo zasahuje ochranné pásmo 2. stupňa prírodného zdroja minerálnych stolových vôd **Trenčianske Mitice**. V okolí CHVÚ sú situované prírodné liečivé zdroje Rajecké Teplice a Nimnica a ich ochranné pásma. **Geotermálne vody** sú využívané v **Bojniciach, Trenčianskych Tepliciach, Rajci a Belušských Slatinách**.

#### Ďalšie využitie

V CHVÚ sa nenachádzajú výrobné podniky, skládky odpadov v prevádzke ani iné zdroje znečisťovania. Prevádzkovaná skládka tuhého komunálneho odpadu miestneho významu sa nachádza západne od CHVÚ v lokalite Lieskovec – Dubnica nad Váhom. V širšom okolí CHVÚ sa nachádza verejné civilné letisko Žilina a neverejné športové letiská Prievidza, Považská Bystrica, Dubnica nad Váhom - Slavnica. Severovýchodne od CHVÚ sa realizuje **výstavba D1 v úseku Hričovské Podhradie – Dubná Skala**, južne od CHVÚ je v príprave **rýchlostná cesta R2 úsek Pravotice – Nováky**.

#### Kultúrne dedičstvo a náboženské aktivity

Pamiatky a objekty významné z hľadiska **kultúrno-historického dedičstva** sú sústredené najmä v **Čičmanoch** (pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, národopisné expozície, tradičné folklórne podujatia) aj v ďalších obciach vo vnútri a po obvode územia (**Jablonové, Predmier, Súľov – Hradná, Lietava, Rajecké Teplice, Rajec, Pružina, Nitrianske Pravno**). V okolí územia sú pútnické miesta **Rajecké Teplice a Rajecká Lesná – Frivald**.

### **2.3. Návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cielov ochrany**

#### **2.3.1. Návrh zásad a opatrení pre jednotlivé predmety ochrany**

Návrh zásad a opatrení vychádza z **hodnotenia stavov jednotlivých druhov** vyhotovených Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v r. 2010-2012 a **odporúčaní navrhnutých expertmi** v danom hodnotení, ako aj z **odporúčaných opatrení vo vedeckých publikáciách**.

Návrh zásad a opatrení pre jednotlivé druhy je tu uvedený v celom rozsahu nutných opatrení pre udržanie optimálnej populácie dotknutých druhov. Vzhľadom na to, že potrebné opatrenia a biotopové nároky jednotlivých druhov si často v rôznom rozsahu protirečia, bolo potrebné tieto opatrenia zosúladiť. Preto taxatívne uvedené opatrenia pre jednotlivé druhy boli nižšie zoskupené do opatrení pre skupiny druhov, ktoré sú prioritou ochrany vo vyčlenených ekologicko-funkčných priestoroch. Návrh týchto finálnych opatrení (ktoré sa odporúčajú na realizáciu) v ekologicko-funkčných priestoroch však musí brať v úvahu nároky jednotlivých druhov, preto sú uvádzané v plnom rozsahu.

### 2.3.1.1. Návrh zásad a opatrení pre sokola sťahovavého

Na udržanie stavu sokola sťahovavého na stupni A priaznivého stavu je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia**:

- zabezpečiť monitoring všetkých obsadených hniezd (minimálne 3 návštevy do roka na každom hniezde) na začiatku hniezdenia v období toku (koniec februára, prvá polovica marca), uprostred hniezdenia (apríl – máj) a po vyletení mláďat (v závislosti od zasadnutia samice na znášku, spravidla začiatkom júna).
- vylúčiť alebo obmedziť skalolezeckú činnosť, športovo rekreačnú činnosť, nevhodnú lesohospodársku činnosť, turistické chodníky, ohniská vo vzdialenosťi min. 500 m okolo hniezd,
- odstrániť z okolia hniezda istiace body (po dohode s miestnym horolezeckým klubom) v lokalitách s celoročným zákazom vykonávať skalolezeckú činnosť,
- vylúčiť paragliding v hniezdom období do 500 m od hniezda,
- riešiť nevhodné lesohospodárske aktivity už v štádiu plánovania v rámci programov starostlivosti o lesy,
- hlavne v okolí hniezd, potravných biotopov a iných kolíznych bodov zabezpečiť stípy 22 kV elektrického vedenia ochrannými prvkami a nadzdušné vedenia signalizačnými zariadeniami, prípadne ich umiestniť pod zem; v prípade nových preferovať typovo a konštrukčne vhodné stípy alebo umiestnenie pod zem,
- inštalovať umelé hniezda iba v krajných prípadoch nevhodného bralného biotopu (napr. zatekanie do hniezda pod násadu), ktoré pári napriek tomu obsadil na nevhodnom mieste a ktoré neposkytuje lepšie alternatívne hniezdne možnosti,
- odstrániť ohniská na hniezdných bralách a pod nimi v okruhu min. 200 m od hniezda,
- realizovať preventívne opatrenia na zabránenie neoprávnenému vjazdu na terénnych motocykloch a štvorkolkach do blízkosti hniezd,
- realizovať ekovýchovné aktivity na propagáciu ochrany druhu a zlepšenie informovanosti cielových skupín (majitelia a správcov pozemkov, horolezci) a širokej verejnosti (prednášky, letáky, plagáty, DVD zo stráženia kamerovým systémom atď.).

### 2.3.1.2. Návrh zásad a opatrení pre výra skalného

Na udržanie stavu výra na stupni B priaznivého stavu je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia**:

- hlavne v okolí hniezd, potravných biotopov a iných kolíznych bodov zabezpečiť stípy 22 kV elektrického vedenia ochrannými prvkami a nadzdušné vedenia signalizačnými zariadeniami, prípadne ich umiestniť pod zem; v prípade nových preferovať typovo a konštrukčne vhodné stípy alebo umiestnenie pod zem,
- usmerňovať lesohospodárske aktivity v blízkosti hniezd v čase hniezdenia (v období od februára do júla), aktívne ovplyvňovať spôsob celoročného obhospodarovania lesných porastov v rámci CHVÚ pre zachovanie priaznivého stavu biotopov, vylúčiť holorubný hospodársky spôsob v porastoch nad 80 rokov,
- zabezpečiť ochranu starých redších porastov na strmých stráňach s potvrdeným výskytom výra v minulosti, resp. v súčasnosti a ponechať ich bez zásahu,
- ponechať remízky, vetrolamy a skupiny stromov na trvalých trávnatých porastoch,
- vylúčiť umelé zalesňovanie trvalých trávnatých porastov,
- podporovať extenzívnu formu hospodárenia na poľnohospodárskej pôde, podporovať celkovo obhospodarovanie krajiny, zachovať alebo rozširovať mozaikovitosť krajnejšej štruktúry,
- zamedziť chemizáciu prostredia, vrátane aplikácie pesticídov a ďalších látok negatívne ovplyvňujúcich potravný reťazec a potenciálne ovplyvňujúcich priamo alebo nepriamo úspešnosť hniezdenia a životaschopnosť populácie,
- zabezpečiť monitoring populácie

- v prípade teritorií v kameňolomoch vylúčiť ťažbu a minimalizovať návštevnosť a vyrušovanie v hniezdnom období, taktiež ponechať kameňolomy na samovývoj bez umelej rekultivácie po ukončení ťažby
- komunikovať so skalolezczami a usmerňovať ich zabehnutým systémom výnimiek na určené lokality, kde majú dovolené skalolezecké aktivity bez toho, aby ohrozovali hniezdenie výra;
- realizovať ekovýchovné a osvetové aktivity medzi cieľovými skupinami (poľovníci, lesomajitelia a pod.) a medzi širokou verejnosťou.

#### 2.3.1.3. Návrh zásad a opatrení pre žlnu sivú

Na udržanie stavu žlny sivej na stupni B priaznivého stavu je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia**:

- zabezpečiť udržiavanie podielu starých listnatých a zmiešaných lesov s dominanciou listnatých drevín nad 80 rokov, členitých lesných okrajov a priľahlých nelesných plôch bohatých na mraveniská,
- vylúčiť používanie holorubného spôsobu obnovy starých listnatých a zmiešaných lesoch s dominanciou listnáčov,
- zabezpečiť dodržiavanie ekologicky a fytogeograficky vhodného obnovného zastúpenia drevín,
- zabezpečiť ponechávanie dutinových a stojacich odumretých stromov v porastoch,
- zabezpečiť ponechávanie remízok a skupín stromov na trvalých trávnatých porastoch,
- na nelesných plochách s výskytom mravenísk nepoužívať mulčovanie,
- zabrániť zalesňovaniu trvalých trávnatých porastov,
- zabezpečiť v lesných porastoch ponechanie po ťažbe minimálne 5 stojacich stromov na 1 ha na dožitie,
- podporovať prírode blízke obhospodarovania lesa.

#### 2.3.1.4. Návrh zásad a opatrení pre orla skalného

Na udržanie stavu orla skalného je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia**:

- zabezpečiť každoročný monitoring populácie druhu v CHVÚ s dohľadaním všetkých obsadených hniezd,
- zabezpečiť vyhlásenie ochranných pásiem okolo všetkých hniezd v CHVÚ, ktoré si túto ochranu vyžadujú (mimo lesov v 5. stupni ochrany) a kontrolu ich dodržiavania,
- usmerňovaním PSL zabezpečiť v CHVÚ dostatok vhodných lesných porastov (nad 80 rokov) a ich mozaikovité rozmiestnenie v území,
- hlavne v okolí hniezd, lovných biotopov a iných kolíznych bodov zabezpečiť stĺpy 22 kV elektrického vedenia ochrannými prvkami a nadvzdušné vedenia signalizačnými zariadeniami, prípadne ich umiestniť pod zem; v prípade nových preferovať typovo a konštrukčne vhodné stĺpy alebo umiestnenie pod zem,
- rôznymi opatreniami (ekovýchova, medializácia pytliactva) vplývať na relevantnú skupinu obyvateľstva v záujme minimalizácie priameho prenasledovania,
- pri územnom rozvoji regiónu usmerňovať urbanizáciu tak, aby sa minimalizoval jej vplyv na zmenšovanie plochy lovísk.

#### 2.3.1.5. Návrh zásad a opatrení pre bociana čierneho

Na udržanie súčasného stavu populácie bociana čierneho resp. jeho zlepšenie je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia**:

- zabezpečiť ochranu porastov nad 100 rokov a ich fragmentov v dostatočnej rozlohe v blízkosti vhodných lovísk (podiel nesmie v CHVÚ klesnúť pod 20 %);

- zabezpečiť úplnú ochranu hniezdných stromov a zóny vo vzdialosti 100-200 m od hniezda a zapracovať s tým súvisiace opatrenia do PSL,
- zabezpečiť počas samotného hniezdenia (1. marec. - 31. august) vylúčenie lesohospodárskych prác v dostatočnom okruhu (do 300 m) od hniezda (SOS/BirdLife Slovensko 2012),
- zabrániť vyrušovaniu hniezdiacich bocianov čiernych inými aktivitami (napr. turistický ruch, fotografovanie a iné) prostredníctvom vhodných opatrení (upozornením, strážením alebo utajením hniezdných lokalít a pod.);
- zamedziť stavbe malých vodných elektrární so strmými brehmi;
- zamedziť odvodňovaniu mokradí, v rámci územnoplánovacích a iných dokumentov požadovať zachovanie mokradí a vhodnej štruktúry krajiny vrátane mokradí, lúk a pasienkov,
- zvýšiť kontrolu a dodržiavanie predpisov na úseku ochrany prírody, vodného a odpadového hospodárstva, najmä v súvislosti so zasypávaním mokradí,
- realizovať ekovýchovné aktivity pre miestne obyvateľstvo, zamerané na ochranu druhu a mokradí.

#### 2.3.1.6. Návrh zásad a opatrení pre včelára lesného

Na udržanie stabilného stavu populácie včelára lesného resp. jeho zlepšenie je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia**:

- monitoring populácie na celom území s cieľom lokalizácie hniezdisk a maximálneho počtu hniezd,
- zabezpečiť vyhlásenie ochranných pásiem okolo všetkých hniezd v CHVÚ, ktoré si túto ochranu vyžadujú (mimo lesov v 5. stupni ochrany) a kontrolu ich dodržiavania,
- usmerňovaním programov starostlivosti o les zabezpečiť v CHVÚ dostatok vhodných lesných porastov (nad 80 rokov) a ich rozmiestnenie v území,
- hlavne v okolí hniezd, lovných biotopov a iných kolíznych bodov zabezpečiť stípy 22 kV elektrického vedenia ochrannými prvkami a nadvzdušné vedenia signalizačnými zariadeniami, prípadne ich umiestniť pod zem; v prípade nových preferovať typovo a konštrukčne vhodné stípy alebo umiestnenie pod zem,
- rôznymi opatreniami (ekovýchova, medializácia pytliactva) vplývať na relevantnú skupinu obyvateľstva v záujme minimalizácie priameho prenasledovania,
- spoluprácovať s veľkými užívateľmi pôdy (poľnohospodárske podniky) pri používaní pesticídov hlavne v lokalitách s výskytom hniezdisk.

#### 2.3.1.7. Návrh zásad a opatrení pre tetrova hlucháňa

Pre návrat tetrova hlucháňa do Strážovských vrchov je potrebné uskutočniť maximálne vhodné opatrenia na zvrátenie nepriaznivého stavu tohto druhu prostredníctvom vhodného manažmentu jeho potenciálnych biotopov. **Opatrenia pre návrat tetrova hlucháňa** prinášajú zlepšenie podmienok pre mnohé lesné druhy - predmety ochrany v CHVÚ, sú to:

- zamedziť ďalšiemu znižovaniu výmery vhodných (väčšinou starých) porastov prostredníctvom uplatňovania podmienok v programe starostlivosti o les
- zabezpečiť na lokalitách s aktuálnym a historickým výskytom tetrova hlucháňa ochranu súvislejších lesných porastov (bučiny a jedľobučiny), t. j. lesov nad 120 rokov s nižším zakmenením s rozlohou v jednotkách rádovo km<sup>2</sup> a viac tak, že sa z nich vylúči holorubný aj podrastový spôsob obnovy lesných porastov
- upraviť existujúce nevyhovujúce porasty s potenciálom pre šírenie tetrova hlucháňa vhodnými lesovýchovnými opatreniami (presvetlenie porastov, zvýšenie rôznorodosti, porasty čučoriedky, obohatenie štruktúry o mŕtve drevo, zakmenenie znížiť pod 0,6 na kľúčových lokalitách),
- na zistených lokalitách so zaznamenaným výskytom hlucháňa v hniezdom období (tokaniská, hniezdiská, pozorovanie sliepok vodiacich kuriatka) bezodkladne zastaviť akúkoľvek lesohospodársku činnosť,

- na lokalitách výskytu hlucháňa vylúčiť výstavbu lyžiarskych stredísk a zamedziť aj inej fragmentácii týchto lokalít,
- zrušiť prikrmovanie zrninami a granulami v okolí lokalít zisteného výskytu tetrova hlucháňa a zrušiť chov diviakov v dotknutých oblastiach, naopak zabezpečiť zníženie stavu diviakov v týchto revíroch na nulu,
- akékoľvek antropické aktivity v oblastiach výskytu druhu časovo a priestorovo limitovať so zreteľom na jeho ročný cyklus (Saniga, 1998),
- monitorovať početnosť, pohlavnú a vekovú štruktúru populácie a negatívne javy,
- v lesných porastoch s aktívnym manažmentom (lesohospodárske zásahy) a výskytom tetrova hlucháňa uprednostňovať jednotlivý výber stromov, ktorého aplikáciou sa dosahuje vhodná vekovo-priestorová štruktúra lesa vyhovujúca vysokým ekologickým nárokom tetrova hlucháňa,
- v mladých lesných porastoch cielene upraviť výchovné zásahy do porastu tak, aby sa už v počiatočných výchovných štadiách vytvorili vhodné základy pre štrukturovanie porastu spĺňajúce podmienky tetrova hlucháňa,
- dôsledne plniť program záchrany tetrova hlucháňa (ŠOP SR, 2018).

#### 2.3.1.9. Návrh zásad a opatrení pre kuvika kapcavého

Na udržanie súčasného stavu druhu je potrebné realizovať **nasledovné opatrenia:**

- zachovať lesné porasty nad 80 rokov vo vyšších stupňoch ochrany (v 5., v prípade potreby aj v 4. stupni) bez zásahu,
- v lesných porastoch ponechať po ťažbe minimálne 5 stojacich stromov na 1 ha na dožitie
- ponechávať stromy s hniezdnymi dutinami,
- prípadnú ťažbu presunúť do mimohniezdneho obdobia,
- podporovať prírode blízke obhospodarovania lesa.

Ochrane druhu napomôžu aj opatrenia pre ďalšie lesné druhy, napríklad pre ďatľa čierneho.

#### 2.3.1.10. Návrh zásad a opatrení pre lelka lesného

Na udržanie súčasného stavu druhu je potrebné realizovať **nasledovné opatrenia:**

- vylúčiť používanie pesticídov na lokalitách výskytu lelka lesného, v odôvodnených prípadoch používať<sup>4</sup> len prípravky z aktuálneho Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (označenie Vt5, <http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/>) v danom roku,
- zamedziť premene sukcesne zarastajúcich pasienkov (pionierskymi drevinami ako borievka, lieska, borovica) na husto zapojený pestovaný hospodársky les.

#### 2.3.1.11. Návrh zásad a opatrení pre chriašteľa poľného

Na udržanie chriašteľa poľného na úrovni stabilného populačného trendu je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia:**

- v rámci stavebných konaní zachytávať prípadné ohrozenia hniezdných lokalít a navrhovať náhradné riešenia (napr. kompenzácie v podobe náhradných lokalít, kde sa zlepšia podmienky pre hniezdenie chriašteľa, napríklad odstránenie zárastu krovín),
- priamo na hniezdiskách je presunúť termín kosby až po 31. júli,
- vylúčiť aplikáciu chemických prípravkov a biologických hnojív vrátane hnojovice v dobe od 20. apríla do konca augusta, v odôvodnených prípadoch používať<sup>4</sup> len prípravky z

<sup>4</sup> zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov; vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín.

aktuálneho Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (označenie Vt5, <http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/>) v danom roku,

- v rámci územnoplánovacích a iných plánovacích dokumentov požadovať zachovanie trávnatých porastov a vhodnej štruktúry krajiny vrátane medzí a úhorov,
- realizovať informačné a praktické ekovýchovné aktivity pre farmárov a traktoristov o správnom spôsobe kosenia
- zvýšiť kontrolu dodržiavania predpisov na úseku ochrany prírody v čase kosby so zameraním na zachovanie trávnych porastov
- v prípade ďalšieho poklesu populácií využiť cielenú ochranu hniezdisk s využitím ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z. z.

#### 2.3.1.12. Návrh zásad a opatrení pre ďatľa čierneho

Na udržanie, resp. zlepšenie stavu ďatľa čierneho je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia**:

- zabezpečiť ochranu súvislejších lesných porastov optimálnych biotopov (t. j. lesy staršie ako 120 rokov s nižším zakmenením) s rozlohou v jednotkách rádovo v km<sup>2</sup> a viac tak, že sa z nich vylúči holorubný spôsob obnovy lesných porastov;
- ponechávať zistené hniezdne stromy na dožitie a zapracovať tieto opatrenia do PSL,
- pri holorubnej ťažbe vždy zabezpečiť, aby ostali v území dostatočné fragmenty lesného porastu nad 80 rokov ako hniezdný biotop (v celom CHVÚ tak, aby optimálne takéto porasty tvorili viac ako 10 %),
- ponechávať po ukončení (obnovnej, holorubnej) ťažby aspoň 5 stromov/ha na dožitie ako potenciálne hniezdne miesta,
- zabezpečiť, aby na hniezdiskách v hniezdom období boli vylúčené lesohospodárske zásahy a lesohospodárske práce, obzvlášť ak ide o izolované fragmenty 80 a viac ročných porastov.

#### 2.3.1.13. Návrh zásad a opatrení pre ďatľa bielochrbtého

Na udržanie, resp. zlepšenie stavu ďatľa bielochrbtého je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia**:

- zabezpečiť ochranu súvislejších lesných porastov optimálnych biotopov (t. j. lesy staršie ako 120 rokov s nižším zakmenením) s rozlohou v jednotkách rádovo km<sup>2</sup> a viac tak, že sa z nich vylúči holorubný spôsob obnovy lesných porastov;
- zabezpečiť ochranu posledných fragmentov starých lesných biotopov (viac ako 100 rokov), t. j. starých riedkych lesov, podhorských a horských bučín, jedľobučín, do obdobia, kým mladšie porasty s rovnakou skladbou drevín nedosiahnu uvedený vek,
- ponechávať zistené hniezdne stromy na dožitie a zapracovať tieto opatrenia do PSL,
- pri holorubnej ťažbe vždy zabezpečiť, aby ostali v území dostatočné fragmenty lesného porastu nad 80 rokov ako hniezdný biotop (v celom CHVÚ tak, aby optimálne takéto porasty tvorili viac ako 10 %),
- ponechávať po ukončení (obnovnej, holorubnej) ťažby aspoň 5 stromov/ha na dožitie ako potenciálne hniezdne miesta,
- zabezpečiť, aby na hniezdiskách v hniezdom období boli vylúčené lesohospodárske zásahy a lesohospodárske práce, obzvlášť, ak ide o izolované fragmenty 80 a viac ročných porastov.

#### 2.3.1.13. Návrh zásad a opatrení pre jariabka hôrneho

Na zlepšenie súčasného stavu druhu je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia**:

- v PSL presadzovať čo najvyššie zastúpenie pionierskych druhov drevín a snažiť sa o dosiahnutie nižšieho zápoja lesných porastov (pod 80 %, ideálne pod 70 %),
- na lesných rúbaniach ponechávať minimálne 20 % pokryvnosti prirodzeného výskytu pionierskych drevín, ako je lieska, jarabina, breza,
- sledovať vplyv negatívnych faktorov na výskyt a početnosť druhu na jednotlivých lokalitách,
- redukovať veľkoplošnú náhodnú ťažbu (v dôsledku veternej kalamity) resp. podrastovú aj a holorubnú úmyselnú ťažbu dreva v optimálnych aj suboptimálnych biotopoch,
- vylúčiť prikrmovanie a vnadenie diviakov v oblastiach s výskytom jariabka hôrneho a zrušiť chov diviakov v dotknutých oblastiach.

#### 2.3.1.14. Návrh zásad a opatrení pre penicu jarabú

Na zachovanie resp. zlepšenie stavu penice jarabej sú potrebné tieto **manažmentové opatrenia**:

- vylúčiť aplikáciu chemických prípravkov a biologických hnojív vrátane hnojovice v dobe od 20. apríla do konca augusta, v odôvodnených prípadoch používať<sup>4</sup> len prípravky z aktuálneho Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (označenie Vt5, <http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/>) v danom roku,
- zachovať (prípadne podľa potreby aj vysadiť) solitérne stromy,
- v rámci územnoplánovacích a iných plánovacích dokumentov požadovať zachovanie trávnatých porastov a vhodnej mozaikovej krajiny vrátane medzí a úhorov,
- podporovať tradičné mozaikovité využívanie poľnohospodárskej pôdy,
- zvýšiť kontrolu dodržiavania predpisov na úseku ochrany prírody v súvislosti s výrubom drevín rastúcich mimo lesa,
- zamedziť zalesňovaniu xerotermných krovitých strání,
- vhodne tlmitiť sukcesnú premenu jej hniezdnych biotopov na les, ideálne obnovením extenzívnej pastvy.

#### 2.3.1.15. Návrh zásad a opatrení pre ďatľa prostredného

Na udržanie, resp. zlepšenie stavu ďatľa prostredného je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia**:

- zabezpečiť ochranu súvislejších lesných porastov optimálnych biotopov (t. j. lesy staršie ako 120 rokov s nižším zakmenením) s rozlohou v jednotkách rádovo km<sup>2</sup> a viac tak, že sa z nich vylúči holorubný spôsob obnovy lesných porastov;
- zabezpečiť ochranu posledných fragmentov starých lesných biotopov (viac ako 100 rokov), t. j. starých listnatých lesov prirodzeného charakteru, do obdobia, kým mladšie porasty s rovnakou skladbou drevín nedosiahnu uvedený vek,
- ponechávať zistené hniezdne stromy na dožitie a zapracovať tieto opatrenia do PSL,
- pri ťažbe vždy zabezpečiť, aby ostali v území dostatočné fragmenty lesného porastu nad 80 rokov ako hniezdny biotop (v celom CHVÚ tak aby optimálne takéto porasty tvorili viac ako 10 %),
- ponechávať po ukončení (obnovnej, holorubnej) ťažby aspoň 5 stromov/ha na dožitie ako potenciálne hniezdne miesta,
- zabezpečiť, aby na hniezdiskách v hniezdom období boli vylúčené lesohospodárske zásahy a lesohospodárske práce, obzvlášť ak ide o izolované fragmenty 80 a viac ročných porastov.

#### 2.3.1.16. Návrh zásad a opatrení pre muchárika červenohrdlého

Na zlepšenie súčasného stavu muchárika červenohrdlého je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia**:

- zabezpečiť ochranu posledných fragmentov starých lesných biotopov (viac ako 100 rokov), t. j. starých riedkych lesov, podhorských a horských bučín, jedľobučín do obdobia, kým mladšie porasty s rovnakou skladbou drevín nedosiahnu uvedený vek,
- zabezpečiť na vhodných miestach vhodnú štruktúru lesných porastov (lesy s menším zápojom korún, zakmenenie min. 0,6 - 0,8),
- zabezpečiť kľud na jeho hniezdiskách v hniezdnom období (vylúčenie lesohospodárskych zásahov a lesohospodárskych prác), obzvlášť ak ide o posledné fragmenty optimálnych biotopov.

#### 2.3.1.17. Návrh zásad opatrení pre muchárika bielokrkého

Na udržania súčasného stavu muchárika malého je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia**:

- zabezpečiť ochranu posledných fragmentov starých lesných biotopov (viac ako 100 rokov), t. j. starých listnatých až zmiešaných lesov prirodzeného charakteru do obdobia, kým mladšie porasty s rovnakou skladbou drevín nedosiahnu uvedený vek,
- zabezpečiť na vhodných miestach vhodnú štruktúru lesných porastov (lesy s menším zápojom korún, zakmenenie min. 0,6 - 0,8),
- zabezpečiť kľud na jeho hniezdiskách v hniezdnom období (vylúčenie lesohospodárskych zásahov a lesohospodárskych prác).

#### 2.3.1.18. Návrh zásad a opatrení pre strakoša červenochrbtého

Cieľom opatrení na zachovanie minimálne súčasnej úrovne strakoša červenochrbtého v CHVÚ na úrovni 300-400 párov, alebo jej nárast by malo byť zachovávanie dostatočného porastu krovín a nelesnej vegetácie v poľnohospodárskej krajine a realizácia opatrení, ktoré sú zamerané pre iné poľnohospodárske druhy, ako je napríklad strakoš sivý (*Lanius excubitor*).

#### 2.3.1.19. Návrh zásad a opatrení pre strakoša sivého

Na zlepšenie stavu strakoša sivého je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia**:

- vylúčiť aplikáciu chemických prípravkov a biologických hnojív vrátane hnojovice v dobe od 20. apríla do konca augusta, v odôvodnených prípadoch používať<sup>4</sup> len prípravky z aktuálneho Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (označenie Vt5, <http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/> v danom roku,
- zachovať (prípadne podľa potreby aj vysadiť) vyššie solitérne stromy ako potenciálne miesta hniezdenia a na lov,
- v rámci územnoplánovacích a iných plánovacích dokumentov požadovať zachovanie trávnatých porastov a vhodnej mozaikovitej krajiny vrátane medzí a úhorov,
- podporovať tradičné mozaikovité využívanie poľnohospodárskej pôdy najmä ako pasienky a kosné lúky,
- zvýšiť kontrolu dodržiavania predpisov na úseku ochrany prírody v súvislosti s výrubom drevín rastúcich mimo lesa,
- v prípade ďalšieho poklesu populácií využiť cielenú ochranu hniezdisk s využitím ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 434/2011 Z. z.

#### 2.3.1.20. Návrh zásad a opatrení pre prepelicu poľnú

Na udržanie prepelice poľnej na úrovni stabilného populačného trendu je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia**:

- vylúčiť aplikáciu chemických prípravkov a biologických hnojív vrátane hnojovice v dobe od 20. apríla do konca augusta, v odôvodnených prípadoch používať<sup>4</sup> len prípravky z aktuálneho Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (označenie Vt5, v danom roku)
- v rámci územnoplánovacích a iných plánovacích dokumentov požadovať zachovanie trávnatých porastov a vhodnej štruktúry krajiny vrátane medzí a úhorov,
- zvýšiť kontrolu dodržiavania predpisov na úseku ochrany prírody v čase kosby so zameraním na zachovanie trávnatých porastov,
- v rámci stavebných konaní zachytávať prípadné ohrozenia hniezdných lokalít a navrhovať náhradné riešenia (kompenzácie v podobe náhradných lokalít, kde sa zlepšia podmienky pre hniezdenie druhu, napríklad odstránenie zárustu krovín),
- realizovať informačné a praktické ekovýchovné aktivity pre farmárov a traktoristov o správnom spôsobe kosenia.

#### 2.3.1.21. Návrh zásad a opatrení pre krutihlava hnedého

Na udržanie súčasného stavu krutihlava hnedého je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia**:

- zamedziť výrubu starých a dutinových stromov v poľnohospodárskej krajine,
- zachovať (prípadne podľa potreby aj vysadiť) solitérne stromy ako budúcich miest hniezdenia,
- v rámci územnoplánovacích a iných plánovacích dokumentov požadovať zachovanie trávnatých porastov a vhodnej mozaikovitej krajiny vrátane medzí a úhorov,
- podporovať tradičné mozaikovité využívanie poľnohospodárskej pôdy najmä ako pasienky a kosné lúky,
- zamedziť veľkoplošnému mulčovaniu pasienkov,
- zvýšiť kontrolu dodržiavania predpisov na úseku ochrany prírody v súvislosti s výrubom drevín rastúcich mimo lesa.

#### 2.3.1.22. Návrh zásad a opatrení pre príhaviara čiernohlavého

Na udržanie súčasného stavu príhaviara čiernohlavého je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia**:

- vylúčiť aplikáciu chemických prípravkov a biologických hnojív vrátane hnojovice v dobe od 20. apríla do konca augusta, v odôvodnených prípadoch používať<sup>4</sup> len prípravky z aktuálneho Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (označenie Vt5, <http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/>) v danom roku,
- v rámci územnoplánovacích a iných plánovacích dokumentov požadovať zachovanie trávnatých porastov a vhodnej mozaikovitej krajiny vrátane medzí a úhorov,
- podporovať tradičné mozaikovité využívanie poľnohospodárskej pôdy.

#### 2.3.1.23. Návrh zásad a opatrení pre hrdličku poľnú

Na udržanie súčasného stavu hrdličky poľnej je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia**:

- vylúčiť aplikáciu chemických prípravkov a biologických hnojív vrátane hnojovice v dobe od 20. apríla do konca augusta, v odôvodnených prípadoch používať<sup>5</sup> len prípravky z aktuálneho Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (označenie Vt5, <http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/>) v danom roku,

- zachovať (prípadne podľa potreby aj vysadiť) vyššie solitérne stromy ako potenciálne miesta hniezdenia,
- v rámci územnoplánovacích a iných plánovacích dokumentov požadovať zachovanie trávnatých porastov a vhodnej mozaikovej krajiny vrátane medzí a úhorov,
- podporovať tradičné mozaikovité využívanie poľnohospodárskej pôdy najmä ako pasienky a kosné lúky,
- zvýšiť kontrolu dodržiavania predpisov na úseku ochrany prírody v súvislosti s výrubom drevín rastúcich mimo lesa.

#### 2.3.1.24. Návrh zásad a opatrení pre žltochvosta lesného

Na zlepšenie súčasného stavu žltochvosta lesného je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia**:

- zabezpečiť legislatívne, resp. medzinárodnými dohovormi ochranu druhu na zimoviskách a počas migrácie, t. j. zabrániť odlesňovaniu a nelegálnemu odchytu do sietí počas migrácie,
- zabezpečiť ochranu starých lesných biotopov (viac ako 100 rokov), t. j. starých riedkych lesov, podhorských a horských bučín, jedľobučín (okrem časti patriacich do rezervácií s 5. stupňom ochrany) do obdobia, kým mladšie porasty s rovnakou skladbou drevín nedosiahnu uvedený vek,
- zabezpečiť na vhodných miestach vhodnú štruktúru lesných porastov (lesy s menším zápojom korún, zakmenenie min. 0,6),
- v intravilánoch s výskytom žltochvostov lesných obzvlášť starostlivo dbať na udržanie biotopov druhu, t. j. zabezpečiť ochranu starých drevín v záhradách, resp. parkov, v prípade obcí, ktoré svoje právomoci v ochrane drevín nevykonávajú dostatočne odborne, je potrebné, aby si právomoc ochrany drevín opäťovne vyhradili okresné úrady,
- v intravilánoch zabezpečiť dostatočné hniezdne možnosti napr. vyvesovaním polobúdok pre ich hniezdenie,
- zabezpečiť kľud na jeho hniezdiskách v hniezdnom období (vylúčenie lesohospodárskych zásahov a lesohospodárskych prác), obzvlášť ak ide o posledné fragmenty optimálnych biotopov.

#### 2.3.1.25. Návrh zásad a opatrení pre muchára sivého

Na udržanie súčasného stavu muchára sivého je potrebné realizovať nasledovné **manažmentové opatrenia**:

- zabezpečiť ochranu posledných fragmentov starých lesných biotopov (viac ako 100 rokov), t. j. starých riedkych listnatých lesov do obdobia, kým mladšie porasty s rovnakou skladbou drevín nedosiahnu uvedený vek,
- zabezpečiť na vhodných miestach vhodnú štruktúru lesných porastov (lesy s menším zápojom korún, zakmenenie min. 0,6),
- v intravilánoch s výskytom muchárov sivých obzvlášť starostlivo dbať na udržanie biotopov druhu, t. j. zabezpečiť ochranu starých drevín v záhradách, resp. parkoch.

### **2.3.2. Členenie územia na ekologicko-funkčné priestory (EFP)**

Predmetom ochrany v CHVÚ Strážovské vrchy je **25 vtáčích druhov**. Pre ich ochranu vzhľadom na vyššie uvedené cieľové stavy boli na základe odporúčaní expertov a vedeckých dát navrhnuté zásady opatrení. Mnohé z týchto opatrení sú podobné, na druhej strane sa však viaceré opatrenia vzájomne vylučujú. Aj druhy, ktoré sú predmetom ochrany v CHVÚ, sa nevyskytujú rozptylene po celom území, ale väčšinou vo väzbe na konkrétny biotop, štruktúru krajiny alebo lokalitu. Preto bolo nutné rozčleniť CHVÚ Strážovské vrchy pri návrhu opatrení na **6 ekologicko-funkčných priestorov** (EFP), kde sa návrhy opatrení prispôsobia druhom,

ktorých ochrana bude v danom EFP prioritou. Zároveň sa tak zabezpečí, aby prijaté opatrenia mohli efektívne priniesť výsledky. Ide o tieto EFP:

- EFP1 – hniezdiská sokola sťahovavého a výra skalného (výmera 3 344 ha),
- EFP2 – hniezdiská lesných druhov, dutinových hniezdičov a dravcov (výmera 35 146 ha),
- EFP3 – hniezdiská chriašteľa, prepelice poľnej, strakoša sivého a loviská dravcov (výmera 4 123,9 ha),
- EFP4 – hniezdiská muchárika červenohrdlého a ďatľa bielochrbtého (výmera 3 978 ha)
- EFP5 – hniezdiská penice jarabej, strakoša červenochrbtého a hrdličky poľnej (výmera 2 756 ha),
- EFP6 – hniezdiská ďatľa prostredného a muchárika bielokrkého (výmera 8 897 ha).

Prehľadná mapa je v obrázku č. 1, podrobnejšie zobrazenie je mapovou prílohou č. 6.4.


Obrázok č. 1 Členenie CHVÚ Strážovské vrchy na ekologicko-funkčné priestory

Legenda

chvu028

EFP

- EFP1 – hniezdiská sokola sťahovavého a výra skalného
- EFP2 – hniezdiská lesných druhov, dutinových hniezdičov a dravcov
- EFP3 – hniezdiská chriašteľa, prepelice poľnej, strakoša sivého a loviská dravcov
- EFP4 – hniezdiská muchárika červenohrdlého a ďatľa bielochrbtého
- EFP5 – hniezdiská penice jarabej, strakoša červenochrbtého a hrdličky poľnej
- EFP6 – hniezdiská ďatľa prostredného a muchárika bielokrkého



### 2.3.2.1. Návrh zásad a opatrení v EFP1 – hniezdiská sokola sťahovavého a výra skalného

**EFP1 – hniezdiská sokola sťahovavého a výra skalného** je vyčlenený na lokalitách, ktoré predstavujú ich dôležité reprodukčné – hniezdzne lokality: Súľovské skaly, Manínska tiesňava, Podskalský Roháč, Stráne, Rohatín, Rokoš, Smradlavý vrch, Sokolie, Svrčinovec.

Prevažujúcim druhom pozemku v EFP1 sú v súčasnosti lesné pozemky (99 % rozlohy celého EFP), zvyšok tvoria trvalé trávne porasty (1 %).

Zásady opatrení v EFP1 vychádzajú predovšetkým z podobných topických nárokov sokola sťahovavého a výra skalného, pre ktorých ochranu je toto EFP prioritne vyčlenené. Opatrenia realizované v tomto území však budú prínosom aj pre ochranu lesných druhov. Pre zlepšenie podmienok druhov, ktorých ochrana je v EFP1 prioritou je potrebné realizovať nasledovné opatrenia:

- vylúčiť stavbu nových elektrických vedení v tomto EFP a jeho okolí (do 5 km od hranice CHVÚ) alebo ich umiestniť pod zem,
- hlavne v okolí hniezd, potravných biotopov a iných kolíznych bodov zabezpečiť stípy 22 kV elektrického vedenia ochrannými prvkami a nadzdušné vedenia signalizačnými zariadeniami, prípadne ich umiestniť pod zem; v prípade nových preferovať typovo a konštrukčne vhodné stípy alebo umiestnenie pod zem,
- v spolupráci so subjektmi cestovného ruchu usmerniť pohyb návštevníkov mimo hniezdných lokalít,
- vylúčiť alebo obmedziť skalolezeckú činnosť, športovo rekreačnú činnosť, nevhodnú lesohospodársku činnosť, turistické chodníky, ohniská vo vzdialenosťi min. 500 m okolo hniezd sokola sťahovavého,
- vylúčiť vstup motorových vozidiel mimo existujúcej cestnej siete,
- zabezpečiť monitoring populácie výra skalného,
- zabezpečiť monitoring všetkých obsadených hniezd sokola sťahovavého,
- riešiť nevhodné lesohospodárske aktivity už v štádiu plánovania PSL,
- usmerňovať lesohospodárske aktivity v blízkosti hniezd v čase hniezdenia (v období od februára do júna), aktívne ovplyvňovať spôsob celoročného obhospodarovania lesných porastov v rámci CHVÚ pre zachovanie priaznivého stavu biotopov, vylúčiť holorubný spôsob hospodárenia porastoch,
- zabezpečiť ochranu starých redších porastov na strmých stráňach s potvrdeným výskytom výra v minulosti, resp. v súčasnosti a ponechať ich bez zásahu,
- v prípade hniezdenia druhov v kameňolomoch vylúčiť ťažbu a minimalizovať návštevnosť a vyrušovanie v hniezdom období, taktiež ponechať kameňolomy na samovývoj, bez umelej rekultivácie po ukončení ťažby,
- ponechať remízky, vetrolamy a skupiny stromov na trvalých trávnatých porastoch,
- vylúčiť umelé zalesňovanie trvalých trávnatých porastov,
- podporovať extenzívnu formu hospodárenia na poľnohospodárskej pôde a celkovo obhospodarovanie krajiny, zachovať alebo rozširovať mozaikovitosť krajinej štruktúry,
- zamedziť chemizáciu prostredia, veľkoplošnej aplikácií pesticídov, herbicídov a ďalších látok negatívne ovplyvňujúcich potravný reťazec a potenciálne ovplyvňujúcich priamo alebo nepriamo úspešnosť hniezdenia a životaschopnosť populácie,
- realizovať ekovýchovné a osvetové aktivity medzi cieľovými skupinami (napr. majitelia a správcovia pozemkov a pod.) a medzi širokou verejnosťou,
- prehodnotiť vyhlášku MŽP SR č. 434/2009 Z. z. z hľadiska toho, či obmedzenia sú dostatočné na ochranu predmetov ochrany podľa vyššie uvedených navrhovaných opatrení.

### 2.3.2.2. Návrh zásad a opatrení v EFP2 – hniezdiská lesných druhov, dutinových hniezdičov a dravcov

**EFP2 – hniezdiská lesných druhov, dutinových hniezdičov a dravcov** je vyčlenený na rozsiahlejších lesných porastoch za účelom ochrany dutinových hniezdičov, hniezdisk dravcov a ostatných lesných druhov. Tento EFP pokrýva väčšinu CHVÚ (Strážovské vrchy aj Súľovské vrchy), južne začína pri obci Omastiná a severne končí pri obci Paština Závada. Ide o lesný EFP s menej vhodnou štruktúrou lesa vzhľadom na nároky viac citlivých druhov.

Prioritou ochrany v EFP2 sú predovšetkým druhy bocian čierny, jariabok hôrny, lelek lesný, orol skalný, kuvik kapcavý, muchár sivý, ďateľ čierny, včelár lesný, žlna sivá, žltochrost lesný a tetrov hlucháň. Pre zlepšenie podmienok pre tieto druhy je potrebné realizovať nasledovné **opatrenia:**

- pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 30 % obnovných porastov starších ako 80 rokov,
- ak nie je možné pri spracúvaní kalamít ponechať v poraste 30 % porastov starších ako 80 rokov na 100 ha, potom pri spracúvaní kalamít ponechávať na dožitie zdravé stromy, ak je to možné aspoň 5 stromov na 1 ha,
- vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch okrem aplikácie na drevnú hmotu uskladnenú na odvoznych miestach a z lesných komunikácií v prípade jej napadnutia podkôrnym alebo drevokazným hmyzom a okrem použitia chemických prípravkov na ochranu prirodzeného zmladenia a lesných kultúr pred škodami spôsobenými raticovou zverou; pričom v týchto prípadoch je možné použiť<sup>4</sup> len prípravky z aktuálneho Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (označenie Vt5, <http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/> v danom roku),
- vyhľadávať a nechať na dožitie stromy s dutinami,
- v prípade realizácie investícii do cestovného ruchu, resp. aj iných väčších investícii, dôsledne posúdiť ich vplyv na predmety ochrany a povoliť ich len v prípade, ak neexistuje riziko významného negatívneho dopadu,
- zabezpečiť výrobu a vyvesenie búdok pre kuvika kapcavého v porastoch nad 40 rokov tak, aby spolu na 1 km<sup>2</sup> porastoch vo veku 41-100 rokov boli umiestnené minimálne jedna až dve búdky pre tento druh,
- podporiť ostatné dutinové hniezdiče (napr. žltochrost lesný) inštaláciou rozmerovo vhodných búdok v počte minimálne 2 búdky na 1 km<sup>2</sup> lesa,
- ponechávať v lese zlomy, ktoré nepredstavujú hygienické riziko pre ostatné lesné porasty, a ktoré zároveň v prsnej výške dosahujú priemer minimálne 30 cm,
- zabezpečiť ochranné zóny okolo hniezd dravcov a bociana čierneho tak, že vo vnútornej časti zóny sa nesmie celý rok zasahovať (v mimohniezdnom období iba výchovné zásahy netýkajúce sa hniezdnego stromu, no nie je možné porast vyrúbať v tomto období) a ak je hniezdo neobsadené minimálne 5 rokov, ponechať porast vo vnútornej zóne v rovnakom režime. V prípade vonkajšej zóny zabezpečiť úplné obmedzenie lesohospodárskych zásahov v hniezdnom období. Vnútorná časť zóny by mala mať spravidla polomer minimálne 100 metrov (v závislosti od nárokov druhov) a vonkajšia časť zóny 300-500 metrov. Tieto zóny by sa mali vyhlasovať pre ochranu hniezd orla skalného, včelára lesného a bociana čierneho, kuvika kapcavého,
- v PSL presadiť čo najvyššie zastúpenie pionierskych drevín pre potreby ochrany jariabky hôrneho,
- vylúčiť prikrmovanie poľovnej zveri zrninami a zabezpečiť progresívne zníženie stavu diviakov v revíroch s výskytom jariabky hôrneho,
- zabezpečiť monitoring predmetov ochrany, u vzácnejších druhov všetkých hniezdisk, u ostatných vybranej vzorky hniezdisk,
- zabezpečiť monitoring a kontrolnú činnosť dodržiavania obmedzení z dôvodu ochrany prírody v rámci predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny.
- zapracovať uvedené opatrenia ako zásady hospodárenia v lese do novo vypracúvaných PSL,

- vylúčiť stavbu nových elektrických vedení v tomto EFP a jeho okolí (do 5 km od hranice CHVÚ) a existujúce vedenia a stĺpy ošetriť prvkami pre zabránenie kolíziám s vtáctvom alebo ich umiestniť pod zem,
- vylúčiť zásahy do mokradí vrátane ich zalesňovania a zabezpečiť revitalizáciu poškodených mokradí,
- usmerniť fotografovanie a filmovanie vtáctva v území tak, aby neohrozovalo vtáky na hniezdiskách a neviedlo k zmareniu hniezdení,
- realizovať informačné a praktické ekovýchovné aktivity pre lesníkov a miestnych obyvateľov o význame CHVÚ a dôležitosťi zmeny prístupu k hospodáreniu v CHVÚ.
- zabezpečiť prehodnotenie vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z. z. z hľadiska toho, či obmedzenia sú dostatočné pre ochranu prioritných druhov v EFP2.

Na lokalitách s aktuálnym alebo historickým výskytom tetrova hlucháňa v EFP2:

- zabezpečiť na lokalitách s aktuálnym a historickým výskytom tetrova hlucháňa ochranu súvislejších lesných porastov (bučiny a jedľobučiny), t. j. lesov nad 120 rokov s nižším zakmenením s rozlohou v jednotkách rádovo km<sup>2</sup> a viac tak, že sa z nich vylúči holorubný aj podrastový spôsob obnovy lesných porastov,
- upraviť existujúce nevyhovujúce porasty s potenciálom pre šírenie tetrova hlucháňa vhodnými lesovýchovnými opatreniami (presvetlenie porastov, zvýšenie rôznorodosti, porasty čučoriedky, obohatenie štruktúry o mŕtve drevo, zakmenenie znížiť pod 0,6 na kľúčových lokalitách),
- na zistených lokalitách so zaznamenaným výskytom hlucháňa v hniezdnom období (tokaniská, hniezdiská, pozorovanie sliepok vodiacich kuriatka) bezodkladne zastaviť akúkoľvek lesohospodársku činnosť,
- na lokalitách výskytu hlucháňa vylúčiť výstavbu lyžiarskych stredísk a zamedziť aj inej fragmentácii týchto lokalít,
- v lesných porastoch s aktívnym manažmentom (lesohospodárske zásahy) a výskytom tetrova hlucháňa uprednostňovať jednotlivý výber stromov, ktorého aplikáciou sa dosahuje vhodná vekovo-priestorová štruktúra lesa vyhovujúca vysokým ekologickým nárokom tetrova hlucháňa,
- v mladých lesných porastoch cielene upraviť výchovné zásahy do porastu tak, aby sa už v počiatočných výchovných štadiánoch vytvorili vhodné základy pre štrukturovanie porastu spĺňajúce podmienky tetrova hlucháňa,
- dôsledne plniť program záchrany tetrova hlucháňa (ŠOP SR, 2018).

#### 2.3.2.3. Návrh zásad a opatrení v EFP3 – hniezdiská chriašteľa polného, prepelice polnej, strakoša sivého a loviská dravcov

**EFP3 – hniezdiská chriašteľa, prepelice polnej, strakoša sivého a loviská dravcov** je určený na ochranu poľnohospodárskych druhov vtáctva a zabezpečenie vhodnej trofickej základne pre dravce a bociany čierne hniezdiace v CHVÚ. Ide väčšinou o extravidľavé obci Súľov, Záskalie, Hradná, Bodina, Prečín, Počarová, Mojtí, Podmalenica, Zliechov, Valaská Belá, Horná Poruba, Kamenc, Čičmany, Čierna Lehota, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Trebichava, Timoradza, Lútov a Marušina.

Prioritou ochrany v EFP3 sú predovšetkým druhy chriašteľ poľný, strakoš sivý, prepelica polná, pŕhľaviar čiernohlavý a loviská bociana čierneho, orla skalného, včelára lesného a výra skalného. Pre zlepšenie a udržanie podmienok pre tieto druhy je potrebné realizovať nasledovné **opatrenia**:

- zabezpečiť dlhodobé poľnohospodárske využitie pozemkov v tomto EFP vhodnou formou na významnej časti EFP (pastva, kosenie) a zabrániť opusteniu poľnohospodárskej pôdy,
- za týmto účelom presadzovať aj vhodné nastavenie dotácií v rámci poľnohospodárskej politiky na národnej a európskej úrovni,

- vylúčiť zmenu trvalých trávnych porastov na ornú pôdu alebo iný druh pozemku, vylúčiť rozoranie trvalého trávneho porastu a presadzovať zachovanie trvalých trávnych porastov aj v rámci územnoplánovacej dokumentácie,
- zabezpečiť kosenie trvalých trávnych porastov od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od stredu do kraja, alebo od kraja ku kraju; vylúčiť kosenie od kraja do stredu,
- vylúčiť kosenie a mulčovanie na určených hniezdných lokalitách chriaštela poľného,
- vylúčiť aplikáciu chemických prípravkov a biologických hnojív vrátane hnojovice v dobe od 20. apríla do konca augusta, v odôvodnených prípadoch používať<sup>4</sup> len prípravky z aktuálneho Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (označenie Vt5, <http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/>) v danom roku,
- v rámci stavebných konaní (ako aj v procese EIA a súvisiacich konaniach) zachytávať prípadné ohrozenia hniezdných lokalít predmetov ochrany (hniezdisk chriaštela poľného, strakoša sivého) a navrhovať náhradné riešenia,
- v prípade ďalšieho poklesu populácií chriaštela poľného využiť cielenú ochranu hniezdisk s využitím ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z.z.,
- zachovávať dostatočné porasty krovín a stromovej vegetácie na hniezdných lokalitách strakoša červenochrbtého,
- zachovať a podľa potreby aj vysadiť vyššie solitérne stromy ako potenciálne miesta hniezdenia a lovú strakoša sivého a dravcov,
- v rámci územnoplánovacích a iných dokumentov požadovať zachovanie mokradí,
- v prípade investícií do cestovného ruchu, resp. aj iných väčších investícií dôsledne posúdiť ich vplyv na predmety ochrany a povoliť ich len v prípade, že neexistuje riziko významne negatívneho vplyvu na predmety ochrany,
- zabezpečiť kontrolnú činnosť dodržiavania obmedzení právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajany, vrátane kontroly dodržiavania podmienok kosby so zameraním na zachovanie trvalých trávnych porastov,
- hlavne v okolí hniezd, potravných biotopov a iných kolíznych bodov zabezpečiť stípy 22 kV elektrického vedenia ochrannými prvkami a nadvzdušné vedenia signalizačnými zariadeniami, prípadne ich umiestniť pod zem; v prípade nových preferovať typovo a konštrukčne vhodné stípy alebo umiestnenie pod zem,
- vylúčiť zásahy do mokradí a zabezpečiť revitalizáciu poškodených mokradí,
- realizovať informačné a praktické ekovýchovné aktivity pre farmárov a miestnych obyvateľov o význame CHVÚ a dôležitosťi zmeny prístupu k hospodáreniu v CHVÚ,
- prehodnotiť vyhlášku MŽP SR č. 434/2009 Z. z. z hľadiska toho, či obmedzenia sú dostatočné pre ochranu prioritných druhov v EFP3.

#### 2.3.2.4. Návrh zásad a opatrení v EFP4 – hniezdiská ďatľa bielochrbtého a muchárika červenohrdlého

**EFP4 – hniezdiská ďatľa bielochrbtého a muchárika červenohrdlého** je vyčlenený na rozsiahlejších lesných porastoch za účelom ochrany dutinových hniezdičov a ostatných lesných druhov. Je v lokalitách Melková a Jankov vršok, Rokoš, Malá Homoľa, Suchý vrch, Cvingel, Udrina, Lukovec, Žihľavník, s.p.r. Rysia, Homôľka, Suchá Hora, Vápeč, Ostrý vrch, Čičerman, Javorina, Strážov, Gábrišské vrchy, Diamami, Hrubá Kečka, Svrčinovec, Rohatín, Rohatá skala, Ostrá Malenica, Čierny vrch, Šibeničná, hrebeň Súľovskej Kečky, Holý vrch a Brada.

Ide o EFP s najväčším podielom lesa (prevažne bučín a jedľobučín). Väčšinou ide už o vyhlásené rezervácie s 5. stupňom ochrany prírody a porasty v kategórii ochranných lesov. Podľa členenia na druhy pozemkov je prevažujúcim pozemkom v tomto EFP lesný pozemok (100 % z celkovej rozlohy EFP). Lesy v tomto EFP pokrývajú celkovú plochu 3 978 ha a najväčšie zastúpenie tu majú lesy vo veku nad 80 rokov.

Prioritou ochrany v EFP4 sú predovšetkým druhy ďatel' bielochrbtý, muchárik červenohrdlý, žltouchost lesný. Pre zlepšenie ich podmienok je potrebné realizovať nasledovné opatrenia:

- zabezpečiť bezsahový režim v porastoch, keďže ide o veľmi citlivé druhy na kvalitu hniezdných biotopov - vyžadujú prirodzené lesy pralesovitého charakteru,
- zabezpečiť monitoring predmetov ochrany, vybranej vzorky hniezdisk,
- zabezpečiť kontrolnú činnosť dodržiavania obmedzení právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny,
- zapracovať uvedené opatrenia ako zásady hospodárenia v lese do novo vypracúvaných PSL,
- vylúčiť stavbu nových elektrických vedení v tomto EFP a jeho okolí (do 5 km od hranice CHVÚ) alebo ich umiestniť pod zem,
- hlavne v okolí hniezd, potravných biotopov a iných kolíznych bodov zabezpečiť stípy 22 kV elektrického vedenia ochrannými prvkami a nadzdušné vedenia signalizačnými zariadeniami, prípadne ich umiestniť pod zem; v prípade nových preferovať typovo a konštrukčne vhodné stípy alebo umiestnenie pod zem,
- realizovať informačné a praktické ekovýchovné aktivity pre vybrané cieľové skupiny vrátane miestnych obyvateľov o význame CHVÚ a dôležitosťi zmeny prístupu k hospodáreniu v CHVÚ,
- prehodnotiť vyhlášku MŽP SR č. 434/2009 Z. z. z hľadiska toho, či obmedzenia sú dostatočné pre ochranu prioritných druhov v EFP4.

#### 2.3.2.5. Návrh zásad a opatrení v EFP5 – hniezdiská penice jarabej, strakoša červenochrbtého a hrdličky poľnej

**EFP5 – hniezdiská penice jarabej, strakoša červenochrbtého a hrdličky poľnej** je výčlenený za účelom ochrany uvedených druhov a ostatných druhov charakteristických štruktúr poľnohospodárskej krajiny. Je v lokalitách Lúky pod Súľovskými skalami, Minarčík, Hradná, Kostolec, Maníec, Bodina, Prečín, Počarová, úpätie Veľkej skaly, Hnútie, Mojtíň, Zliechov, Košecké Rovné, Čičmany, Priečna, Javorina, Horná Poruba, Dolná poruba, Štefanec, Okolné laxy Valaskej Belej, Čavoj, Omšonie, Šípkov, Čierna Lehota, Trebichavica, Timoradza, Lutov, Suché, Horné Vestenice, Dolné Vestenice, Nitrianske Sučany.

Prioritou ochrany v EFP5 sú predovšetkým druhy penica jarabá, strakoš červenochrbtý, hrdlička poľná, krutihlav hnedý. Pre zlepšenie a udržanie podmienok pre tieto druhy je potrebné realizovať nasledovné opatrenia:

- vylúčiť zmenu trvalého trávneho porastu na ornú pôdu alebo iný druh pozemku, vylúčiť rozoranie trvalého trávneho porastu a presadzovať zachovanie trvalých trávnych porastov aj v rámci územnoplánovacej dokumentácie,
- vylúčiť mulčovanie v určených hniezdných lokalitách,
- vylúčiť aplikáciu chemických prípravkov a biologických hnojív vrátane hnojovice v dobe od 20. apríla do konca augusta, v odôvodnených prípadoch používať<sup>4</sup> len prípravky z aktuálneho Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (označenie Vt5, <http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/>) v danom roku,
- zachovávať dostatočné porasty krovín na hniezdných lokalitách vybraných druhov,
- zachovať solitérne stromy, stromy s dutinami ako potenciálne miesta hniezdenia hrdličky poľnej, krutihlava hnedého a iných druhov, a v prípade podľa potreby vysadiť nové stromy pre zabezpečenie udržateľného potenciálu hniezdných možností,
- zamedziť zalesňovaniu xerotermných krovitých strání,
- zabezpečiť dlhodobé poľnohospodárske využitie pozemkov v tomto EFP vhodnou formou na významnej časti EFP a zabrániť úplnému opusteniu poľnohospodárskej pôdy,
- vhodne tlmit' sukcesnú premenu jej hniezdných biotopov na les, ideálne obnovením extenzívnej pastvy,
- v rámci územnoplánovacích a iných dokumentov požadovať zachovanie mokradí,
- zabezpečiť monitoring predmetov ochrany,

- zabezpečiť kontrolnú činnosť dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny, so zameraním na zachovanie trvalých trávnych porastov.
- prehodnotiť vyhlášku MŽP SR č. 434/2009 Z. z. z hľadiska toho, či obmedzenia sú dostatočné pre ochranu prioritných druhov v EFP5.

#### 2.3.2.6. Návrh zásad a opatrení v EFP6 – hniezdiská ďatľa prostredného a muchárika bielokrkého

**EFP6 – hniezdiská ďatľa prostredného a muchárika bielokrkého** je vyčlenený na rozsiahlejších lesných porastoch za účelom ochrany dutinových hniezdičov a ostatných lesných druhov. Je umiestnený vo väčších celkoch: Knaží stôl, Baské, Rokoš, Rokošské predhorie, Javorinka, Pružina, Močiarna.

Ide o EFP s najväčším podielom listnatých lesov a to v pásme dubín až dubových bučín.

Prioritou ochrany v EFP6 sú predovšetkým druhy ďateľ prostredný, muchárik bielokrký, muchár sivý. Pre zlepšenie podmienok pre tieto druhy je potrebné realizovať nasledovné opatrenia:

- pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 30 % obnovných porastov starších ako 100 rokov,
- ponechávať na dožitie zdravé stromy, aspoň 5 stromov na 1 ha,
- ponechávať v lese zlomy, ktoré nepredstavujú hygienické riziko pre ostatné lesné porasty a zároveň dosahujú v prsnej výške priemer minimálne 30 cm,
- vyhľadávať a nechať na dožitie stromy s dutinami.
- vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch okrem aplikácie na drevnú hmotu uskladnenú na odvoznych miestach a z lesných komunikácií v prípade jej napadnutia podkôrnym alebo drevokazným hmyzom a okrem použitia chemických prípravkov na ochranu prirodzeného zmladenia a lesných kultúr pred škodami spôsobenými raticovou zverou; pričom v týchto prípadoch je možné použiť<sup>4</sup> len prípravky z aktuálneho Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (označenie Vt5, <http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/> v danom roku),
- podporiť ostatné dutinové hniezdiče (žltouchost lesný) inštaláciou rozmerovo vhodných búdkov počte minimálne 2 búdky na 100 ha lesa,
- zabezpečiť ochranné zóny okolo hniezd dravcov a bociana čierneho tak, že vo vnútornej časti zóny sa nesmie celý rok zasahovať (v mimohniezdnom období iba výchovné zásahy netýkajúce sa hniezdneho stromu, no nie je možné porast vyrúbať v tomto období) a ak je hniezdo neobsadené minimálne 5 rokov, ponechať porast vo vnútornej zóne v rovnakom režime. V prípade vonkajšej zóny zabezpečiť úplné obmedzenie lesohospodárskych zásahov v hniezdnom období. Vnútorná časť zóny by mala mať spravidla polomer minimálne 100 metrov (v závislosti od nárokov druhov) a vonkajšia časť zóny 300-500 metrov. Tieto zóny by sa mali vyhlasovať pre ochranu hniezd orla skalného, včelára lesného a bociana čierneho,
- zabezpečiť monitoring predmetov ochrany a vybranej vzorky hniezdisk,
- zabezpečiť kontrolnú činnosť dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny,
- zapracovať uvedené opatrenia ako zásady hospodárenia v lese do novo vypracúvaných PSL,
- vylúčiť stavbu nových elektrických vedení v tomto EFP a jeho okolí (do 5 km od hranice CHVÚ) alebo ich umiestniť pod zem,
- hlavne v okolí hniezd, potravných biotopov a iných kolíznych bodov zabezpečiť stĺpy 22 kV elektrického vedenia ochrannými prvkami a nadvzdušné vedenia signalizačnými zariadeniami, prípadne ich umiestniť pod zem; v prípade nových preferovať typovo a konštrukčne vhodné stĺpy alebo umiestnenie pod zem,

- realizovať informačné a praktické ekovýchovné aktivity pre vybrané cieľové skupiny a miestnych obyvateľov o význame CHVÚ a dôležitosti zmeny prístupu k hospodáreniu v CHVÚ,
- prehodnotiť vyhlášku MŽP SR č. 434/2009 Z. z. z hľadiska toho, či obmedzenia sú dostatočné pre ochranu prioritných druhov v EFP5.

### 3. CIELE STAROSTLIVOSTI A OPATRENIA NA ICH DOSIAHNUTIE

#### 3.1. Stanovenie dlhodobých cieľov starostlivosti v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory

Do roku 2048 boli stanovené nasledovné dlhodobé ciele ochrany:

1. Zachovať súčasný stav druhov kuvik kapcavý<sup>5</sup>, muchárik červenohrdlý<sup>6</sup>, ďateľ bielochrbtý<sup>7</sup>, ďateľ čierny<sup>8</sup>, bocian čierny<sup>9</sup>, výr skalný<sup>10</sup>, prepelica poľná<sup>11</sup>, chriašteľ poľný<sup>12</sup>, pŕhľaviar čiernochlavý<sup>13</sup>, hrdlička poľná<sup>14</sup>, strakoš červenochrbtý<sup>15</sup>, penica jarabá<sup>16</sup>, krutihlav hnedy<sup>17</sup>, lelek lesný<sup>18</sup>, muchár sivý<sup>19</sup>, ďateľ prostredný<sup>20</sup> a muchárik bielokrký<sup>21</sup> na úrovni B priaznivého stavu, zachovať súčasný stav druhov orol skalný<sup>22</sup>, sokol stáhovavý<sup>23</sup> a včelár lesný<sup>24</sup> na úrovni A priaznivého stavu.
2. Zlepšiť súčasný stav druhu žlna sivá<sup>25</sup> z úrovne B na úroveň A priaznivého stavu, zlepšiť nepriaznivý stav druhov jariabok hôrny<sup>26</sup>, žltochvost lesný<sup>27</sup> a strakoš sivý<sup>28</sup> na úroveň B priaznivého stavu zvrátením poklesu a zlepšením stavu populácie týchto druhov a zvrátiť stav extincie druhu tetrov hlucháň<sup>29</sup>.
3. Zabezpečiť adresný právny rámec pre zlepšenie kvality biotopov predmetov ochrany v CHVÚ Strážovské vrchy pre zefektívnenie ochrany v území.

<sup>5</sup> Tab. č. 23: Definovanie stavu druhu kuvik kapcavý

<sup>6</sup> Tab. č. 47: Definovanie stavu druhu muchárik červenohrdlý

<sup>7</sup> Tab. č. 35: Definovanie stavu druhu ďateľ bielochrbtý

<sup>8</sup> Tab. č. 32: Definovanie stavu druhu ďateľ čierny

<sup>9</sup> Tab. č. 14: Definovanie stavu druhu bocian čierny

<sup>10</sup> Tab. č. 5: Definovanie stavu druhu výr skalný

<sup>11</sup> Tab. č. 59: Definovanie stavu druhu prepelica poľná

<sup>12</sup> Tab. č. 29: Definovanie stavu druhu chriašteľ poľný

<sup>13</sup> Tab. č. 65: Definovanie stavu druhu pŕhľaviar čiernochlavý

<sup>14</sup> Tab. č. 68: Definovanie stavu druhu hrdličká poľná

<sup>15</sup> Tab. č. 53: Definovanie stavu druhu strakoš červenochrbtý

<sup>16</sup> Tab. č. 41: Definovanie stavu druhu penica jarabá

<sup>17</sup> Tab. č. 62: Definovanie stavu druhu krutihlav hnedy

<sup>18</sup> Tab. č. 26: Definovanie stavu druhu lelek lesný

<sup>19</sup> Tab. č. 74: Definovanie stavu druhu muchár sivý

<sup>20</sup> Tab. č. 44: Definovanie stavu druhu ďateľ prostredný

<sup>21</sup> Tab. č. 50: Definovanie stavu druhu muchárik bielokrký

<sup>22</sup> Tab. č. 11: Definovanie stavu druhu orol sklaný

<sup>23</sup> Tab. č. 2: Definovanie stavu druhu sokol stáhovavý

<sup>24</sup> Tab. č. 17: Definovanie stavu druhu včelár lesný

<sup>25</sup> Tab. č. 8: Definovanie stavu druhu žlna sivá

<sup>26</sup> Tab. č. 38: Definovanie stavu druhu jariabok hôrny

<sup>27</sup> Tab. č. 71: Definovanie stavu druhu žltochvost lesný

<sup>28</sup> Tab. č. 56: Definovanie stavu druhu strakoš sivý

<sup>29</sup> Tab. č. 20: Definovanie stavu druhu tetrov hlucháň

4. Zvýšiť ekologické povedomie miestnych obyvateľov a zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi a správcami pozemkov pri ochrane vtáctva.

Podrobnejšia špecifikácia, v ktorých EFP budú ciele realizované, je uvedená v časti 3.4., v tabuľke č. 82.

#### Limitujúce a modifikujúce faktory (z hľadiska plnenia dlhodobých cieľov)

##### *Vnútorné prírodné faktory*

Významným vnútorným prírodným faktorom, ktorý negatívne vplýva na populáciu druhov a dlhodobý cieľ č. 1 a predovšetkým na jariabka hôrneho sú **extrémy počasia**.

U druhov ako jariabok hôrny a tetrov hlucháň je dôležité, aby v čase vodenia mláďať nedochádzalo k vpádu chladného vzduchu a intenzívny snehovým zrážkam. Vzhľadom na globálnu zmenu klímy však dochádza k nástupu jarného oteplenia skôr ako v minulosti, a teda aj k skoršiemu nástupu hniezdenia. Napriek tomu sa však aj v neskorších týždňoch hniezdenia opakujú vlny s chladnejším počasím a často aj s napadnutím vysokej vrstvy snehu, ktorá môže byť pre prežitie mláďať kurovitých vtákov kritická. Opakovanie týchto nepriaznivých poveternostných podmienok môže prispieť k poklesu populácie, ak je úspešnosť hniezdenia minimálna. Pre minimalizovanie tohto vplyvu je preto nevyhnutné udržiavanie populácie na dostatočne veľkej úrovni (a teda aj dostatočne rozsiahlych vhodných biotopov), ktorá bude odolná voči niektorým sezónam s nižšou mierou hniezdnej úspešnosti.

Extrémy počasia vplývajú menšou mierou aj na ostatné druhy (*Crex crex*, *Coturnix coturnix*), teda na dosiahnutie cieľa 2. Pre minimalizovanie tohto vplyvu je vhodné len udržiavanie populácie druhov na dostatočne veľkej úrovni a teda aj dostatočne rozsiahlych vhodných biotopov s vhodnou formou obhospodarovania. Dostupnosť potravy (hmyz) môžu extrémy počasia zasiahnuť u druhov (*Pernis apivorus*, *Muscicapa striata*, *Ficedula parva*, *Ficedula albicollis*). Nástup chladných períod v jarnom období môže spôsobiť malú reprodukciu blanokrídlovcov - potrava včelára lesného a taktiež aj čiastočne rozvoj početnosti hmyzu v korunovom priestore stromov. Pre minimalizovanie tohto vplyvu je vhodné udržiavanie populácie druhov na dostatočne veľkej úrovni a teda aj dostatočne rozsiahlych vhodných biotopov.

Vnútorným prírodným faktorom s dopadom na lesné druhy je aj **pôsobenie škodlivých činiteľov v lese**.

Tými sú napríklad vetrové polomy potenciálne negatívne ovplyvňujúce dosiahnutie cieľov 2 a 3. V prípade, ak sú vetrové polomy na väčšej ploche, môžu mať negatívny dosah na hniezdiská niektorých dravcov, ktorým môžu zaniknúť dostupné hniezdne biotopy. Hoci to v CHVÚ Strážovské vrchy zatiaľ nie je významný problém, na zníženie rizika je dôležité, aby pri hospodárení v lese boli porasty dostatočne štrukturované a minimalizované rovnoveké kultúry. Tým sa podarí vplyv na porasty a teda aj na hniezdiská druhov značne obmedziť. Problémom môže byť vznik vetrových polomov v hniezdom období spôsobujúci zmarenie hniezdenia. Jeho minimalizácia je možná vhodným štrukturovaním porastov, ako aj udržaním populácií druhov na dostatočne veľkej úrovni, aby dokázala prekonáť aj roky s nižšou hniezdnou úspešnosťou. Väčším problémom môže byť veľkoplošné spracovanie takýchto kalamít, kedy dochádza k úplnému zániku hniezdných biotopov nielen pre dravce a kurovité, ale aj pre ostatné druhy naviazané na lesné prostredie.

Pre minimalizovanie uvedených rizík je veľmi dôležité zachovať aspoň niektoré biotopy druhov, ktoré sú predmetom ochrany v CHVÚ. Takými možnosťami je pri kalamitnej tåžbe ponechávať zdravé stromy (ich skupiny) alebo zlomy, ktoré nepredstavujú hygienické riziko pre okolité porasty, ideálne v počte aspoň 5 jedincov na hektár na dožitie (v prípade zdravých stromov). Takýto zásah zníži dosah na niektoré hniezdiče, ktoré sa dokážu dočasne prispôsobiť aj životu na polomoch, ak ostanú zachované hniezdne stromy (ďateľ čierny, kuvik kapcavý a iné). Zároveň je však nutné ponechávať aj súvislejšie fragmenty biotopov bez zásahu.

Vnútornými prírodnými faktormi, ktoré negatívne vplývajú na populáciu druhov a dlhodobý cieľ č. 1 je **sukcesia**.

Sukcesia vo veľmi pokročilom štádiu predstavuje zánik biotopov (v procese premeny na súvislý les) pre strakoša červenochrbtého, penicu jarabú, krutihlavu hnedého. Obzvlášť v stredných polohách dochádza k opúšťaniu pôdy a následnému zarastaniu lesom, ktorý už nie je vhodný pre spomínané druhy ako hniezdisko. Minimalizovanie tohto vplyvu je najväčším problémom práve na málo dostupných plochách, opustených pasienkoch a strmých stráňach. Vyžaduje väčšie motivovanie poľnohospodárov pre udržanie extenzívneho hospodárenia na pôde vhodným nastavením dotácií.

Sukcesia môže byť problémom aj pre dosiahnutie cieľov pre druhy prepelica poľná, chriašteľ poľný, včelár lesný. Naopak pre druhy strakoš sivý, strakoš červenochrbtý, penica jarabá, hrdlička poľná nástup niektorých sukcesných štádií je prospešný. Pre jariabku hôrneho je nástup sukcesie sprevádzaný rastom pionierskych drevín vo vyšších polohách územia (napr. pasienky nadväzujúce na les) taktiež prospešný.

#### *Vnútorné človekom podmienené faktory*

Splnenie dlhodobých cieľov 1-4 môže byť značne limitované, alebo modifikované viacerými človekom podmienenými faktormi.

Na populácie, ktoré sú predmetmi ochrany v CHVÚ môže limitujúco vplývať **poľnohospodárstvo**. V tomto ohľade je dôležité predovšetkým **opúšťanie pôdy, rozorávanie trvalých trávnych porastov a zmena plodín**. Všetky uvedené zmeny v poľnohospodárskej praxi vedú k zníženiu dostupnosti hniezdných biotopov pre predmety ochrany, ako je napríklad chriašteľ poľný, prepelica poľná, ale aj k zníženiu dostupnosti potravy pre dravce, ako aj pre iné druhy. Z tohto pohľadu je obzvlášť problematická intenzifikácia hospodárenia vedúca k rozorávaniu trvalých trávnych porastov, zmene preferovaných plodín a veľkoplošnému pestovaniu hustosiatých plodín, ako napríklad repka, ktoré značne limitujú dostupnosť potravy, a vedú buď k zníženiu hniezdej úspešnosti, alebo priamo k opusteniu niektorých hniezdných teritorií. Je preto veľmi dôležité monitorovať dôsledky týchto zmien v území a zasadzovať sa za také nastavenie dotácií pre poľnohospodárov, ktoré ich bude motivovať k poľnohospodárstvu šetrnému k prírode v rámci CHVÚ a zároveň aj dostatočne motivovať, aby nedochádzalo k opúšťaniu pôdy.

Limitujúcim faktorom môže byť aj **intenzívne lesné hospodárenie** obzvlášť vo vzťahu k dosiahnutiu cieľa 2 a to zlepšiť súčasný stav tetrova hlucháňa. Intenzívne využívanie hospodárskych lesov, kde sa vyskytuje, môže mať pre prítomnosť tetrova hlucháňa fatálne následky, ak nezostane zachovaný dostatočný rozsah biotopov s vhodnou štruktúrou. Obzvlášť problematické sú lesy s vysokým zakmenením ako aj nízkym vekom. Vhodným usmernením hospodárenia v PSL sa môže úplne predísť nenaplneniu uvedeného cieľa. Intenzívne lesné hospodárenie v prípade spracovania kalamít na veľkých plochách môže byť značne limitujúce aj pre ďalšie druhy pre dosiahnutie cieľov 1 a 2. Je preto veľmi dôležité pri plánovanej obnove lesa vhodne štrukturovať porasty a pri náhodných ťažbách ponechávať na dožitie zdravé stromy podľa minimálnych nárokov druhov, prípade zlomy ako hniezdne podmienky. Pri zohľadnení ekologických nárokov druhov je možné skíbiť hospodárenie v lese a to aj náhodnú ťažbu tak, aby sa minimalizoval negatívny dopad na uvedené dlhodobé ciele. V prípade CHVÚ Strážovské vrchy dochádza aj k **rýchlej urbanizácii územia**. V dôsledku toho sa rozširujú mnohé obce, často na úkor aluviálnych mokradí, trávnych porastov a dochádza tak aj k ohrozeniu hniezdisk vtáctva. Preto je dôležité, aby rozvoj osídlenia bol usmerňovaný podľa územných plánov, tie prešli pri schvaľovaní procesom posúdenia dopadov na predmety ochrany aby sa minimalizovali zmeny v schvaľovaných územných plánoch ako aj pri zmenách a doplnkoch už schválených územných plánov.

Pre realizáciu ochranárskych opatrení je dôležité zachovanie **podpory verejnosti pre ochranu prírody** ako takú. Podpora verejnosti môže značne na území CHVÚ Strážovské vrchy varírovať v závislosti od celkovej socio-ekonomickej situácie, od spôsobu presadzovaniu opatrení ochrany prírody a od celkového informovania o ochrane prírody a hodnotách územia. V prípade zhoršenia ekonomickej situácie sa na prioritnejšie pozície vnímania dôležitosti

ochrany prírody dostanú iné sociálno-ekonomicke aspekty života spoločnosti. V takejto situácii je ľažšie hľadať podporu verejnosti na presadzovanie efektívnejšej ochrany prírody a minimalizovať tak dosah tohto faktoru. Tento dosah sa dá minimalizovať tým, že sa dlhodobo poukazuje na význam ochrany prírody nielen z pohľadu ekonomickeho, ale celkového prínosu pre kvalitu života (zachovanie lesov pre ochranu pred povodňami ako aj vhodných mikroklimatických podmienok a pod.). Rovnako ako celková ekonomická situácia (v prípade jej negatívneho vývoja) môže zhoršiť vnímanie verejnosti aj nedostatočná komunikácia s verejnosťou pri prijímaní opatrení pre ochranu prírody. Na minimalizovanie tohto faktora je veľmi dôležité vždy v predstihu pred prijatím opatrení o nich rokovať s dotknutými obcami, vlastníkmi, užívateľmi, prípadne aj občianskymi združeniami a iniciatívami. Takyto inkluzívny prístup v konečnom dôsledku nemusí viesť len k vysvetľovaniu potrieb opatrení prijatých pre ochranu prírody a nájdenia optimálneho spôsobu ich realizácie (teda skíbenie požiadaviek dotknutých vlastníkov, obcí, iných subjektov a ochrany prírody), ale môže viesť aj k nájdeniu nových osôb ochotných aktívne pomáhať ochrane prírody a tak prispieť pozitívne k naplneniu všetkých dlhodobých cieľov.

#### *Vonkajšie prírodné faktory*

Na dlhodobé ciele 1,2,3 vplýva aj viacero vonkajších prírodných faktorov. Niektoré z nich nie je možné ovplyvniť na národnej úrovni, resp. vôbec. Preto ich je potrebné vziať do úvahy pri hodnotení populácií aj v samotnom CHVÚ Strážovské vrchy pre prípad, ak tieto faktory majú dosah na populácie v CHVÚ.

Spomedzi vonkajších prírodných faktorov majú na naše populácie dopad poveternostné podmienky – **extrémy počasia na migračných trasách a zimoviskách**. V prípade druhov ako bocian čierny, prepelica poľná, chriašteľ poľný, strakoš červenochrbtý, žltouchost lesný, muchárik červenohrdlý, muchárik bielokrký, muchár sivý, krutiľav hnédý, hrdlička poľná a včelár lesný nie je pre zachovanie populácií týchto druhov dôležité len udržanie vhodných podmienok na hniezdenie v samotnom CHVÚ. Takmer rovnako dôležitú rolu hrajú aj podmienky na zimoviskách a migračných trasách. V prípade suchých rokov vedúcich k nedostatku potravy na zimoviskách tak môže byť mortalita uvedených druhov vyššia a môže viesť aj k nižšiemu obsadeniu revírov po návrate zo zimovísk. Na minimalizovanie tohto vplyvu je potrebné udržiavať biotopy uvedených druhov v dobrej kvalite za účelom zvýšenia hniezdnej úspešnosti, ktorá bude kompenzovať potenciálne straty na zimoviskách a migračných trasách v dôsledku poveternostných extrémov.

Medzi vonkajšími prírodnými faktormi hrá významnú rolu **globálna zmena klímy**. Táto viedie už v súčasnosti k posunu areálu rozšírenia niektorých vtáčích druhov a ovplyvňuje aj druhovú skladbu biotopov. Rovnako aj prípadné zmeny v zrážkových pomeroch (ich pokles) sa môžu negatívne dotknúť niektorých druhov (napríklad chriašteľa poľného). Dosah globálnej zmeny klímy môžu čiastočne minimalizovať aj politické opatrenia prijaté na globálnej úrovni. Vzhľadom na prírodné hodnoty, ktoré môže Slovensko stratiť, je potrebné pokračovať v posilnení medzinárodných záväzkoch na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy a na posilnenie adaptačných schopností chránených území.

Vonkajším prírodným faktorom veľmi významne vplývajúcim na populácie pôvodných druhov vtáctva je **šírenie nepôvodných inváznych druhov šeliem** a ostatných živočíchov. V CHVÚ Strážovské vrchy bol zistený zatial len psík medvedíkovitý (*Nyctereutes procyonoides*), zatial mimo citlivých lokalít výskytu kurovitých vtákov - jariabka hôrneho. Vzhľadom na potenciálne negatívne dopady na dosiahnutie cieľov ochrany, a to obzvlášť cieľa 2, je potrebné výskyt psíka medvedíkovitého monitorovať v celom CHVÚ a v prípade jeho zistenia zabezpečiť eradicáciu výskytu.

#### *Vonkajšie človekom podmienené faktory*

Viaceré antropické faktory s pôvodom mimo CHVÚ Strážovské vrchy môžu tiež významne prispieť k horšiemu ako očakávanému naplneniu dlhodobých cieľov starostlivosti o CHVÚ.

Stavba nových **investičných zámerov za hranicami CHVÚ**. Je potrebné pozorne monitorovať investičné zámery nielen v samotnom CHVÚ, ale aj v príľahom okolí, kde môžu investičné zámery vytvoriť závažné riziká pre naplnenie cieľov. Pre ich odvrátenie alebo minimalizovanie je nutné využívať nástroje, vrátane procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

V prípade cieľov 1 a 2 hrá významnú rolu aj ochrana biotopov stáhovavých druhov na zimoviskách a migračných trasách, ako aj samotných druhov počas migrácie a zimovania. **Odlesňovanie, intenzifikácia poľnohospodárstva na zimoviskách a nelegálny lov počas migrácie** pritom predstavujú jedno z hlavných rizík pre stáhovavé druhy. Nelegálny lov počas migrácie sa týka predovšetkým krajín v okolí Stredomoria ako je Turecko, Cyprus, Libanon a Egypt. Nelegálnym lovom tu nie sú ohrozené len bežné druhy, ale aj mnohé vzácné druhy, migrujúce bociany, dravce. Vzhľadom na nestabilnú politickú situáciu v týchto krajinách sa nedá očakávať zmena legislatívy na ochranu vtáctva v týchto štátoch ani pri tlaku verejnosti z Európy. Preto je možné očakávať, že u ďalekých migrantov zimujúcich v Afrike sa tento nelegálny lov môže aj významne podpísť na negatívnom trende predmetného druhu aj v samotnom CHVÚ. Na minimalizovanie pôsobenia tohto faktoru je tak potrebné zabezpečiť vhodné podmienky na hniezdenie druhov v CHVÚ za účelom zvýšenia hniezdnej úspešnosti. Podobne ľažko ovplyvniteľným procesom je aj proces odlesňovania v subsaharskej Afrike vplývajúci negatívne na dostupnosť zimovísk žltouchvosta lesného ako aj intenzifikácia poľnohospodárstva v týchto krajinách. Preto jediným efektívnym opatrením je potreba zabezpečenia podmienok na hniezdenie a dožadovanie sa plnenia medzinárodných dohovorov na úseku ochrany prírody a krajiny.

Na naplnenie cieľov 1, 2 a 3 môže negatívne pôsobiť aj celková nepriaznivá **ekonomická a sociálna situácia v Európe**. V prípade nepriaznivého vývoja ekonomiky prioritou môžu byť iné opatrenia, a teda aj celkové vnímanie ochrany prírody ako priority sa môže posunúť na nižšie úrovne a sťažiť tak dosiahnutie dlhodobých cieľov. Na minimalizovanie dopadu tohto vplyvu je potrebné systematicky upozorňovať na prínosy zachovalej prírody, ktoré poskytujú služby spoločnosti nezávisle od ekonomickej situácie (napr. vodozádržná schopnosť zachovalých lesov, pričom zachovalé lesy sú dôležité aj pre prežitie predmetov ochrany a pod.).

### **3.2. Stanovenie operatívnych cieľov v nadváznosti na ekologicko-funkčné priestory**

**1. Zachovať súčasný stav druhov kuvik kapcavý, muchárik červenohrdlý, ďateľ bielochrbty, bocian čierny, výr skalný, prepelica poľná, chriašteľ poľný, príhľaviar čiernochlavý, hrdička poľná, strakoš červenochrbty, penica jarabá, krutihlav hnedý, lelek lesný, muchár sivý, ďateľ prostredný a muchárik bielokrký na úrovni B priaznivého stavu, zachovať súčasný stav druhov orol skalný, sokol stáhovavý a včelár lesný na úrovni A priaznivého stavu**

- 1.1. Zvýšiť a udržať úroveň populácie druhu kuvik kapcavý na priemernej úrovni minimálne 18 obsadených revírov.
- 1.2. Zlepšiť stav biotopov na lokalitách muchárika červenohrdlého zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.
- 1.3. Zlepšiť stav na lokalitách ďatľa bielochrbtého zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.
- 1.4. Zlepšiť stav biotopov na lokalitách ďatľa čierneho zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.
- 1.5. Zvýšiť a udržať populáciu bociana čierneho na priemernej úrovni minimálne 20 obsadených revírov.
- 1.6. Zvýšiť a udržať populáciu výra skalného na priemernej úrovni minimálne 23 obsadených revírov.
- 1.7. Zvýšiť a udržať populáciu prepelice poľnej na minimálnej úrovni 40 volajúcich samcov.

- 1.8. Zvýšiť a udržať populáciu chriašteľa poľného na minimálnej úrovni 40 volajúcich samcov.
- 1.9. Udržať populáciu pŕhľaviara čiernohlavého priemerne na úrovni minimálne 53 párov udržaním biotopov druhu vo vhodnom stave a v dostatočnej rozlohe.
- 1.10. Udržať populáciu hrdličky poľnej priemerne na úrovni minimálne 100 párov udržaním biotopov druhu vo vhodnom stave a v dostatočnej rozlohe.
- 1.11. Udržať populáciu strakoša červenochrbtého priemerne na úrovni minimálne 350 párov udržaním biotopov druhu vo vhodnom stave a v dostatočnej rozlohe.
- 1.12. Udržať populáciu penice jarabej priemerna na úrovni minimálne 35 párov udržaním biotopov druhu vo vhodnom stave a v dostatočnej rozlohe.
- 1.13. Udržať populáciu krutihlava hnedého priemerne na úrovni minimálne 70 párov.
- 1.14. Udržať populáciu lelka lesného priemerne na úrovni minimálne 9 párov.
- 1.15. Udržať populáciu muchára sivého priemerne na úrovni minimálne 550 párov zachovaním resp. zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.
- 1.16. Udržať populáciu ďatľa prostredného priemerne na úrovni minimálne 135 párov zachovaním resp. zvýšním súčasného podielu starých lesných porastov.
- 1.17. Udržať populáciu muchárika bielokrkého priemerne na úrovni 1050 párov zachovaním resp. zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.
- 1.18. Udržať populáciu orla skalného na minimálnej úrovni 5 obsadených revírov.
- 1.19. Udržať populáciu sokola štahovavého na minimálnej úrovni 14 obsadených revírov.
- 1.20. Udržať populáciu včelára lesného na minimálnej úrovni 40 obsadených revírov.
- 1.21. Zabezpečiť aby podiel lesa vo veku nad 80 r. zostal v EFP3 minimálne 35 %.

**2. Zlepšiť súčasný stav druhu žlna sivá z úrovne B na úroveň A priaznivého stavu, zlepšiť nepriaznivý stav druhov jariabok hôrny, žltouchost lesný a strakoš sivý**

**3. na úroveň B priaznivého stavu zvrátením poklesu a zlepšením stavu populácie týchto druhov a zvrátiť stav extincie druhu tetrov hlucháň.**

- 2.1. Zlepšiť stav biotopov na lokalitách žlny sivej zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.
- 2.2. Zvýšiť a udržať úroveň populácie druhu jariabok hôrny na priemernej úrovni 30 obsadených revírov.
- 2.3. Zlepšiť stav biotopov na lokalitách žltouchosta lesného zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.
- 2.4. Zvýšiť a udržať populáciu strakoša sivého na priemernej úrovni minimálne 6 obsadených revírov.
- 2.5. Zvrátiť nulový stav populácie druhu tetrov hlucháň prostredníctvom komplexných prípravných opatrení na ochranu a tvorbu vhodného biotopu.
- 2.6. Obmedziť dostupnosť potravy pre druhy predujúce jariabka hôrneho a tetrova hlucháňa na lokalitách ich výskytu a v bezprostrednom okolí a znížiť riziko predácie týchto druhov.
- 2.7. Zabezpečiť, aby v území počas platnosti programu starostlivosti podiel bukových a jedľovobukových porastov vo veku nad 80 rokov neklesol pod súčasný stav.

**3. Zabezpečiť adresný právny rámc pre zlepšenie kvality biotopov predmetov ochrany v CHVÚ Strážovské vrchy a pre zefektívnenie ochrany v území.**

- 3.1. Na základe zmapovania druhov prehodnotiť vyhlášku MŽP SR č. 434/2009 Z. z. a ak je relevantné, pripraviť a prerokovať nový právny predpis.
- 3.2. Vyhodnotiť adresnosť právneho rámcu pre ochranu predmetov ochrany a ak je relevantné, pripraviť a prerokovať nový právny predpis.

**4. Zvýšiť ekologické povedomie miestnych obyvateľov a zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi a správcami pozemkov pri ochrane vtáctva.**

- 4.1. Zlepšiť úroveň poznania vtáctva, propagovať myšlienku ochrany významnej ornitologickej lokality a vybudovať infraštruktúru pre pozorovanie vtáctva na lokalite.

4.2. Zapájať miestnych obyvateľov do praktickej ochrany vtáctva, zapájať vlastníkov a užívateľov pozemkov do vykonávania praktického manažmentu.

Podrobnejšia špecifikácia, v ktorých EFP budú ciele realizované, je uvedená v časti 3.4., v tabuľke č. 82.

### **3.3. Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy**

Základné rozhodnutia a ciele hospodárenia sú spracované pre lesné porasty podľa identifikátorov v modeloch hospodárenia. Kompletný výstup platných modelov pre jednotlivé programy starostlivosti o lesy (PSL) je súčasťou Všeobecnej časti PSL pre jednotlivé lesné celky (LC). Kombináciou identifikátorov na území CHVÚ vzniká celkovo niekoľko sto modelov. V tabuľke na nasledujúcich stranach sú uvedené základné rámce vybrané z modelov s najväčším zastúpením v CHVÚ.

Rubné doby, obnovné doby a cielové drevinové zastúpenie sú optimalizované najmä s ohľadom na kategóriu lesa, drevinovú skladbu a stanovištne podmienky danej lesnej oblasti. Konštrukcia modelov umožňuje reagovať aj na zhoršený zdravotný stav, keďže výrazne zvýšený stupeň ohrozenia porastu umožňuje znížiť rubnú dobu, prípadne upraviť obnovnú dobu. Hospodárske spôsoby uvedené v modeloch hospodárenia sú maximálne prípustnou formou obnovy lesa a zmena na jemnejšie formy je v právomoci odborného lesného hospodára (OLH), ktorý ich uplatní formou úpravy PSL, v rámci plnenia tohto programu starostlivosti po predchádzajúcej dohode vlastníkov pozemkov a orgánmi štátnej správy ochrany prírody a krajiny resp. poverenou organizáciou, o spôsobe realizácie tohto programu starostlivosti a kompenzáciách dotknutých subjektov.

Dominantný hospodársky spôsob je podrastový, hlavne jeho maloplošná forma. V odôvodnených prípadoch v rámci zákona modely hospodárenia umožňujú aj použitie kombinácie podrastového a holorubného hospodárskeho spôsobu. V ochranných lesoch je navrhovaná obnova úcelovým hospodárskym spôsobom. V maloplošných chránených územiach s 5. stupňom ochrany sa pri modeloch hospodárenia uplatňujú identifikátory: spôsob obhospodarovania – bez zásahu (v PSL uvádzaný ako: „b“) s obnovnou dobou uplatňovanou pri porastoch v bezzásahovom režime (v PSL uvádzaný ako: „98“). Na ostatných lokalitách, kde je v rámci záujmu predmetov ochrany daného územia vhodný bezzásahový režim, tento sa operatívne uplatní v rámci už vyššie spomínanej úpravy aktuálne platných PSL odborným lesným hospodárom s adekvátnou kompenzáciou. Pri postupných obnovách dotknutých PSL budú všetky požiadavky ochrany prírody zapracované priamo v ich súčastiach a to v opise porastov a pláne hospodárskych opatrení.

Tabuľka č. 81: Základné rámce z Modelov hospodárenia pre hlavné identifikátory

Lesná oblasť	Pod- oblasť	Kategória	Tvar	Spôsob obhosp.	Písmeno kategórie	HSLT	Porastový typ	SOP	Rubná doba	Obnovná doba	Hosp. spôsob	Hosp. spôsob	Cieľové drevinové zloženie								
													DR	%	DR	%	DR	%	DR	%	
25	A	H	V		202	30	1	130	30	PH		DB	30-50	BK	10-20	BO	10-30	cr	15-30	ol	10-25
25	A	H	V		302	28	1	120	30	MH		BK	55-80	db	0-20	bo	5-20	ol	5-20	sc	0-10
25	A	H	V		302	30	1	120	30	PH		BK	55-80	db	0-20	bo	5-20	ol	5-20	sc	0-10
25	A	H	V		302	62	1	130	30	MP	VP	BK	55-80	db	0-20	bo	5-20	ol	5-20	sc	0-10
25	A	H	V		302	63	1	110	30	MP		BK	55-80	db	0-20	bo	5-20	ol	5-20	sc	0-10
25	A	H	V		302	66	1	130	30	MP	VP	BK	55-80	db	0-20	bo	5-20	ol	5-20	sc	0-10
25	A	H	V		302	71	1	130	30	HP		BK	55-80	db	0-20	bo	5-20	ol	5-20	sc	0-10
25	A	H	V		302	91	1	130	30	MP	VP	BK	55-80	db	0-20	bo	5-20	ol	5-20	sc	0-10
25	A	H	V		302	97	1	130	30	MP	VP	BK	55-80	db	0-20	bo	5-20	ol	5-20	sc	0-10
25	A	H	V		305	62	1	130	30	MP	VP	BK	50-75	db	5-20	bo	10-20	oi	0-10	ol	0-20
25	A	H	V		305	71	1	130	30	HP	M	BK	50-75	db	5-20	bo	10-20	oi	0-10	ol	0-20
25	A	H	V		310	30	1	120	30	PH		BK	55-80	db	5-20	oi	10-30	ol	5-20		0-0
25	A	H	V		310	62	1	120	30	MP	VP	BK	55-80	db	5-20	oi	10-30	ol	5-20		0-0
25	A	H	V		310	71	1	120	30	HP		BK	55-80	db	5-20	oi	10-30	ol	5-20		0-0
25	A	H	V		311	62	1	110	30	MP	VP	BK	45-70	db	5-20	oi	10-30	ol	10-30		0-0
25	A	H	V		311	66	1	120	30	MP	VP	BK	45-70	db	5-20	oi	10-30	ol	10-30		0-0
25	A	H	V		402	18	1	90	30	PH		BK	60-80	cl	5-20	oi	10-25		0-0		0-0
25	A	H	V		402	30	2	130	30	PH		BK	60-80	cl	5-20	oi	10-25		0-0		0-0
25	A	H	V		402	62	1	130	30	MP	VP	BK	60-80	cl	5-20	oi	10-25		0-0		0-0
25	A	H	V		402	70	1	120	30	HP	M	BK	60-80	cl	5-20	oi	10-25		0-0		0-0
25	A	H	V		402	71	1	130	30	HP		BK	60-80	cl	5-20	oi	10-25		0-0		0-0

Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048

25	A	H	V			402	97	1	13	30	MP	VP	BK	60-80	cl	5-20	oi	10-25		0-0		0-0
25	A	H	V			405	62	1	13	30	MP	VP	BK	60-85	oi	15-30	cl	0-20		0-0		0-0
25	A	H	V			410	18	1	10	30	PH		BK	60-85	oi	10-30	cl	5-20		0-0		0-0
25	A	H	V			410	30	1	12	30	PH		BK	60-85	oi	10-30	cl	5-20		0-0		0-0
25	A	H	V			410	62	1	12	30	MP	VP	BK	60-85	oi	10-30	cl	5-20		0-0		0-0
25	A	H	V			410	70	1	11	30	HP		BK	60-85	oi	10-30	cl	5-20		0-0		0-0
25	A	H	V			410	71	1	12	30	HP		BK	60-85	oi	10-30	cl	5-20		0-0		0-0
25	A	H	V			410	97	2	12	30	MP	VP	BK	60-85	oi	10-30	cl	5-20		0-0		0-0
25	A	H	V			411	18	1	10	30	PH		BK	60-85	oi	15-30	cl	10-20		0-0		0-0
25	A	H	V			411	62	1	12	30	MP	VP	BK	60-85	oi	15-30	cl	10-20		0-0		0-0
25	A	H	V			411	70	1	11	30	HP		BK	60-85	oi	15-30	cl	10-20		0-0		0-0
25	A	H	V			411	71	1	12	30	HP		BK	60-85	oi	15-30	cl	10-20		0-0		0-0
25	A	H	V			411	97	2	12	30	MP	VP	BK	60-85	oi	15-30	cl	10-20		0-0		0-0
25	A	H	V			416	62	1	13	30	MP	VP	BK	60-80	cl	10-25	oi	10-30		0-0		0-0
25	A	H	V			416	70	2	11	30	HP		BK	60-80	cl	10-25	oi	10-30		0-0		0-0
25	A	H	V			416	71	2	13	30	HP		BK	60-80	cl	10-25	oi	10-30		0-0		0-0
25	A	H	V			511	18	1	11	30	PH	HP	BK	50-75	cl	5-20	oi	10-30		0-0		0-0
25	A	H	V			511	62	1	13	30	MP	VP	BK	50-75	cl	5-20	oi	10-30		0-0		0-0
25	A	H	V			511	70	1	12	30	HP		BK	50-75	cl	5-20	oi	10-30		0-0		0-0
25	A	H	V			511	71	1	13	30	HP		BK	50-75	cl	5-20	oi	10-30		0-0		0-0
25	A	H	V			516	70	1	12	30	HP		BK	50-75	cl	10-25	oi	10-30		0-0		0-0
25	A	O	V	a	101	37	1	25	99	MP		DB	50-80	ol	20-45	bo	0-20		0-0		0-0	
25	A	O	V	a	201	28	1	23	99	MP		DB	30-60	BO	15-30	ol	10-25	cl	5-20	sc	0-10	
25	A	O	V	a	201	30	1	25	99	MP		DB	30-60	BO	15-30	ol	10-25	cl	5-20	sc	0-10	
25	A	O	V	a	201	34	5	23	99	MP		DB	30-60	BO	15-30	ol	10-25	cl	5-20	sc	0-10	
25	A	O	V	a	301	28	1	25	99	MP		BK	50-80	db	0-20	ol	10-20	oi	15-30		0-0	
25	A	O	V	a	301	30	1	23	99	MP		BK	50-80	db	0-20	ol	10-20	oi	15-30		0-0	
25	A	O	V	a	301	62	1	23	99	MP		BK	50-80	db	0-20	ol	10-20	oi	15-30		0-0	
25	A	O	V	a	301	66	2	23	99	MP		BK	50-80	db	0-20	ol	10-20	oi	15-30		0-0	

25	A	O	V		a	301	71	1	23	99	MP		BK	50-80	db	0-20	ol	10-20	oi	15-30		0-0
25	A	O	V		a	401	62	1	23	99	MP		BK	60-90	cl	5-25	oi	5-20	ol	0-15		0-0
25	A	O	V		a	401	71	2	23	99	MP		BK	60-90	cl	5-25	oi	5-20	ol	0-15		0-0
25	A	O	V		a	417	62	1	23	99	MP		BK	50-80	CL	20-40	oi	0-20		0-0		0-0
25	A	O	V		a	417	97	5	23	99	MP		BK	50-80	CL	20-40	oi	0-20		0-0		0-0
25	A	O	V		d	292	28	1	25	99	MP		DB	30-60	BO	15-30	ol	10-25	cl	0-20	sc	0-5
25	A	O	V		d	292	30	1	25	99	MP		DB	30-60	BO	15-30	ol	10-25	cl	0-20	sc	0-5
25	A	O	V		d	392	62	1	23	99	MP		BK	60-80	db	0-15	ol	5-20	oi	10-25		0-0
25	A	O	V		d	392	71	2	23	99	MP		DB	30-60	BO	15-30	ol	10-25	cl	0-20	sc	0-5
25	A	O	V		d	492	62	1	23	99	MP		BK	60-90	cl	10-30	oi	0-20		0-0		0-0
25	A	O	V		d	492	71	1	23	99	MP		BK	60-90	cl	10-30	oi	0-20		0-0		0-0
25	A	O	V		d	492	97	2	23	99	MP		BK	60-90	cl	10-30	oi	0-20		0-0		0-0
25	A	O	V		d	496	62	1	23	99	MP		BK	60-80	cl	10-20	oi	0-20		0-0		0-0

**Vysvetlivky:** Lesné oblasti: 25 – Strážovské vrchy, Súľovské vrchy; Lesné podoblasti: 25A-Strážovské vrchy, Kategória lesa: H-les hospodársky, O-les ochranný, U-les osobitného určenia; Tvar lesa: V-les vysoký; Spôsob obhospodarovania lesa: b-bez zásahu, t-trvalo etážový porast, v-výberkový porast; Písmeno kategórie (lesa osobitného určenia): a-lesy v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, b-kúpeľné lesy, c-rekreačné lesy, f-lesy na zachovanie genetických zdrojov; Hospodársky súbor porastových typov (HSLT): 101-extrémne vápencové dúbravy, 201-extrémne vápencové bukové dúbravy, 202-Svieže vápencové bukové dúbravy, 292-svieže vápencové bukové dúbravy, 301-extrémne vápencové dubové bučiny, 302-svieže vápencové dubové bučiny, 305-kyslé dubové bučiny, 310- vieže dubové bučiny, 311-živné dubové bučiny, 392-svieža vápencová dubová bučina, 401-extrémne vápencové bučiny, 402- svieže vápencové bučiny, 405-kyslé bučiny, 410-svieže bučiny, 411-živné bučiny, 416-kamenité bučiny s lipou, 417-kyslé dubové boriny, 492-Svieže vápencové bučiny, 496-Kamenité bučiny s lipou (Ochranného rázu), 511-živné jedľové bučiny, 516- Kamenité jedľové bučiny; Porastový typ: 18-bukové smrečiny, 28-boriny, 30-boriny s listnáčmi, 34-bukové dubiny semenného pôvodu, 37-dubiny s ihličnanmi, 62-bučiny semenného pôvodu, 63-bučiny-nepravé kmeňoviny, 66-dubové bučiny semenného pôvodu, 70-smrekové bučiny, 71-bučiny s ihličnanmi, 91-hrabové bučiny semenného pôvodu, 97-bučiny s cennými listnáčmi; Stupeň ochrany prírody (SOP): stupne podľa zákona č. 543/2002 Z.z.; Rubná doba: čísla sú roky; Obnovná doba: čísla sú roky; Hospodársky spôsob: MH-maloplošný holarub, MP-maloplošný podrastový, UV-účelový výber, PH-, HP-; Dreviny: BK-buk lesný, BO-borovica lesná, CL-cenné listnaté dreviny, DB-dub letný, SC-smrekovec opadavý.

### **3.4. Navrhované opatrenia, stanovenie harmonogramu ich plnenia, určenie subjektu zodpovedného za ich plnenie, stanovenie merateľných indikátorov ich plnenia.**

Opatrenia na dosiahnutie operatívnych cieľov sú spracované v tabuľke s vyznačením lokality a priority. Z navrhovaných opatrení sú nasledovné už upravené:

- všeobecne – v § 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.:

„(2) ak činnosť uvedená v odseku 1 (Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu) viedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degenerácii, k narušeniu rozmnожovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny orgán ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) túto činnosť po predchádzajúcim upozornení obmedzí alebo zakáže;“
- na 94,53 % výmery CHVÚ Strážovské vrchy platí 2. stupeň ochrany, kde sa podľa § 13 zákona č. 543/2002 Z. z.
  - vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody okrem iného na:
    - i. likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov s výnimkou činnosti povoľanej podľa osobitných predpisov,
    - ii. výstavbu lesných ciest a zvážnic,
    - iii. pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu,
    - iv. aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxickejších látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri polnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha,
    - v. budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy,
  - zakazuje:
    - i. vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacia stanica, garáže, továrenskeho, staničného alebo letisko priestoru,
    - ii. vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy.
- na približne 0,76 % výmery CHVÚ Strážovské vrchy, ktorá je aktuálne v 4. stupni ochrany, je podľa § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. zakázané:
  - i. ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom,
  - ii. aplikovať chemické látky a hnojivá,
  - iii. rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny,
  - iv. zbierať nerasty alebo skameneliny,
  - v. zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdný kryt,
  - vi. stavať lesnú cestu alebo zvážnicu,
  - vii. zriaditiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie,
  - viii. chytiať, usmrňať alebo loviť živočícha.
- na približne 4,71 % výmery CHVÚ Strážovské vrchy, ktorá je aktuálne v 5. stupni ochrany, je podľa § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. zakázané:
  - i. zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdný kryt,

- ii. stavať lesnú cestu alebo zvážnicu,
  - iii. zriadiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie,
  - iv. osvetľovať bežeckú trať, lyžiarsku trať alebo športový areál,
  - v. rušiť pokoj a ticho,
  - vi. chytať, usmrňať alebo loviť živočícha,
  - vii. meniť stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä ich úpravou, zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou trstia, rašelinu, bahna a riečneho materiálu okrem vykonávania týchto činností v koryte vodného toku jeho správcom v súlade s osobitným predpisom,<sup>30</sup>18a)
  - viii. umiestniť stavbu.
- podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Strážovské vrchy, sa za **činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia**, považujú nasledovné činnosti:
- a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla skalného, sokola sťahovavého, bociana čierneho, včelára lesného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia<sup>30</sup>,
  - b) mechanizované kosenie trvalých trávnych porastov a porastov dátelinovín iným spôsobom, ako od stredu do okrajov od 1. mája do 30. júna,
  - c) realizovanie rekultivácie kameňolomu, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.
- podľa § 2 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Strážovské vrchy sa za **zákazané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia**, považujú nasledovné činnosti:
- a) uskutočňovanie horolezeckých výstupov alebo skalolezeckých výstupov od 1. marca do 30. júna v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2,
  - b) uskutočňovanie športových, turistických a iných verejnosti prístupných aktivít a podujatí od 1. marca do 30. júna v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3,
  - c) budovanie turistických chodníkov, cyklotrás alebo táborísk od 1. marca do 30. júna v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3.

Mapa častí CHVÚ Strážovské vrchy s uvedenými zakázanými činnosťami je prílohou č. 6.5.1.

Ostatné nižšie uvedené opatrenia navrhnuté v programe starostlivosti sú organizačno-riadiacim rámcem pre implementáciu ustanovení právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny v zmysle definície programu starostlivosti ako dokumentácie ochrany prírody a požiadaviek Európskej komisie na určenie merateľných cieľov ochrany a opatrení na ich dosiahnutie. Niektoré opatrenia vyžadujú dodatočné finančné prostriedky.

Tabuľka č. 82: Zoznam navrhovaných opatrení v CHVÚ Strážovské vrchy

Vysvetlivky k tabuľke: CHVÚ – Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy, EFP – ekologicko-funkčný priestor, Z – zákon č. 543/2002 Z. z., V – vyhláška MŽP SR č. 434/2009 Z. z., PS – program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019 – 2048, PRV – Program rozvoja vidieka

Číslo opatrenia	Opatrenie	Lokalita	Opatrenie vyplýva z
<i>Operatívny cieľ č. 1.1. Zvýšiť a udržať úroveň populácie druhu kuvik kapcový na priemernej úrovni minimálne 18 obsadených revírov.</i>			
1.1.1.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	CHVÚ	PS

<sup>30</sup> Podľa § 9 ods. 16 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (s účinnosťou od 1. 10. 2013) ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová „obvodný úrad životného prostredia“, rozumie sa tým „okresný úrad“.

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

1.1.2.	Ponechať pri spracúvaní kalamít na dožitie zdravé stromy, ak je to možné aspoň 5 stromov na 1 ha, takisto ponechávať zlomy.	CHVÚ	Z
1.1.3.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch s výnimkou uvedenou pre jednotlivé EFP.	EFP1 EFP2 EFP4 EFP6	Z
1.1.4.	Vyhľadávať a nechať na dožitie stromy s dutinami.	EFP2 EFP6	Z
1.1.5.	Zabezpečiť výrobu a vyvesenie búdok.	EFP2 EFP6	PS
1.1.6.	Zapracovať relevantné opatrenia do PSL.	CHVÚ	Z
1.1.7.	Na lokalitách terova hlucháňa zabezpečiť ochranu biotopov podľa nárokov tetrova hlucháňa ako predpoklad aj pre ochranu kuvika kapcavého.	EFP2	PS, Z
1.1.8.	Zabezpečiť pravidelne monitoring vybranej vzorky populácie kuvika kapcavého.	EFP2	Z
1.1.9.	Usmerniť fotografovanie a filmovanie vtáctva v území.	EFP1 EFP4	PS

***Operatívny cieľ č. 1.2. Zlepšiť stav biotopov na lokalitách muchárika červenohrdlého zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.***

1.2.1.	Vymedziť bezzásahové zóny.	EFP4	PS, V, Z
1.2.2.	Ponechať pri spracovaní kalamít na dožitie zdravé stromy, ak je to možné aspoň 5 stromov na 1 ha, takisto ponechávať zlomy.	CHVÚ	Z
1.2.3.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch s výnimkou uvedenou pre jednotlivé EFP.	EFP1 EFP6 EFP2 EFP4	Z
1.2.4.	Vyhľadávať a nechať na dožitie stromy s dutinami.	EFP2 EFP6	Z
1.2.5.	Zapracovať relevantné opatrenia do PSL.	EFP2 EFP6	Z
1.2.6.	Zabezpečiť pravidelne monitoring vybranej vzorky muchárika červenohrdlého.	EFP4	Z
1.2.7.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	CHVÚ	PS

***Operatívny cieľ č. 1.3. Zlepšiť stav biotopov na lokalitách d'atľa bielochrbtého zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.***

1.3.1.	Vymedziť bezzásahové zóny.	EFP4	PS, V, Z
1.3.2.	Ponechať pri spracúvaní kalamít na dožitie zdravé stromy, ak je to možné aspoň 5 stromov na 1 ha, takisto ponechávať zlomy.	CHVÚ	Z
1.3.3.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch s výnimkou uvedenou na str. 97.	CHVÚ	Z
1.3.4.	Vyhľadávať a nechať na dožitie stromy s dutinami.	EFP2 EFP6	Z
1.3.5.	Zapracovať relevantné opatrenia do PSL.	EFP2 EFP6	Z
1.3.6.	Zabezpečiť pravidelne monitoring vybranej vzorky populácie d'atľa bielochrbtého.	EFP4	Z

1.3.7.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	CHVÚ	PS
<b><i>Operatívny cieľ č. 1.4. Zlepšiť stav biotopov na lokalitách dátla čierneho zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.</i></b>			
1.4.1.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	CHVÚ	PS
1.4.2.	Ponechať pri spracovaní kalamít na dožitie zdravé stromy, ak je to možné aspoň 5 stromov na 1 ha, takisto ponechávať zlomy.	CHVÚ	Z
1.4.3.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch s výnimkou uvedenou pre príslušné EFP.	CHVÚ	Z
1.4.4.	Vyhľadávať a nechať na dožitie stromy s dutinami.	EFP3	Z
1.4.5.	Zapracovať relevantné opatrenia do PSL.	EFP2 EFP6	Z
1.4.6.	Zabezpečiť pravidelne monitoring vybranej vzorky populácie datla čierneho.	EFP2	Z
1.4.7.	Usmerniť filmovanie a fotografovanie vtáctva v území.	EFP2	PS
<b><i>Operatívny cieľ č. 1.5. Zvýšiť a udržať populáciu bociana čierneho na minimálnej úrovni 20 obsadených revírov.</i></b>			
1.5.1.	Zabezpečiť monitoring vybranej vzorky hniezdných okrskov bociana čierneho každoročne a každoročne dohľadávať hniezda v porastoch ohrozených ťažbou.	EFP2 EFP6	Z
1.5.2.	Zabezpečiť po vyhniezdení opravu všetkých známych nestabilných hniezd a v prípade pádu na vhodných stromoch vyložiť náhradné hniezdne podložky.	CHVÚ	PS
1.5.3.	V okolí hniezd zabezpečiť vyhlásenie ochranných zón.	CHVÚ	PS, V, Z
1.5.4.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	CHVÚ	PS
1.5.5.	Dôsledne posúdiť dopad investícii do cestovného ruchu a iných investícii na predmety ochrany.	EFP2, EFP6, EFP3	Z
1.5.6.	Zabezpečiť kontrolnú činnosť dodržiavania obmedzení z dôvodov ochrany prírody.	CHVÚ	Z
1.5.7.	Zapracovať relevantné opatrenia ako zásady hospodárenia v lese do novovypracúvaných PSL.	EFP2, EFP6	Z
1.5.8.	Nové elektrické vedenia ošetriť prvkami zamedzujúcimi kolíziam a rovnako ošetriť aj existujúce vedenia, vo vybraných úsekoch zvážiť ich umiestnenie pod zem.	CHVÚ	Z
1.5.9.	Vylúčiť negatívne zásahy do mokradí a zabezpečiť revitalizáciu poškodených mokradí.	EFP3, EFP5	Z
1.5.10.	Usmerniť fotografovanie bocianov čiernych v blízkosti ich hniezdisk.	EFP2, EFP6	PS
<b><i>Operatívny cieľ č. 1.6. Zvýšiť a udržať populáciu výra skalného a priemernej úrovni minimálne 23 obsadených revírov.</i></b>			

***Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048***

1.6.1.	Zabezpečiť v prípade potreby vyhlásenie ochranej zóny v okolí hniezda výra skalného.	EFP1	PS, Z
1.6.2.	V prípade realizácie investícií do cestovného ruchu, resp. aj iných väčších investícií dôsledne posúdiť ich vplyv na predmet ochrany.	EFP1, EFP3	PS,Z
1.6.3.	Zabezpečiť ochranu hniezdných lokalít a to kameňolomov, starých redších porastov na strmých stráňach a okolitých lesných porastov v prípade stromových alebo zemných hniezd.	EFP1, EFP3	PS, V, Z
1.6.4.	Zabezpečiť pravidelný monitoring celej populácie výra skalného.	EFP1	Z

***Operatívny cieľ č. 1.7. Zvýšiť a udržať populáciu prepelice pol'nej na minimálnej úrovni 40 volajúcich samcov.***

1.7.1.	Vylúčiť zmenu TTP na ornú pôdu alebo iný druh pozemku, vylúčiť rozoranie TTP.	EFP3, EFP5	PS, Z
1.7.2.	Zabezpečiť kosenie TTP od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od stredu do kraja, alebo od kraja ku kraju. Vylúčiť kosenie od kraja do stredu.	EFP3, EFP5	PS, V
1.7.3.	Zabezpečiť dlhodobé poľnohospodárske využitie pozemkov vhodnou formou pre predmety ochrany.	EFP3,EFP5	PS
1.7.4.	V rámci usmerňovania poľnohospodárskej činnosti prostredníctvom vydávania súhlasov obmedziť používanie hnojív a chemických látok na hniezdných lokalitách.	EFP3, EFP5	PS, Z
1.7.5.	V prípade potreby vytvoriť na okrajoch ornej pôdy trávnaté biopásy o šírke 5-10 m.	EFP3, EFP5	PS
1.7.6.	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie prepelice pol'nej.	EFP3	PS

***Operatívny cieľ č. 1.8. Zvýšiť a udržať populáciu chriašteľa pol'ného na minimálnej úrovni 40 volajúcich samcov.***

1.8.1.	Vylúčiť zmenu TTP na ornú pôdu alebo iný druh pozemku, vylúčiť rozoranie TTP.	EFP3 EFP5	PS, Z
1.8.2.	Zabezpečiť kosenie TTP od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od stredu do kraja, alebo od kraja ku kraju. Vylúčiť kosenie od kraja do stredu.	EFP3 EFP5	PS, V
1.8.3.	Zabezpečiť dlhodobé poľnohospodárske využitie pozemkov vhodnou formou pre predmety ochrany.	EFP3 EFP5	PS
1.8.4.	Vylúčiť kosenie a mulčovanie na hniezdných lokalitách určených príslušným orgánom ochrany prírody.	EFP3 EFP5	PS, Z
1.8.5.	V rámci stavebných konaní (ako aj v procese EIA a súvisiacich konaniach) zachytávať prípadné ohrozenia hniezdných lokalít.	EFP3 EFP5	PS, Z
1.8.6.	V prípade ďalšieho poklesu populácií chriašteľa pol'ného využiť cielenú ochranu hniezdisk s využitím ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z. z..	EFP3 EFP5	PS, Z, V
1.8.7.	Vylúčiť zásahy do mokradí a zabezpečiť revitalizáciu poškodených mokradí.	EFP3 EFP5	PS, Z
1.8.8.	V rámci usmerňovania poľnohospodárskej činnosti prostredníctvom vydávania súhlasov obmedziť používanie hnojív a chemických látok na hniezdných lokalitách.	EFP3 EFP5	PS, Z

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

1.8.9.	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie chriašteľa poľného.	EFP3	PS
<b><i>Operatívny cieľ č. 1.9. Udržať populáciu príhaviara čiernohlavého priemerne na úrovni minimálne 53 párov udržaním biotopov druhu vo vhodnom stave a v dostatočnej rozlohe.</i></b>			
1.9.1.	Zabezpečiť dlhodobé poľnohospodárske využitie pozemkov vhodnou formou pre predmety ochrany.	EFP3	PS
1.9.2.	V rámci usmerňovania poľnohospodárskej činnosti vylúčiť použitie chemických látok na hniezdných lokalitách.	EFP3	PS, Z
1.9.3.	V prípade potreby vytvoriť na okrajoch ornej pôdy trávnaté biopásy o šírke 10 m.	EFP3, EFP5	PS
1.9.4.	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie príhaviara čiernohlavého.	EFP3	PS
<b><i>Operatívny cieľ č. 1.10. Udržať populáciu hrdličky pol'nej priemerne na úrovni minimálne 100 párov udržaním biotopov druhu vo vhodnom stave a v dostatočnej rozlohe.</i></b>			
1.10.1.	V rámci usmerňovania poľnohospodárskej činnosti prostredníctvom vydávania súhlasov obmedziť používanie hnojív a chemických látok na hniezdných lokalitách.	EFP5	PS, Z
1.10.2.	Zabezpečiť dlhodobé poľnohospodárske využitie pozemkov vhodnou formou pre predmety ochrany.	EFP3 EFP5	PS
1.10.3.	Zachovávať dostatočné porasty krovín, solitérnych stromov a stromoradí na hniezdných lokalitách.	EFP3 EFP5	Z
1.10.4.	Zachovať (prípadne podľa potreby aj vysadiť) vyššie solitérne stromy ako potenciálne miesta hniezdenia.	EFP3 EFP5	Z
1.10.5.	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie hrdličky pol'nej.	EFP5	PS
<b><i>Operatívny cieľ č. 1.11. Udržať populáciu strakoša červenochrbtého priemerne na úrovni minimálne 350 párov udržaním biotopov druhu vo vhodnom stave a v dostatočnej rozlohe.</i></b>			
1.11.1.	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie strakoša červenochrbtého.	EFP5	Z
1.11.2.	Vylúčiť zmenu TTP na ornú pôdu alebo iný druh pozemku, vylúčiť rozoranie TTP.	EFP5, EFP3	PS, Z
1.11.3.	Zabezpečiť dlhodobé poľnohospodárske využitie pozemkov vhodnou formou pre predmety ochrany.	EFP5, EFP3	PS
1.11.4.	Zachovávať dostatočné porasty krovín na hniezdných lokalitách.	EFP5, EFP3	Z
1.11.5.	V rámci usmerňovania poľnohospodárskej činnosti obmedziť používanie umelých hnojív a chemických látok na hniezdných lokalitách.	EFP5	PS, Z
<b><i>Operatívny cieľ č. 1.12. Udržať populáciu penice jarabej priemerne na úrovni minimálne 35 párov udržaním biotopov druhu vo vhodnom stave a v dostatočnej rozlohe.</i></b>			
1.12.1.	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie penice jarabej.	EFP5	Z
1.12.2.	Vylúčiť zmenu TTP na ornú pôdu alebo iný druh pozemku, vylúčiť rozoranie TTP.	EFP3 EFP5	PS, Z
1.12.3.	Vylúčiť zalesňovanie xerotermných krovitých strání.	EFP5	PS

***Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048***

1.12.4.	Zabezpečiť tlmenie sukcesie krovitých porastov, tak aby dosahovali optimálnu štruktúru a štadium sukcesie nebolo príliš pokročilé a to pravidelným mozaikovitým mulčovaním, preriedovaním súvislých krovitých zárostov.	EFP5	PS
1.12.5.	Zachovávať dostatočné porasty krovín na hniezdných lokalitách v poľnohospodárskej krajine.	EFP3 EFP5	Z
1.12.6.	V rámci usmerňovania poľnohospodárskej činnosti obmedziť používanie umelých hnojív a chemických látok na hniezdných lokalitách.	EFP3 EFP5	PS, Z

***Operatívny cieľ č. 1.13. Udržať populáciu krutihlava hnedého priemerne na úrovni minimálne 70 párov.***

1.13.1.	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie krutihlava hnedého.	EFP5	Z
1.13.2.	Vylúčiť zmenu TTP na ornú pôdu alebo iný druh pozemku, vylúčiť rozoranie TTP.	EFP3 EFP5	PS, Z
1.13.3.	Zachovávať všetky staré a dutinové stromy, solitérne stromy a stromoradia v poľnohospodárskej krajine.	EFP3 EFP5	Z
1.13.4.	Podľa potreby vysadiť solitérne stromy ako zabezpečenie potenciálnych hniezdných stromov do budúcnosti. (najmä na rozsiahlych otvorených plochách TTP, OP vzniknutých počas kolektivizácie).	EFP3 EFP5	PS
1.13.5.	Zachovávať dostatočné porasty drevín na hniezdných lokalitách v poľnohospodárskej krajine.	EFP3 EFP5	Z
1.13.6.	V rámci usmerňovania poľnohospodárskej činnosti obmedziť používanie umelých hnojív a chemických látok na hniezdných lokalitách, s výnimkou uvedenou pre jednotlivé EFP.	EFP3 EFP5	PS, Z

***Operatívny cieľ č. 1.14 Udržať populáciu lelka lesného priemerne na úrovni minimálne 9 párov.***

1.14.1.	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie lelka lesného.	EFP2	Z
1.14.2.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch, s výnimkou uvedenou pre príslušné EFP.	CHVÚ	PS
1.14.3.	Zabezpečiť na vhodných lokalitách zachovanie rôznychovekých rozvoľnených porastov drevín.	CHVÚ	Z

***Operatívny cieľ č. 1.15. Udržať populáciu muchára sivého priemerne na úrovni minimálne 550 párov zachovaním resp. zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.***

1.15.1.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	CHVÚ	PS
1.15.2.	Ponechať pri spracúvaní kalamít na dožitie zdravé stromy, ak je to možné aspoň 5 stromov na 1 ha, takisto ponechávať zlomy.	CHVÚ	PS
1.15.3.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch, s výnimkou uvedenou pre príslušné EFP.	CHVÚ	Z
1.15.4.	Vyhľadávať a nechať na dožitie hniezdné stromy s dutinami.	EFP2 EFP6	Z
1.15.5.	Zapracovať relevantné opatrenia do PSL.	EFP2 EFP6	Z
1.15.6.	Zabezpečiť pravidelné monitoring vybranej vzorky populácie muchára sivého.	EFP2 EFP6	Z

**Operatívny cieľ č. 1.16. Udržať populáciu ďatľa prostredného priemerne na úrovni minimálne 135 párov zachovaním resp. zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.**

1.16.1.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	EFP3	PS
1.16.2.	Ponechať pri spracúvaní kalamít na dožitie zdravé stromy, ak je to možné aspoň 5 stromov na 1 ha, takisto ponechávať zlomy.	EFP3	PS
1.16.3.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch, s výnimkou uvedenou pre jednotlivé EFP.	EFP2 EFP3	Z
1.16.4.	Vyhľadávať a nechať na dožitie hniezdne stromy s dutinami.	EFP2 EFP3	Z
1.16.5.	Zapracovať relevantné opatrenia do PSL.	EFP3	Z
1.16.6.	Zabezpečiť pravidelne monitoring vybranej vzorky populácie ďatľa prostredného.	EFP2 EFP3	Z

**Operatívny cieľ č. 1.17. Udržať populáciu muchárika bielokrkého priemerne na úrovni minimálne 1050 párov zachovaním resp. zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.**

1.17.1.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	CHVÚ	PS
1.17.2.	Ponechať pri spracovaní kalamít na dožitie zdravé stromy, ak je to možné aspoň 5 stromov na 1 ha, takisto ponechávať zlomy.	CHVÚ	PS
1.17.3.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch, mimo výnimiek uvedených pre príslušné EFP.	CHVÚ	Z
1.17.4.	Vyhľadávať a nechať na dožitie hniezdne stromy s dutinami.	EFP6	Z
1.17.5.	Zapracovať relevantné opatrenia do PSL.	EFP2 EFP6	Z
1.17.6.	Zabezpečiť pravidelne monitoring vybranej vzorky populácie muchárika bielokrkého.	EFP6	Z

**Operatívny cieľ č. 1.18. Udržať populáciu orla skalného na minimálnej úrovni 5 obsadených revírov.**

1.18.1.	Zabezpečiť monitoring všetkých hniezdných okrskov orla skalného každoročne a každoročne dohľadávať hniezda v porastoch ohrozených ťažbou lesných porastov.	EFP1, EFP2	Z
1.18.2.	Zabezpečiť po vyhniezdení opravu všetkých známych nestabilných stromových hniezd a v prípade pádu na vhodných stromoch vyložiť náhradné hniezdne podložky.	EFP1, EFP2	PS
1.18.3.	V okolí hniezd zabezpečiť vyhlásenie ochranných zón.	EFP1, EFP2	Z
1.18.4.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	CHVÚ	PS
1.18.5.	Dôsledne posúdiť vplyv investícii do cestovného ruchu a iných investícii na predmety ochrany.	EFP1, EFP2, EFP3	Z
1.18.6.	Zabezpečiť kontrolnú činnosť dodržiavania obmedzení z dôvodov ochrany prírody.	EFP1,EFP3	Z
1.18.7.	Zapracovať relevantné opatrenia ako zásady hospodárenia v lese do novovypracúvaných PSL.	EFP2, EFP6	Z

***Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048***

1.18.8.	Nové elektrické vedenia ošetriť prvkami zamedzujúcimi kolíziám a rovnako ošetriť aj existujúce vedenia, vo vybraných úsekokach zvážiť ich umiestnenie pod zem.	CHVÚ	Z
1.18.9.	Usmerniť fotografovanie orlov skalných v blízkosti ich hniezdisk.	EFP1, EFP2	PS

***Operatívny cieľ č. 1.19. Udržať populáciu sokola stáhovavého na minimálnej úrovni 14 obsadených revírov.***

1.19.1.	Zabezpečiť monitoring všetkých obsadených hniezdných teritórií (3 návštevy do roka na každom hniezde) na začiatku hniezdenia v období toku, uprostred hniezdenia a po vyletení mláďat.	EFP1	Z
1.19.2.	V okolí hniezd zabezpečiť vyhlásenie ochranných zón.	EFP1	Z
1.19.3.	V hniezdom období vo vzdialenosťi min. 500 m okolo hniez vylúčiť skalolezeckú činnosť, športovo rekreačnú činnosť, turistické chodníky, ohniská, paragliding.	EFP1	PS, V
1.19.4.	Dôsledne posúdiť vplyv investícii do cestovného ruchu a iných investícii na predmety ochrany.	EFP1	Z
1.19.5.	Zabezpečiť kontrolnú činnosť dodržiavania obmedzení z dôvodov ochrany prírody.	EFP1	Z
1.19.6.	Nové elektrické vedenia ošetriť prvkami zamedzujúcim kolíziám a rovnako ošetriť aj existujúce vedenia, vo vybraných úsekokach zvážiť ich umiestnenie pod zem.	EFP1	Z
1.19.7.	Usmerniť fotografovanie a filmovanie vtáctva v území.	EFP1	PS

***Operatívny cieľ č. 1.20. Udržať populáciu včelára lesného na minimálnej úrovni 40 obsadených revírov udržaním biotopov druhu vo vhodnom stave a v dostatočnej rozlohe.***

1.20.1.	Zabezpečiť pravidelné monitoring vybraných hniezdných okrskov včelára lesného.	EFP2, EFP6	Z
1.20.2.	V okolí vybraných hniezd zabezpečiť vyhlásenie ochranných zón.	EFP2, EFP6	V, Z
1.20.3.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	CHVÚ	PS
1.20.4.	Dôsledne posúdiť vplyv investícii do cestovného ruchu a iných investícii na predmety ochrany.	EFP2, EFP6, EFP3	Z
1.20.5.	Zabezpečiť kontrolnú činnosť dodržiavania obmedzení z dôvodov ochrany prírody.	CHVÚ	Z
1.20.6.	Zapracovať relevantné opatrenia ako zásady hospodárenia v lese novovypracúvaných PSL.	EFP2, EFP6	Z
1.20.7.	Vylúčiť zmenu TTP na ornú pôdu alebo iný druh pozemku, vylúčiť rozoranie TTP.	EFP3, EFP5	PS, Z
1.20.8.	Zabezpečiť dlhodobé poľnohospodárske využitie pozemkov vhodnou formou (pastva, kosenie) a zabrániť opusteniu poľnohospodárskej pôdy.	EFP3, EFP5	PS
1.20.9.	Nové elektrické vedenia ošetriť prvkami zamedzujúcim kolíziám a rovnako ošetriť aj existujúce vedenia, vo vybraných úsekokach zvážiť ich umiestnenie pod zem.	CHVÚ	Z
1.20.10.	Vylúčiť negatívne zásahy do mokradí a zabezpečiť revitalizáciu poškodených mokradí.	EFP3, EFP5	PS, Z

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

1.20.11.	Usmerniť fotografovanie včelára lesného v blízkosti hniezdisk.	EFP2, EFP6	PS
<b><i>Operatívny cieľ č. 1.21. Zabezpečiť aby podiel lesa vo veku nad 80 rokov zostal v EFP3 minimálne 35 %.</i></b>			
1.21.1.	Monitorovať pravidelne zastúpenie porastov vo veku nad 80 rokov.	CHVÚ	PS
1.21.2.	Kontrolovať dodržiavanie legislatívy na úseku ochrany prírody a hospodárenia v lese pri obnovných ťažbách.	CHVÚ	PS, Z, V
1.21.3.	Zapracovať požiadavky na zastúpenie lesa vo veku 80 rokov do novovypracúvaných PSL tak, aby tento podiel neklesol pod 35 %.	CHVÚ	PS, Z
<b><i>Operatívny cieľ č. 2.1. Zlepšiť stav biotopov na lokalitách žlny sivej zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.</i></b>			
2.1.1.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	CHVÚ	PS
2.1.2.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch, s výnimkou uvedenou pre príslušné EFP.	CHVÚ	Z
2.1.3.	Vyhľadávať a nechať na dožitie hniezdne stromy s dutinami.	EFP2, EFP6	Z
2.1.4.	Zabezpečiť aby rozloha lesných porastov so zastúpením buka vyšším ako 10 % a vekom nad 80 rokov neklesla pod 700 ha.	EFP2	PS
2.1.5.	Zapracovať relevantné opatrenia do PSL.	EFP2, EFP6	Z
2.1.6.	Na lokalitách tetrova hlucháňa zabezpečiť ochranu biotopov podľa nárokov tetrova hlucháňa ako predpoklad aj pre ochranu žlny sivej.	EFP2	PS, Z
2.1.7.	Zabezpečiť pravidelne monitoring vybranej vzorky populácie žlny sivej.	EFP2	Z
<b><i>Operatívny cieľ č. 2.2. Zvýšiť a udržať úroveň populácie druhu jariabok hôrny na priemernej úrovni minimálne 30 obsadených revírov.</i></b>			
2.2.1.	Kontrola dodržiavania legislatívy ochrany prírody a usmernenie hospodárskych činností na obsadených lokalitách, najmä z dôvodu obmedzenia vyrušovania, ale aj za účelom podpory vhodného manažmentu.	EFP1, EFP2, EFP6	PS, Z, V
2.2.2.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	CHVÚ	PS
2.2.3.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch, s výnimkou uvedenou pre jednotlivé EFP.	EFP1, EFP6, EFP2, EFP4	Z
2.2.4.	Presadiť čo najvyššie zastúpenie pionierskych drevín v PSL.	EFP2	PS
2.2.5.	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie jariabka hôrneho.	EFP2	Z
2.2.6.	Zapracovať relevantné opatrenia ako zásady hospodárenia v lese do novovypracúvaných PSL.	EFP2, EFP6	Z
2.2.7.	Zabezpečiť doplnenie vhodných druhov drevín (bubuľonosné, breza, jelša, jarabina) ich výsadbou a zabezpečiť ochranu mravenísk.	EFP2	PS

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

2.2.8.	Vylúčiť prikrmovanie poľovnej zveri zrninami a zabezpečiť zníženie stavu diviakov v týchto revíroch na nulu.	EFP2 a okolie	PS
2.2.9.	Odstrániť nelegálne skládky, ktoré slúžia ako miesta zberu potravy pre krkavcovité vtáky.	EFP2, EFP3, EFP5 a okolie	PS
2.2.10	Vylúčiť vstup motorových vozidiel mimo existujúcej cestnej siete.	EFP1, EFP4	PS, Z
<b>Operatívny cieľ č. 2.3. Zlepšiť stav biotopov na lokalitách žltouchvosta lesného zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.</b>			
2.3.1.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 35 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	CHVÚ	PS
2.3.2.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch, s výnimkou uvedenou pre jednotlivé EFP.	EFP1, EFP6, EFP2, EFP4	Z
2.3.3.	Zabezpečiť každoročne monitoring vybranej vzorky hniezdných lokalít žltouchvosta lesného.	EFP2, EFP4, EFP6	Z
2.3.4.	Ak nie je možné pri spracovaní kalamít ponechať v poraste 25 % porastov starších ako 80 rokov na 100 ha, potom je potrebné pri spracovaní kalamít ponechávať na dožitie zdravé stromy, ak je to možné aspoň 5 stromov na 1 ha, takisto ponechávať zlomy.	CHVÚ	Z
2.3.5.	Vyhľadávať a nechať na dožitie stromy s dutinami.	EFP2, EFP6	Z
2.3.6.	Podporiť hniezdne podmienky pre žltouchvosta lesného vyvesením búdok.	EFP2, EFP6, EFP4	PS
2.3.7.	Vymedziť bezzásahové zóny.	EFP4	PS, V, Z
2.3.8.	Zapracovať relevantné opatrenia ako zásady hospodárenia v lese do novovypracúvaných PSL.	EFP2, EFP6	Z
<b>Operatívny cieľ č. 2.4. Zvýšiť a udržať populáciu strakoša sivého ba priemernej úrovni minimálne 6 obsadených revírov.</b>			
2.4.1.	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie strakoša sivého.	EFP3	Z
2.4.2.	Vylúčiť zmenu TTP na ornú pôdu alebo iný druh pozemku, vylúčiť rozoranie TTP.	EFP3, EFP5	PS, Z
2.4.3.	Zabezpečiť dlhodobé poľnohospodárske využitie pozemkov vhodnou formou pre predmety ochrany.	EFP3, EFP5	PS
2.4.4.	Zachovávať dostatočné porasty krovín, solitérnych stromov a stromoradí na hniezdných lokalitách.	EFP3, EFP5	PS
2.4.5.	Zachovať (prípadne podľa potreby aj vysadiť) vyššie solitérne stromy ako potenciálne miesta hniezdenia a lovу strakoša sivého.	EFP3, EFP5	Z
<b>Operatívny cieľ č. 2.5. Zvrátiť nulový stav populácie druhu tetrov hlucháň prostredníctvom komplexných prípravných opatrení na ochranu a tvorbu vhodného biotopu.</b>			
2.5.1.	Vo vybraných porastoch vylúčiť lesohospodárske a iní zásahy do lesných porastov.	EFP2, vybrané lokality	Z

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

2.5.2.	Vylúčiť vykonávanie lesohospodárskej činnosti od 1.03. do 30.06.	EFP2, vybrané lokality	PS
2.5.3.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch, s výnimkou uvedenou pre príslušné EFP.	CHVÚ	Z
2.5.4.	Zabezpečiť, aby v území bolo na konci platnosti programu starostlivosti minimálne 60 % výmery lesov vo veku nad 80 rokov.	CHVÚ, vybrané lokality	PS
2.5.5.	Výchovnými zásahmi zabezpečiť, aby boli porasty vhodné pre výskyt tetrova hlucháňa (heterogénne, zakmenenie maximálne 0,7 a pod.).	EFP2, vybrané lokality	PS
2.5.6.	Obnovu lesných porastov vykonávať spôsobom vhodným pre tetrova hlucháňa.	EFP2, vybrané lokality	PS
2.5.7.	Pre obnovu porastov vypracovať projekty obnovy podľa nárokov tetrova hlucháňa.	EFP2, vybrané lokality	PS
2.5.8.	Vylúčiť výstavbu ďalších lesných ciest a zvážnic.	EFP2, vybrané lokality	Z
2.5.9.	Zabezpečiť monitoring všetkých tokanísk tetrova hlucháňa.	EFP2, vybrané lokality	Z
2.5.10.	Zabezpečiť prieskum negatívnych faktorov vplývajúcich na početnosť tetrova hlucháňa za účelom upresnenia vhodných manažmentových opatrení.	EFP2, vybrané lokality	PS
2.5.11.	Zabezpečiť kontrolnú činnosť dodržiavania obmedzení z dôvodu ochrany prírody.	EFP2, vybrané lokality	PS, Z
2.5.12.	Vylúčiť stavbu nových elektrických vedení a existujúce ošetriť prvkami pre zabránenie kolízii s vtáctvom alebo ich umiestniť pod zem.	EFP2, vybrané lokality	Z
2.5.13.	Usmerniť fotografovanie a filmovanie vtáctva v území.	EFP2, vybrané lokality	PS
2.5.14.	Zapracovať relevantné opatrenia ako zásady hospodárenia v lese do novovypracúvaných PSL.	EFP2, vybrané lokality	Z
<b>Operatívny cieľ č. 2.6. Obmedziť dostupnosť potravy pre druhy predujúce jariabka hôrneho a tetrova hlucháňa na lokalitách ich výskytu a v bezprostrednom okolí a znížiť riziko predácie týchto druhov.</b>			
2.6.1.	Vylúčiť prikrmovanie poľovnej zveri zrnninami a zabezpečiť zníženie stavu diviakov v týchto revíroch na nulu.	EFP2, EFP6 a okolie	PS
2.6.2.	Odstrániť nelegálne skládky, ktoré slúžia ako miesta zberu potravy pre krkavcovité vtáky.	EFP3, EFP5 a okolie	PS
2.6.3.	Monitorovať výskyt diviaka na lokalitách tetrova hlucháňa a jariabka hôrneho.	EFP1, EFP2	PS
<b>Operatívny cieľ č. 2.7. Zabezpečiť, aby v území počas platnosti programu starostlivosti podiel bukových a jedľovobukových porastov vo veku nad 80 rokov neklesol pod súčasný stav.</b>			
2.7.1.	Zabezpečiť relevantnú ochranu starších porastov s vyšším zastúpením buka.	CHVÚ	PS

***Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048***

2.7.2.	Zapracovať požiadavky na zastúpenie buka do PSL v CHVÚ tak, aby súhrnný rozsah porastov vo veku nad 80 rokov a zastúpením buka nad 10 % neklesol počas platnosti PS po súčasnú úroveň.	CHVÚ	PS, Z
2.7.3.	V územnoplánovacej dokumentácii presadzovať vysoké zastúpenie stromovej zelene v intravilánoch v výskytom s výskytom žltouchvosta lesného.	CHVÚ	PS
2.7.4.	Vyhľadávať hniezdne stromy žltouchvosta lesného a v prípade, že ide o staršie stromy zabezpečiť ich ochranu.	CHVÚ	PS
2.7.5.	V lesných porastoch nedosahujúcich vek 80 rokov alebo nedosahujúcich vhodnú štruktúru pre hniezdenie žltouchvosta lesného vyvesiť hniezdne búdky.	EFP2, EFP4	PS

***Operatívny cieľ č. 3.1. Na základe zmapovania druhov prehodnotiť vyhlášku MŽP SR č. 434/2009 Z. z. a ak je relevantné, pripraviť a prerokovať nový právny predpis.***

3.1.1.	Zhodnotiť zoznam zakázaných činností a predmety ochrany podľa vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z. z. z hľadiska cieľov ochrany druhov.	CHVÚ	PS
3.1.2.	Ak je relevantné, pripraviť a prerokovať návrh nového právneho predpisu..	CHVÚ	PS

***Operatívny cieľ č. 3.2. Vyhodnotiť adresnosť legislatívneho rámca pre ochranu predmetov ochrany a ak je relevantné, pripraviť a prerokovať nový právny predpis.***

3.2.1.	Vyhodnotiť či sektorové právne predpisy (poľnohospodárske, lesnícke, poľovnícke a ľ.) umožňujú realizáciu opatrení navrhovaných v PS.	CHVÚ	PS
3.2.2.	Zasadiť sa za zmenu v národnej legislatíve v prípade, ak realizácia niektorých opatrení navrhovaných v PS CHVÚ Strážovské vrchy naráža na legislatívne prekážky.	CHVÚ	PS

***Operatívny cieľ č. 4.1. Zlepšiť úroveň poznania vtáctva, propagovať myšlienku ochrany významnej ornitologickej lokality a vybudovať infraštruktúru pre pozorovanie vtáctva na lokalite.***

4.1.1.	Realizovať informačné a praktické ekovýchovné aktivity pre farmárov, lesníkov, poľovníkov a miestnych obyvateľov o význame tejto lokality.	CHVÚ	PS
4.1.2.	Pri investíciach do mäkkých foriem cestovného ruchu (napr. výstavba nových turistických chodníkov, altánkov, rozhľadní) zvážiť a posúdiť tieto investície z pohľadu vplyvu na predmety ochrany.	CHVÚ	PS, V, Z
4.1.3.	Usmerniť fotografovanie a filmovanie vtáctva v území tak, aby neohrozovalo vtáky na hniezdiskách a neviedlo k zmareniu hniezdení.	CHVÚ	PS
4.1.4.	Usmerniť návštevnosť na hniezdiskách vtáctva mimo citlivých lokalít. Vybudovať preto vhodnú infraštruktúru (zábrany na vjazd motorových vozidiel, záchytné menšie parkoviská a prístupové náhradné chodníky na menej citlivé lokality a pod.).	CHVÚ	PS, V
4.1.5.	Na vhodných miestach vybudovať pozorovateľne vtáctva, náučný chodník, fotokryty a úkryty (drobné útlne) pre turistov za účelom usmernenia návštevnosti územia.	CHVÚ	PS, V
4.1.6.	Každoročne organizovať exkurzie s pozorovaním vtáctva pre verejnosť.	CHVÚ	PS, V
4.1.7.	Pravidelne organizovať prednášky a ďalšie ekovýchovné aktivity na všetkých školách v obciach a mestách dotknutých CHVÚ.	CHVÚ a okolie	PS
4.1.8.	Vydávať letáky a iné vhodné propagačné materiály o území a umiestňovať pravidelne súvisiace články aj do regionálnych médií a vydávať film o lokalite.	CHVÚ	PS

4.1.9.	Vhodnou formou propagovať prírodné hodnoty CHVÚ Strážovské vrchy v zahraničí s cieľom zvýšenia počtu návštěvníkov využívajúcich mäkké formy cestovného ruchu.	CHVÚ	PS
4.1.10.	Realizovať rôzne ekovýchovné a vzdelávacie podujatia za účelom získať pre mapovanie a ochranu obyvateľov (napr. tábory, semináre, školenia a pod.).	CHVÚ	PS
<b>Operatívny cieľ č. 4.2. Zapájať miestnych obyvateľov do praktickej ochrany vtáctva, zapájať vlastníkov pozemkov do vykonávania praktického manažmentu.</b>			
4.2.1.	Realizovať informačné aktivity pre farmárov, lesníkov, rybárov, poľovníkov a miestnych obyvateľov o alternatívnom hospodárení v CHVÚ.	CHVÚ	PS
4.2.2.	Spolupracovať so správcami tokov a vodných plôch pri zabezpečovaní ochrany mokradí a tečúcich vôd ako významných lovísk bociana čierneho a hniezdisk ostatných druhov vtákov.	EFP4 EFP5 EFP6	PS
4.2.3.	Spolupracovať so správcami elektrických rozvodných sietí na prekládkach hniezd bociana bieleho a pri ošetrení prvkami zabraňujúcimi kolíziam vtáctva.	CHVÚ	PS, Z
4.2.4.	Zabezpečiť dostatočnú informovanosť vlastníkov a užívateľov pozemkov o možnostiach čerpania finančných prostriedkov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu podmienok pre ochranu druhov v území (operačné programy, PRV a pod.).	CHVÚ	PS
4.2.5.	Využiť primeranú formu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania alebo finančný príspevok podľa zákona č. 543/2002 Z. z..	CHVÚ	PS

### Aktivity na realizáciu navrhovaných opatrení

Tabuľka č. 83: Aktivita „Ochrana hniezd a hniezdných stromov výberových vtáčích druhov“

<b>1. Názov a kód aktivity v CHVÚ</b>	<b>SKCHVU028-01 Ochrana hniezd a hniezdných stromov výberových vtáčích druhov</b>
<b>2. Príslušný operatívny cieľ</b>	1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.15.; 1.16.; 1.17.; 2.1.; 2.3.;
<b>3. Príslušné opatrenie pre druhy</b>	1.1.4.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.4.4.; 1.15.4; 1.16.4.; 1.17.4; 2.1.3; 2.3.5.;
<b>4. Stručný popis aktivity v CHVÚ</b>	Lokalizácia hniezd a hniezdných (dutinových) stromov a následné vyhlasovanie ochranných opásiem okolo aktívnych hniezd, ponechávanie dutinových stromov na dožitie
<b>5. Detailnejší popis aktivít</b>	Aktivita bude zahŕňať dohľadávanie hniezdných stromov, hniezd, ich lokalizáciu, monitoring, písanie podnetov a zabezpečenie ochrany hniezdisk prostredníctvom príslušných zákoných nástrojov ako aj kontrolu platných podmienok ochrany hniezdisk.
<b>6. Priorita</b>	Vysoká
<b>7. Miesto realizácie</b>	EFP2, EFP6
<b>8. Obdobie realizácie</b>	Každoročne
<b>9. Zodpovednosť</b>	ŠOP SR (vyhlasovanie ochranných pásiem, kontrola dodržiavania ochranných opatrení), organizácia aktívna v ochrane prírody (lokalizácia hniezd a dutinových stromov, kontrola dodržiavania ochranných opatrení)
<b>10. Odhadované výdavky / rok</b>	2 480 € / rok v r. 2019 – 2023, od r. 2024 – 1 000 €/ rok

<b>11. Predpokladaný zdroj financovania</b>	Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet, iné zdroje
<b>12. Spôsob vyhodnotenia realizácie</b>	Záverečná správa po ukončení sezóny

Tabuľka č. 84: Aktivita „Zníženie mortality vtákov na elektrických vedeniach“

<b>1. Názov a kód aktivity v CHVÚ</b>	<b>SKCHVU028-02 Zníženie mortality vtákov na elektrických vedeniach</b>
<b>2. Príslušný operatívny cieľ</b>	1.5.;1.18.;1.19.;1.20.;2.5.;
<b>3. Príslušné opatrenie pre druhy</b>	1.5.8.; 1.18.8.; 1.19.6.; 1.20.9.; 2.5.13.;
<b>4. Stručný popis aktivity v CHVÚ</b>	Zmapovanie kolíznych bodov a následná inštalácia zábran proti zosadaniu, resp. kolízii s vtáctvom na doteraz takto neošetrených vzdušných elektrických vedeniach. V prípade finančných prostriedkov umiestnenie tejto infraštruktúry pod zem.
<b>5. Detailnejší popis aktivít</b>	Na základe monitoringu a prípadne aj podnetov identifikácia kolíznych úsekov elektrického vedenia i stĺpov. V súčinnosti so subjektom prevádzkujúcim tieto zariadenia určenie krokov na postupné ošetrenie všetkých elektrických vedení v identifikovaných úsekokoch s cieľom, aby na tieto vedenia/stĺpy vtáky nezosadali ani nenaťazali do vedenia.
<b>6. Priorita</b>	Stredná
<b>7. Miesto realizácie</b>	EFP2
<b>8. Obdobie realizácie</b>	Pribežne
<b>9. Zodpovednosť</b>	Subjekt prevádzkujúci príslušné elektrické vedenie
<b>10. Odhadované výdavky / rok</b>	4 760 € / rok v r. 2019 – 2023, od r. 2024 – 3 400 €/ rok
<b>11. Predpokladaný zdroj financovania</b>	Európske štrukturálne a investičné fondy, iné zdroje
<b>12. Spôsob vyhodnotenia realizácie</b>	Záverečná správa po ukončení sezóny

Tabuľka č. 85: Aktivita „Zvýšenie hniezdnych príležitostí výberových vtáčích druhov“

<b>1. Názov a kód aktivity v CHVÚ</b>	<b>SKCHVU028-03 Zvýšenie hniezdnych príležitostí výberových vtáčich druhov</b>
<b>2. Príslušný operatívny cieľ</b>	1.1.; 1.5.; 1.13.; 1.18.; 2.3.; 2.4.
<b>3. Príslušné opatrenie pre druhy</b>	1.1.5.; 1.5.2.; 1.13.4; 1.18.2.; 2.3.6.;2.4.5
<b>4. Stručný popis aktivity v CHVÚ</b>	Oprava jestvujúcich a budovanie umelých hniezd, inštalácia vtáčich búdok. Výsadba vhodných drevín na hniezdiskách krutihlava a strakoša sivého.
<b>5. Detailnejší popis aktivít</b>	Bude vyvesených niekoľko 100 vhodných búdok pre dutinové hniezdiče na lokalitách s menšími hniezdnymi príležitosťami. Tieto búdky pre dutinové hniezdiče (kuvik, mucháriky, ďatle, žltouchvosty) budú udržiavané každých 5 rokov. Okrem toho budú udržiavané a opravované nestabilné hniezda bocianov čiernych a dravcov a na miestach, kde došlo k pádu hniezda alebo jeho likvidácii, alebo kde sa vyskytujú hniezdne páry bez známeho hniezdiska budú umiestnené hniezdne podložky. V biotopoch s výskytom krutihlava a strakoša sivého budú vysadené vhodné dreviny pre podporu hniezdnych príležitostí a vhodnej štrukturovanosti hniezdných biotopov.
<b>6. Priorita</b>	Vysoká
<b>7. Miesto realizácie</b>	CHVÚ
<b>8. Obdobie realizácie</b>	Pribežne

<b>9. Zodpovednosť</b>	ŠOP SR, organizácia aktívna v ochrane prírody, vlastník/ užívateľ územia
<b>10. Odhadované výdavky / rok</b>	3 990 € / rok v r. 2019 - 2023, od r. 2024 – 1 550 € / rok
<b>11. Predpokladaný zdroj financovania</b>	Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet, iné zdroje
<b>12. Spôsob vyhodnotenia realizácie</b>	Záverečná správa z projektu, neskôr záverečná správa z každoročného monitoringu hniezdných príležitostí

Tabuľka č. 86: Aktivita „Zlepšenie stavu hniezdných biotopov výberových vtáčích druhov“

<b>1. Názov a kód aktivity v CHVÚ</b>	<b>SKCHVU028-04 Zlepšenie stavu hniezdných biotopov výberových vtáčích druhov</b>
<b>2. Príslušný operatívny cieľ</b>	1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.6.; 1.7.; 1.8.; 1.12.; 1.15.; 1.16.; 1.17.; 1.18.; 1.20.; 1.21.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.5.; 2.6.;
<b>3. Príslušné opatrenie pre druhy</b>	1.1.1.; 1.1.6.; 1.2.5.; 1.2.7.; 1.3.5.; 1.3.7.; 1.4.1.; 1.4.5.; 1.5.4.; 1.5.7.; 1.5.9.; 1.5.16.; 1.7.2.; 1.7.5.; 1.8.2.; 1.8.4.; 1.8.7.; 1.12.4.; 1.15.1.; 1.15.5.; 1.16.1.; 1.16.5.; 1.17.1.; 1.17.5.; 1.18.4.; 1.18.7.; 1.20.3.; 1.20.6.; 1.20.10.; 1.21.3.; 2.1.1.; 2.1.5.; 2.2.2.; 2.2.6.; 2.2.9.; 2.3.1.; 2.3.8.; 2.6.2.;
<b>4. Stručný popis aktivity v CHVÚ</b>	Manažment mokradí a rašelinísk (zlepšenie vodného režimu, odstránenie náletu), usmernenie lesohospodárskej činnosti, usmernenie využívania krajiny, odstránenie čiernych skládok, manažment biotopov poľných druhov vtáctva.
<b>5. Detailnejší popis aktivít</b>	Dôjde k odstráneniu nelegálnych skládok na miestach, kde tieto skládky atrahujú krkavcovité vtáky a tým zvyšujú mieru predácie. v prípade potreby bude vypracovaný návrh zmeny PSL za tieto účely v dotknutých územiach. Na mokradiach dôjde k stavbe stavidiel, obnovy zdevastovaných mokradí za použitia techniky.
<b>6. Priorita</b>	Vysoká
<b>7. Miesto realizácie</b>	CHVÚ
<b>8. Obdobie realizácie</b>	Pribežne
<b>9. Zodpovednosť</b>	ŠOP SR, organizácia aktívna v ochrane prírody, vlastník/ užívateľ územia
<b>10. Odhadované výdavky / rok</b>	167 300 € /rok v r. 2019 – 2023, od r. 2024 – 13 500 €/rok
<b>11. Predpokladaný zdroj financovania</b>	Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet, iné zdroje
<b>12. Spôsob vyhodnotenia realizácie</b>	Záverečná správa z projektu, neskôr záverečná správa z každoročného monitoringu hniezdisk a potrebných zásahov.

Tabuľka č. 87: Aktivita „Zvýšenie kontrolnej činnosti v oblasti ochrany prírody“

<b>1. Názov a kód aktivity v CHVÚ</b>	<b>SKCHVU028-05 Zvýšenie kontrolnej činnosti v oblasti ochrany prírody</b>
<b>2. Príslušný operatívny cieľ</b>	1.1.; 2.2.; 2.3.; 1.2.; 2.5.; 1.3.; 2.1.; 1.4.; 1.5.; 1.6.; 1.7.; 1.8.; 2.4.; 1.18.; 1.19.; 1.20.; 1.9.; 1.10.; 1.11.; 1.12.; 1.13.; 1.14.; 1.15.; 1.16.; 1.17.; 1.21.; 4.1.;
<b>3. Príslušné opatrenie pre druhy</b>	1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.; 1.1.7.; 1.1.9.; 2.2.1.; 2.2.2.; 2.2.3.; 2.2.4.; 2.2.10.; 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.4.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.7.; 2.5.3.; 2.5.8.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.7.; 2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3.; 2.1.4.; 2.1.6.; 1.4.1.; 1.4.2.; 1.4.3.; 1.6.1.; 1.6.3.; 1.5.4.; 1.5.5.; 1.5.6.; 1.5.10.; 1.7.2.; 1.7.4.; 1.8.2.; 1.8.4.; 1.8.5.; 1.8.6.; 1.8.8.; 1.18.3.; 1.18.4.; 1.18.5.; 1.18.6.; 1.18.9.; 1.19.2.; 1.19.3.; 1.19.4.; 1.19.5.; 1.19.7.; 1.20.2.; 1.20.3.; 1.20.4.; 1.20.5.; 1.20.11.; 1.9.2.; 1.10.4.; 1.12.5.; 1.12.6.; 1.13.6.; 1.14.2.; 1.15.1.; 1.15.2.; 1.15.3.; 1.16.1.; 1.16.2.; 1.16.3.; 1.17.1.; 1.17.2.; 1.17.3.; 1.21.1.; 1.21.2.; 4.1.2.; 4.1.3.;
<b>4. Stručný popis aktivity v CHVÚ</b>	Zvýšenie kontrolnej činnosti dodržiavania platných právnych predpisov v oblasti ochrany prírody, vrátane opatrení v

	ochranných pásmach okolo hniezd, zákazov vjazdov do lesa, zberu lesných plodov, dodržiavania podmienok vydaných rozhodnutí.
<b>5. Detailnejší popis aktivít</b>	Aktivita sa zameria na usmernenie návštevnosti v lokalitách s vyšším stupňom ochrany, kde je usmernenie dôležité aj z dôvodu ochrany citlivých druhov vtáctva, či ochrany hniezdisk vtáctva a ich bezprostredného okolia. Okrem toho sa bude kontrolovať dodržiavanie platných predpisov, vyhotovať stanoviská k činnostiam a zámerom potenciálne ovplyvňujúcich predmety ochrany a prijímať opatrenia na minimalizovanie či vylúčenie zhoršenia stavu predmetov ochrany.
<b>6. Priorita</b>	Vysoká
<b>7. Miesto realizácie</b>	CHVÚ
<b>8. Obdobie realizácie</b>	Každoročne
<b>9. Zodpovednosť</b>	ŠOP SR
<b>10. Odhadované výdavky / rok</b>	31 000 € / rok v r. 2019 – 2023, od r. 2024 – 1 500 € /rok
<b>11. Predpokladaný zdroj financovania</b>	Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet
<b>12. Spôsob vyhodnotenia realizácie</b>	Správy z kontrolnej činnosti, prípadne záverečná správa po ukončení sezóny

Tabuľka č. 88: Aktivita „Optimalizácia chovu a lovu poľovnej zveri“

<b>1. Názov a kód aktivity v CHVÚ</b>	<b>SKCHVU028-06 Optimalizácia chovu a lovu poľovnej zveri</b>
<b>2. Príslušný operatívny cieľ</b>	2.2.; 2.6.;
<b>3. Príslušné opatrenie pre druhy</b>	2.2.8.; 2.6.1.;
<b>4. Stručný popis aktivity v CHVÚ</b>	Fotopasce, ďalekohľady, podklady pre úpravu plánu lovu a chovu, poľovnícke potreby.
<b>5. Detailnejší popis aktivít</b>	Cieľom je doplniť údaje o predácii na lesné kury a iné druhy vtáctva zverou a následne na základe zhodnotenia týchto údajov vypracovať podklady pre úpravu plánu lovu a chovu. Aktivita sa bude realizovať v spolupráci s dotknutými poľovníckymi združeniami za účelom minimalizácie predácie lesných kúr.
<b>6. Priorita</b>	Vysoká
<b>7. Miesto realizácie</b>	EFP1, EFP2
<b>8. Obdobie realizácie</b>	R. 2018 – 2021
<b>9. Zodpovednosť</b>	Užívateľ príslušného poľovného revíru, ŠOP SR
<b>10. Odhadované výdavky / rok</b>	5 150 €/rok v r. 2019 – 2023
<b>11. Predpokladaný zdroj financovania</b>	Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet
<b>12. Spôsob vyhodnotenia realizácie</b>	Záverečná správa po ukončení sezóny.

Tabuľka č. 89: Aktivita „Monitoring populácií vtákov a negatívnych faktorov naň pôsobiacich“

<b>1. Názov a kód aktivity v CHVÚ</b>	<b>SKCHVU028-07 Monitoring populácií vtákov a negatívnych faktorov naň pôsobiacich</b>
<b>2. Príslušný operatívny cieľ</b>	1.1.; 2.2.; 2.3.; 1.2.; 2.5.; 1.3.; 2.1.; 1.4.; 1.5.; 1.6.; 1.7.; 1.8.; 2.4.; 1.18.; 1.19.; 1.20.; 1.9.; 1.10.; 1.11.; 1.12.; 1.13.; 1.14.; 1.15.; 1.16.; 1.17.; 1.21.;
<b>3. Príslušné opatrenie pre druhy</b>	1.1.8.; 2.2.5.; 2.3.3.; 1.2.6.; 2.5.14.; 1.3.6.; 2.1.7.; 1.4.6.; 1.6.4.; 1.5.1.; 1.7.6.; 1.8.9.; 2.4.1.; 1.18.1.; 1.19.1.; 1.20.1.; 1.9.4.; 1.10.5.; 1.11.1.; 1.12.1.; 1.13.1.; 1.14.1.; 1.15.6.; 1.16.6.; 1.17.6.; 1.21.1.;

<b>4. Stručný popis aktivity v CHVÚ</b>	Monitorovanie výberových vtáčích druhov, ich biotopov a negatívnych faktorov naň pôsobiacich
<b>5. Detailnejší popis aktivít</b>	Monitoring bude u vzácnejších druhov zabezpečený každoročne - ich celej populácie a u druhov s vyššou populáciou (desiatky jedincov a vyššie) sa bude zabezpečovať každoročný zber údajov vybranými metódami na dostatočne veľkej vzorku populácie (pre reprezentatívne určenie trendu a veľkosti populácie monitorovaných druhov). Okrem toho bude monitorovaný súbor faktorov vplývajúcich na vtáctvo, vrátane stavu lesných porastov (charakteristík dôležitých pre odhad stavu hniezdných a potravných biotopov predmetov ochrany).
<b>6. Priorita</b>	Stredná
<b>7. Miesto realizácie</b>	CHVÚ
<b>8. Obdobie realizácie</b>	Pribežne
<b>9. Zodpovednosť</b>	ŠOP SR, organizácia aktívna v ochrane prírody
<b>10. Odhadované výdavky / rok</b>	43 860 €/rok v r. 2019 – 2023, od r. 2024 – 3 000 €/rok
<b>11. Predpokladaný zdroj financovania</b>	Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet
<b>12. Spôsob vyhodnotenia realizácie</b>	Záverečná správa po ukončení sezóny v prípade finančnej podpory projektu, údaje zapísané do databáz príjemcu projektu

Tabuľka č. 90: Aktivita „Zvýšenie povedomia a zlepšenie vzťahu obyvateľstva k CHVÚ“

<b>1. Názov a kód aktivity v CHVÚ</b>	<b>SKCHVU028-08 Zvýšenie povedomia a zlepšenie vzťahu obyvateľstva k CHVÚ</b>
<b>2. Príslušný operatívny cieľ</b>	1.7.; 1.8.; 2.4.; 1.20.; 1.9.; 1.10.; 1.11.; 1.12.; 1.13.; 4.1.; 4.2.;
<b>3. Príslušné opatrenie pre druhy</b>	1.7.1.; 1.7.3.; 1.8.1.; 1.8.3.; 2.4.2.; 2.4.3.; 2.4.4.; 2.4.5.; 1.20.7.; 1.20.8.; 1.9.1.; 1.10.1.; 1.10.2.; 1.10.3.; 1.11.2.; 1.11.3.; 1.11.4.; 1.12.2.; 1.12.3.; 1.12.4.; 1.12.5.; 1.13.2.; 1.13.3.; 1.13.4.; 1.13.5.; 4.1.1.; 4.1.4.; 4.1.5.; 4.1.6.; 4.1.7.; 4.1.8.; 4.1.9.; 4.1.10.; 4.2.1.; 4.2.2.; 4.2.4.; 4.2.5.;
<b>4. Stručný popis aktivity v CHVÚ</b>	Ekovýchovné aktivity (budovanie náučných chodníkov, vydávanie tlačovín, realizácia podujatí, web stránka a pod.). Poradenská činnosť pre vlastníkov/užívateľov pozemkov kvôli podpore získania financií za obmedzenie užívania z dôvodu ochrany prírody.
<b>5. Detailnejší popis aktivít</b>	Na vybraných lokalitách bude vybudovaná vhodná infraštruktúra pre pozorovanie vtáctva (informačné tabule, pozorovateľňa, prípadne fotokryty, náučných chodníkov), vydané tlačoviny na zvýšenie povedomia o CHVÚ medzi laickou aj odbornou verejnosťou (knižky, brožúrky a ī.), pravidelne sa budú uverejňovať aktuality z územia aj v regionálnych periodikách. Okrem toho bude zabezpečená poradenská činnosť pre vlastníkov/užívateľov pozemkov za účelom získania financií za obmedzenie užívania z dôvodu ochrany prírody, alebo zabezpečenia zmluvnej starostlivosti alebo iného zabezpečenia realizácie aktivít v prospech ochrany vtáctva v CHVÚ.
<b>6. Priorita</b>	Stredná
<b>7. Miesto realizácie</b>	CHVÚ
<b>8. Obdobie realizácie</b>	Každoročne
<b>9. Zodpovednosť</b>	ŠOP SR, organizácia aktívna v ochrane prírody
<b>10. Odhadované výdavky / rok</b>	52 150 € / rok v r. 2019 – 2023, od r. 2024 – 1 500 €/rok
<b>11. Predpokladaný zdroj financovania</b>	Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet

<b>12. Spôsob vyhodnotenia realizácie</b>	Záverečná správa po ukončení sezóny v prípade finančnej podpory projektu, údaje zapísané do databáz príjemcu projektu
---	---

Tabuľka č. 91: Aktivita „Prehodnotenie vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z. z.a v prípade potreby aj návrh nového všeobecne záväzného právneho predpisu vyhlasujúceho CHVÚ Strážovské vrchy“

<b>1. Názov a kód aktivity v CHVÚ</b>	<b>SKCHVU028-09 Prehodnotenie vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z. z.a v prípade potreby aj návrh nového všeobecne záväzného právneho predpisu vyhlasujúceho CHVÚ Strážovské vrchy</b>
<b>2. Príslušný operatívny cieľ</b>	2.3.; 1.2.; 1.3.;
<b>3. Príslušné opatrenie pre druhy</b>	2.3.7.; 1.2.1; 1.3.1.;
<b>4. Stručný popis aktivity v CHVÚ</b>	Na základe monitoringu vtáctva a zhodnotenia faktorov na neho vplývajúcich bude prehodnotená vyhláška MŽP SR č. 434/2009 Z. z. a ak je relevantné, vypracovaný a prerokovaný návrh nového všeobecne záväzného predpisu, ktorým sa vyhlasuje CHVÚ Strážovské vrchy.
<b>5. Detailnejší popis aktivít</b>	Zhodnotí sa opodstatnenosť zahrnutia tých častí do CHVÚ, kde sa dnes z prirodzených príčin nevyskytujú predmety ochrany a navrhne pričlenenie častí priliehajúcich k CHVÚ s výskytom predmetov ochrany (napr. penice jarabej, strakoša obyčajného), ako aj potreba úpravy zákazových činností. Ak bude relevantné, súčasťou aktivity bude návrh a prerokovanie tohto nového právneho predpisu.
<b>6. Priorita</b>	Vysoká
<b>7. Miesto realizácie</b>	CHVÚ
<b>8. Obdobie realizácie</b>	2019 - 2023
<b>9. Zodpovednosť</b>	ŠOP SR
<b>10. Odhadované výdavky / rok</b>	7 350 €/rok v r. 2019 – 2023
<b>11. Predpokladaný zdroj financovania</b>	Európske štrukturálne a investičné fondy (fakultatívne), štátny rozpočet ŠOP SR (obligatórne)
<b>12. Spôsob vyhodnotenia realizácie</b>	Správa po ukončení kalendárneho roku

Tabuľka č. 92: Aktivita „Získanie pozemkov so zachovalými biotopmi pre výberové vtáčie druhy s navrhovaným bezzásahovým režimom do správy ŠOP SR alebo využitie iných ekonomických nástrojov podľa zákona č. 543/2002 Z. z.“

<b>1. Názov a kód aktivity v CHVÚ</b>	<b>SKCHVU028-10 Získanie pozemkov so zachovalými biotopmi pre výberové vtáčie druhy s navrhovaným bezzásahovým režimom do správy ŠOP SR alebo využitie iných finančných nástrojov podľa zákona č. 543/2002 Z. z.</b>
<b>2. Príslušný operatívny cieľ</b>	4.2.
<b>3. Príslušné opatrenie pre druhy</b>	4.2.5
<b>4. Stručný popis aktivity v CHVÚ</b>	Kúpa, zámena, nájom pozemkov s výskytom vzácnejších predmetov ochrany, resp. zmluvná starostlivosť či finančný príspevok a finančná náhrada.
<b>5. Detailnejší popis aktivít</b>	Kúpa, zámena, nájom pozemkov s výskytom tetrova hlucháňa a iných vzácnych druhov, na ktorých sa plánuje realizovať bezzásahový režim. Do úvahy pripadajú aj mokraďové lokality, na ktorých sa plánuje realizácia manažmentu a revitalizačných

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

	opatrení. Druhou alternatívou je zmluvná starostlivosť, finančný príspevok alebo finančná náhrada za obmedzenie bežného obshospodarovania.,
<b>6. Priorita</b>	Stredná
<b>7. Miesto realizácie</b>	CHVÚ
<b>8. Obdobie realizácie</b>	Pribežne
<b>9. Zodpovednosť</b>	ŠOP SR
<b>10. Odhadované výdavky / rok</b>	2 100 €/rok v r. 2019 – 2023, od r. 2024 – 500 €/rok
<b>11. Predpokladaný zdroj financovania</b>	Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet, iné zdroje
<b>12. Spôsob vyhodnotenia realizácie</b>	Záverečná správa po ukončení aktivity.

Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048

Tabuľka č. 93: Súhrnný prehľad realizačných projektov a predpokladaných nákladov programu starostlivosti (roky 2019 – 2034)

Kód projektu	Názov projektu	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
SKCHVU028-01	Ochrana hniezd a hniezdných stromov výberových vtáčích druhov	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
SKCHVU028-02	Zniženie mortality vtáctva na elektrických vedeniach	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
SKCHVU028-03	Zvýšenie hniezdných príležitostí výberových vtáčích druhov	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
SKCHVU028-04	Zlepšenie stavu hniezdných biotopov výberových vtáčích druhov	167 300	167 300	167 300	167 300	167 300	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
SKCHVU028-05	Zvýšenie kontrolnej činnosti v oblasti ochrany prírody	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
SKCHVU028-06	Optimalizácia chovu a lovú poľovnej zveri	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKCHVU028-07	Monitoring populácií vtákov a negatívnych faktorov naň pôsobiacich	43 860	43 860	43 860	43 860	43 860	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
SKCHVU028-08	Zvýšenie povedomia a zlepšenie vzťahu obyvateľstva k CHVÚ	52 150	52 150	52 150	52 150	52 150	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
SKCHVU028-09	Prehodnotenie vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z. z. a v prípade potreby aj návrh nového všeobecne záväzného právneho predpisu vyhlasujúceho CHVÚ Strážovské vrchy	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKCHVU028-10	Získanie pozemkov so zachovalými biotopmi pre výberové vtáctie druhov s navrhovaným bezzášahovým režimom do správy ŠOP SR alebo využitie iných ekonomických nástrojov podľa zákona č. 5432002 Z. z.	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
<b>Spolu (€)</b>		<b>320 140</b>	<b>25 900</b>														

Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048

Tabuľka č. 94: Súhrnný prehľad realizačných projektov a predpokladaných nákladov programu starostlivosti (roky 2035 – 2048)

Kód projektu	Názov projektu	Rok	Spolu (€)													
		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2019-48
SKCHVU028-01	Ochrana hniezd a hniezdných stromov výberových vtáčích druhov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	37 400
SKCHVU028-02	Zniženie mortality vtáctva na elektrických vedeniach	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	108 800
SKCHVU028-03	Zvýšenie hniezdných príležitostí výberových vtáčích druhov	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	57 450
SKCHVU028-04	Zlepšenie stavu hniezdných biotopov výberových vtáčích druhov	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	1 174 000
SKCHVU028-05	Zvýšenie kontrolnej činnosti v oblasti ochrany prírody	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	192 500
SKCHVU028-06	Optimalizácia chovu a lovu poľovnej zveri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 750
SKCHVU028-07	Monitoring populácií vtákov a negatívnych faktorov naří pôsobiacich	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	294 300
SKCHVU028-08	Zvýšenie povedomia a zlepšenie vzťahu obyvateľstva k CHVÚ	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	298 250
SKCHVU028-09	Prehodnotenie vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z. z. a v prípade potreby aj návrh nového všeobecne záväzného právneho predpisu vyhlasujúceho CHVÚ Strážovské vrchy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 750
SKCHVU028-10	Získanie pozemkov so zachovalými biotopmi pre výberové vtáctie druhy s navrhovaným bezzálohovým režimom do správy ŠOP SR alebo využitie iných ekonomických nástrojov podľa zákona č. 543/2002 Z. z.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	23 000
<b>Spolu (€)</b>		<b>25 900</b>	<b>2 248 200</b>													

Tabuľka č. 95: Prehľad odhadovaných výdavkov na realizáciu programu starostlivosti a predpokladaných zdrojov financovania (roky 2019-2034)

Zdroj financovania	Rok realizácie programu starostlivosti / suma v €															
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
ŠOP SR vlastné zdroje	0	0	0	0	0	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
ŠOP SR štátны rozpočet	0	0	0	0	0	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200
Európske štrukturálne a investičné fondy <sup>31</sup>	314 860	314 860	314 860	314 860	314 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iné zdroje <sup>32</sup>	5 280	5 280	5 280	5 280	5 280	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
Spolu	<b>320 140</b>	<b>320 140</b>	<b>320 140</b>	<b>320 140</b>	<b>320 140</b>	<b>25 900</b>										

Tabuľka č. 96: Prehľad odhadovaných výdavkov na realizáciu programu starostlivosti a predpokladaných zdrojov financovania (roky 2035-2048)

Zdroj financovania	Rok realizácie programu starostlivosti / suma v €														
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2019-2048
ŠOP SR vlastné zdroje	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	107 500
ŠOP SR štátny rozpočet	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	430 000
Európske štrukturálne a investičné fondy <sup>31</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 574 300
Iné zdroje <sup>32</sup>	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	136 400
Spolu	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>2 248 200</b>

<sup>31</sup> Vráthane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a oprávnených žiadateľov

<sup>32</sup> Ide napr. o finančný nástroj EÚ LIFE a ďalšie nešpecifikované zdroje, vrátane súkromných

#### 4. SPÔSOB VYHODNOCOVANIA STAROSTLIVOSTI PLNENIA PROGRAMU

Tabuľka č. 97: Zoznam dlhodobých a operatívnych cieľov a opatrení programu starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy, ich indikátorov a spôsobov overenia

	Štruktúra programu starostlivosti	Objektívne overiteľný indikátor úspešnosti	Spôsob overenia	Stav realizácie
<b>Dlhodobé ciele</b>				
1.	Zachovať súčasný stav druhov kuvik kapcavý, muchárik červenohrdlý, d'atel' bielochrbtý, d'atel' čierny, bocian čierny, výr skalný, prepelica poľná, chriašteľ poľný, pŕhľaviar čiernochlavý, hrdlička poľná, strakoš červenohrdlý, penica jarabá, krutihlav hnedý, lelek lesný, muchár sivý, d'atel' prostredný a muchárik bielokrký na úrovni B priaznivého stavu, zachovať súčasný stav druhov orol skalný, sokol stáhovavý a včelár lesný na úrovni A priaznivého stavu.	Kategória priaznivého stavu	Pravidelné vyhodnotenie priaznivého stavu (raz za 5-6 rokov)	Plní sa / neplní sa
2.	Zlepšiť súčasný stav druhu žlna sivá z úrovne B na úroveň A priaznivého stavu, zlepšiť nepriaznivý stav druhov jariabok hôrny, žltouchost lesný a strakoš sivý na úroveň B priaznivého stavu zvrátením poklesu a zlepšením stavu populácie týchto druhov a zvrátiť stav extincie druhu tetrov hlucháň.	Kategória priaznivého stavu	Pravidelné vyhodnotenie priaznivého stavu (raz za 5-6 rokov)	Plní sa / neplní sa
3.	Zabezpečiť adresný právny rámec pre zlepšenie kvality biotopov predmetov ochrany v CHVÚ Strážovské vrchy a upraviť hranice CHVÚ Strážovské vrchy pre zefektívnenie ochrany v území.	Prehodnotenie právneho rámca a v prípade potreby, návrh a prerokovanie nového právneho predpisu	Prehodnotenie, záznamy z rokovaní.	Plní sa / Plní sa čiastočne / Neplní sa
4.	Zvýšiť ekologické povedomie miestnych obyvateľov a zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi a správcami pozemkov pri ochrane vtáctva.	Počet návštěvníkov vybraných lokalít (prichádzajúcich za účelom jej spoznania)	Monitoring návštěvníkov raz ročne	Plní sa (ak rastie) / Neplní sa (ak stagnuje či klesá)
<b>Operatívne ciele</b>				
1.1.	Zvýšiť a udržať úroveň populácie druhu kuvik kapcavý na priemernej úrovni minimálne 18 obsadených revírov.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.2.	Zlepšiť stav biotopov na lokalitách muchárika červenohrdlého zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.3.	Zlepšiť stav na lokalitách d'atla bielochrbtého zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

				sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.4.	Zlepšiť stav biotopov na lokalitách ďatľa čierneho zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.5.	Zvýšiť a udržať populáciu bociana čierneho na priemernej úrovni minimálne 20 obsadených revírov.	Zistený počet kohútov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.6.	Zvýšiť a udržať populáciu výra skalného na priemernej úrovni minimálne 23 obsadených revírov	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontrol	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.7.	Zvýšiť a udržať populáciu prepelice polnej na minimálnej úrovni 40 volajúcich samcov.	Zistený počet volajúcich samcov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.8.	Zvýšiť a udržať populáciu chriašteľa polného na minimálnej úrovni 40 volajúcich samcov.	Zistený počet volajúcich samcov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.9.	Udržať populáciu príhlaviara čiernohlavého priemerne na úrovni minimálne 53 párov udržaním biotopov druhu vo vhodnom stave a v dostatočnej rozlohe.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.10.	Udržať populáciu hrdličky polnej priemerne na úrovni minimálne 100 párov udržaním biotopov druhu vo vhodnom stave a v dostatočnej rozlohe.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.11.	Udržať populáciu strakoša červenochrbtého priemerne na úrovni minimálne 350 párov udržaním biotopov druhu vo vhodnom stave a v dostatočnej rozlohe.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.12.	Udržať populáciu penice jarabej priemere na úrovni minimálne 35 párov udržaním biotopov druhu vo vhodnom stave a v dostatočnej rozlohe.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.13.	Udržať populáciu krutihlava hnedého priemerne na úrovni minimálne 70 párov.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.14.	Udržať populáciu lelka lesného priemerne na úrovni minimálne 9 párov.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.15.	Udržať populáciu muchára sivého priemerne na úrovni minimálne 550 párov zachovaním resp. zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.16.	Udržať populáciu ďatľa prostredného priemerne na úrovni minimálne 135 párov zachovaním resp. zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

1.17.	Udržať populáciu muchárika bielokrkého priemerne na úrovni 1050 párov zachovaním resp. zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.18.	Udržať populáciu orla skalného na minimálnej úrovni 5 obsadených revírov.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.19.	Udržať populáciu sokola sťahovavého na minimálnej úrovni 14 obsadených revírov.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.20.	Udržať populáciu včelára lesného na minimálnej úrovni 40 obsadených revírov.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.21.	Zabezpečiť aby podiel lesa vo veku nad 80 r. zostal v EFP3 minimálne 35 %.	Rozloha biotopu	Zhodnotenie raz za 5 rokov	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
2.1.	Zlepšiť stav biotopov na lokalitách žlny sivej zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
2.2.	Zvýšiť a udržať úroveň populácie druhu jariabok hôrny na priemernej úrovni 30 obsadených revírov.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
2.3.	Zlepšiť stav biotopov na lokalitách žltouchvosta lesného zvýšením súčasného podielu starých lesných porastov.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
2.4.	Zvýšiť a udržať populáciu strakoša sivého na priemernej úrovni minimálne 6 obsadených revírov.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
2.5.	Zvrátiť nulový stav populácie druhu tetrov hluchář prostredníctvom komplexných prípravných opatrení na ochranu a tvorbu vhodného biotopu.	Zistený počet kohútov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
2.6.	Obmedziť dostupnosť potravy pre druhy predujúce jariabka hôrneho a tetrova hluchára na lokalitách ich výskytu a v bezprostrednom okolí a znížiť riziko predácie týchto druhov.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontrol	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
2.7.	Zabezpečiť, aby v území počas platnosti programu starostlivosti podiel bukových a jedľovobukových porastov vo veku nad 80 rokov neklesol pod súčasný stav.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa / Neplní sa
3.1.	Na základe zmapovania druhov prehodnotiť vyhlášku MŽP SR č. 434/2009 Z. z. a ak je relevantné, pripraviť a prerokovať nový právny predpis.	Prehodnotenie právneho predpisu a v prípade potreby, návrh a prerokovanie nového právneho predpisu	Prehodnotenie, záznamy z rokovania.	Plní sa / Plní sa čiastočne / Neplní sa
3.2.	Vyhodnotiť adresnosť právneho rámca pre ochranu predmetov ochrany a ak je relevantné,	Vyhodovená štúdia, prípadne úpravy legislatív	Dodaná štúdia analyzujúca legislatívne limity	Plní sa (ak je vypracovaná štúdia a ak sú potrebné úpravy

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

	pripraviť a prerokovať nový právny predpis.		ochrany predmetov ochrany. Právne úpravy v prospech predmetov ochrany	legislatívny, ak sú prijaté) / Neplní sa (ak nie je vypracovaná štúdia alebo ak nie sú prijaté potrebné úpravy legislatívny)
4.1.	Zlepšiť úroveň poznania vtáctva, propagovať myšlienku ochrany významnej ornitologickej lokality a vybudovať infraštruktúru pre pozorovanie vtáctva na lokalite	Počet návštěvníkov lokality (prichádzajúcich za účelom jej spoznania)	Monitoring návštěvníkov raz ročne	Plní sa (ak rastie) / Neplní sa (ak stagnuje či klesá)
4.2.	Zapájať miestnych obyvateľov do praktickej ochrany vtáctva, zapájať vlastníkov pozemkov do vykonávania praktického manažmentu	Počet obyvateľov podieľajúcich sa na praktickej ochrane vtáctva	Správy z aktivít praktickej ochrany vtáctva	Plní sa / Neplní sa
<b>Opatrenia</b>				
1.1.1.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa / neplní sa
1.1.2.	Ponechať pri spracúvaní kalamít na dožitie zdravé stromy, ak je to možné aspoň 5 stromov na 1 ha, takisto ponechávať zlomy.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.1.3.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch s výnimkou uvedenou pre jednotlivé EFP.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.1.4.	Vyhľadávať a nechať na dožitie stromy s dutinami.	Počet hniezdných stromov s rozhodnutiami o ochrane	Stanoviská, rozhodnutia príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.1.5.	Zabezpečiť výrobu a vyvesenie búdk.	Počet zrealizovaných projektov vyhotovenia búdk	Správy z realizácie projektov	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
1.1.6.	Zapracovať relevantné opatrenia do PSL.	Počet jednotiek priestorového rozdelenia lesa (JPRL) so zapracovanými zásadami OP	Schválené PSL	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
1.1.7.	Na lokalitách tetrova hlucháňa zabezpečiť ochranu biotopov podľa nárokov tetrova hlucháňa ako predpoklad aj pre ochranu kuvika kapcavého.	Počet JPRL so zapracovanými zásadami OP	Schválené PSL	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
1.1.8.	Zabezpečiť pravidelné monitoring vybranej vzorky populácie kuvika kapcavého.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.1.9.	Usmerniť fotografovanie a filmovanie vtáctva v území.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.2.1.	Vymedziť bezzálohové zóny.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.2.2.	Ponechať pri spracovaní kalamít na dožitie zdravé stromy, ak je to možné aspoň 5 stromov na 1 ha, takisto ponechávať zlomy.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.2.3.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch s výnimkou uvedenou pre jednotlivé EFP.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

1.2.4.	Vyhľadávať a nechať na dožitie stromy s dutinami.	Počet hniezdných stromov s rozhodnutiami o ochrane	Stanoviská, rozhodnutia príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.2.5.	Zapracovať relevantné opatrenia do PSL.	Počet JPRL so zapracovanými zásadami OP	Schválené PSL	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
1.2.6.	Zabezpečiť pravidelne monitoring vybranej vzorky muchárika červenohrdlého.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.2.7.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa / neplní sa
1.3.1.	Vymedziť bezsahové zóny.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.3.2.	Ponechať pri spracúvaní kalamít na dožitie zdravé stromy, ak je to možné aspoň 5 stromov na 1 ha, takisto ponechávať zlomy.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.3.3.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch s výnimkou uvedenou na str. 97.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.3.4.	Vyhľadávať a nechať na dožitie stromy s dutinami.	Počet hniezdných stromov s rozhodnutiami o ochrane	Stanoviská, rozhodnutia príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.3.5.	Zapracovať relevantné opatrenia do PSL.	Počet JPRL so zapracovanými zásadami OP	Schválené PSL	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
1.3.6.	Zabezpečiť pravidelne monitoring vybranej vzorky populácie ďatľa bielochrbtého.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.3.7.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa / neplní sa
1.4.1.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa / neplní sa
1.4.2.	Ponechať pri spracovaní kalamít na dožitie zdravé stromy, ak je to možné aspoň 5 stromov na 1 ha, takisto ponechávať zlomy.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.4.3.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch s výnimkou uvedenou na str. 97.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.4.4.	Vyhľadávať a nechať na dožitie stromy s dutinami.	Počet hniezdných stromov s rozhodnutiami o ochrane	Stanoviská, rozhodnutia príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.4.5.	Zapracovať relevantné opatrenia do PSL.	Počet JPRL so zapracovanými zásadami OP	Schválené PSL	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

1.4.6.	Zabezpečiť pravidelné monitoring vybranej vzorky populácie datľa čierneho.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Nepĺní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.4.7.	Usmerniť fotografovanie a filmovanie vtáctva v území.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / nepĺní sa priebežne
1.5.1.	Zabezpečiť monitoring vybranej vzorky hniezdných okrskov bociana čierneho každoročne a každoročne dohľadávať hniezda v porastoch ohrozených ľažou.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Nepĺní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.5.2.	Zabezpečiť po vyhniezdení opravu všetkých známych nestabilných hniezd a v prípade pádu na vhodných stromoch vyložiť náhradné hniezdne podložky.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Správy a záznamy z opráv	Plní sa (ak boli opravené nestabilné hniezda)/ nepĺní sa (ak hniezda s nutnou opravou neboli opravené)
1.5.3.	V okolí hniez zabezpečiť vyhlásenie ochranných zón.	Počet vyhlásených ochranných zón	Rozhodnutia úradov	Plní sa / nepĺní sa
1.5.4.	Pri obnovnej ľažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie raz za 5 rokov	Plní sa / nepĺní sa
1.5.5.	Dôsledne posúdiť vplyv investícií do cestovného ruchu a iných investícií na predmety ochrany.	Počet stanovísk k zámerom a činnostiam	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / nepĺní sa
1.5.6.	Zabezpečiť kontrolnú činnosť dodržiavania obmedzení z dôvodov ochrany prírody.	Počet stanovísk k zámerom a činnostiam	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / nepĺní sa
1.5.7.	Zapracovať relevantné opatrenia ako zásady hospodárenia v lese do novovypracúvaných PSL.	Počet JPRL so zapracovanými zásadami OP	Schválené PSL	Plní sa / plní sa čiastočne / nepĺní sa
1.5.8.	Nové elektrické vedenia ošetriť prvkami zamedzujúcimi kolíziám a rovnako ošetriť aj existujúce vedenia, vo vybraných úsekokach zvážiť ich umiestnenie pod zem.	Dĺžka vedení bez zábran proti sadaniu/ kolíziám vtáctva	Zhodnotenie raz za 5 rokov	Plní sa (ak dĺžka klesá)/ nepĺní sa (ak dĺžka stagnuje alebo rastie)
1.5.9.	Vylúčiť negatívne zásahy do mokradí a zabezpečiť revitalizáciu poškodených mokradí.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne/ nepĺní sa priebežne
1.5.10	Usmerniť fotografovanie bocianov čiernych v blízkosti ich hniezdisk.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne/ nepĺní sa priebežne
1.6.1.	Zabezpečiť v prípade potreby vyhlásenie ochranej zóny v okolí hniezda výra skalného.	Počet vyhlásených ochranných zón	Rozhodnutia úradov	Plní sa / nepĺní sa
1.6.2.	V prípade realizácie investícií do cestovného ruchu, resp. aj iných väčších investícií dôsledne posúdiť ich vplyv na predmet ochrany.	Počet stanovísk k zámerom a činnostiam	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / nepĺní sa
1.6.3.	Zabezpečiť ochranu hniezdných lokalít a to kameňolomov, starých redších porastov na strmých stráňach a okolitých lesných porastov v prípade stromových alebo zemných hniezd.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / nepĺní sa
1.6.4.	Zabezpečiť pravidelný monitoring celej populácie výra skalného.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.7.1.	Vylúčiť zmenu TTP na ornú pôdu alebo iný druh pozemku, vylúčiť rozoranie TTP.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / nepĺní sa priebežne

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

1.7.2.	Zabezpečiť kosenie TTP od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od stredu do kraja, alebo od kraja ku kraju. Vylúčiť kosenie od kraja do stredu.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.7.3.	Zabezpečiť dlhodobé poľnohospodárske využitie pozemkov vhodnou formou pre predmety ochrany.	Rozloha pôdy nevhodne obhospodarovanej	Zhodnotenie raz za 5 rokov	Plní sa (ak rozloha klesá)/ neplní sa (ak rozloha stagnuje alebo rastie)
1.7.4.	V rámci usmerňovania poľnohospodárskej činnosti prostredníctvom vydávania súhlásov obmedziť používanie hnojív a chemických látok na hniezdných lokalitách.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.7.5.	V prípade potreby vytvoriť na okrajoch ornej pôdy trávnaté biopasy o šírke 5-10 m.	Počet stanovísk	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.7.6.	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie prepelice poľnej.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadane do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dát)
1.8.1	Vylúčiť zmenu TTP na ornú pôdu alebo iný druh pozemku, vylúčiť rozoranie TTP.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.8.2.	Zabezpečiť kosenie TTP od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od stredu do kraja, alebo od kraja ku kraju. Vylúčiť kosenie od kraja do stredu.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.8.3.	Zabezpečiť dlhodobé poľnohospodárske využitie pozemkov vhodnou formou pre predmety ochrany.	Rozloha pôdy nevhodne obhospodarovanej	Zhodnotenie raz za 5 rokov	Plní sa (ak rozloha klesá)/ neplní sa (ak rozloha stagnuje alebo rastie)
1.8.4.	Vylúčiť kosenie a mulčovanie na hniezdných lokalitách určených príslušným orgánom ochrany prírody.	Počet stanovísk k zámerom a činnostiam	Stanoviská, príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.8.5.	V rámci stavebných konaní (ako aj v procese EIA a súvisiacich konaniciach) zachytávať prípadné ohrozenia hniezdných lokalít.	Počet stanovísk k zámerom a činnostiam	Stanoviská, príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.8.6.	V prípade ďalšieho poklesu populácií chriašteľa poľného využiť cielenú ochranu hniezdisk s využitím ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z. z..	Počet stanovísk k zámerom a činnostiam	Stanoviská, príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.8.7.	Vylúčiť zásahy do mokradí a zabezpečiť revitalizáciu poškodených mokradí.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.8.8.	V rámci usmerňovania poľnohospodárskej činnosti prostredníctvom vydávania súhlásov obmedziť používanie hnojív a chemických látok na hniezdných lokalitách.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.8.9.	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie chriašteľa poľného.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadane do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dát)

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

1.9.1.	Zabezpečiť dlhodobé poľnohospodárske využitie pozemkov vhodnou formou pre predmety ochrany.	Rozloha pôdy nevhodne obhospodarovanej	Zhodnotenie raz za 5 rokov	Plní sa (ak rozloha klesá)/ neplní sa (ak rozloha stagnuje alebo rastie)
1.9.2.	V rámci usmerňovania poľnohospodárskej činnosti vylúčiť použitie chemických látok na hniezdných lokalitách.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.9.3.	V prípade potreby vytvoriť na okrajoch ornej pôdy trávnaté biopásy o šírke 10 m.	Počet stanovísk	Stanoviská, príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.9.4.	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie pŕhľaviara čiernohlavého.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.10.1	V rámci usmerňovania poľnohospodárskej činnosti prostredníctvom vydávania súhlasov obmedziť používanie hnojív a chemických látok na hniezdných lokalitách.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.10.2	Zabezpečiť dlhodobé poľnohospodárske využitie pozemkov vhodnou formou pre predmety ochrany.	Rozloha pôdy nevhodne obhospodarovanej	Zhodnotenie raz za 5 rokov	Plní sa (ak rozloha klesá)/ neplní sa (ak rozloha stagnuje alebo rastie)
1.10.3	Zachovávať dostatočné porasty krovín, solitérnych stromov a stromoradí na hniezdných lokalitách.	Rozloha biotopu v CHVÚ	Zhodnotenie raz za 5 rokov	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.10.4	Zachovať (prípadne podľa potreby aj vysadiť) vyššie solitérne stromy ako potenciálne miesta hniezdenia.	Rozloha biotopu v CHVÚ	Zhodnotenie raz za 5 rokov	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.10.5	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie hrdličky pol'nej.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.11.1	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie strakoša červenochrbtého.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.11.2	Vylúčiť zmenu TTP na ornú pôdu alebo iný druh pozemku, vylúčiť rozoranie TTP.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.11.3	Zabezpečiť dlhodobé poľnohospodárske využitie pozemkov vhodnou formou pre predmety ochrany.	Rozloha pôdy nevhodne obhospodarovanej	Zhodnotenie raz za 5 rokov	Plní sa (ak rozloha klesá)/ neplní sa (ak rozloha stagnuje alebo rastie)
1.11.4	Zachovávať dostatočné porasty krovín na hniezdných lokalitách.	Rozloha biotopu v CHVÚ	Zhodnotenie raz za 5 rokov	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.11.5	V rámci usmerňovania poľnohospodárskej činnosti obmedziť používanie umelých hnojív a chemických látok na hniezdných lokalitách.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.12.1	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie penice jarabej.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.12.2	Vylúčiť zmenu TTP na ornú pôdu alebo iný druh pozemku, vylúčiť rozoranie TTP.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.12.3	Vylúčiť zalesňovanie xerotermných krovitých strání.	Rozloha biotopu v CHVÚ	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

1.12.4	Zabezpečiť tlmenie sukcesie krovitých porastov, tak aby dosahovali optimálnu štruktúru a štádium sukcesie nebolo príliš pokročilé a to pravidelným mozaikovitým výrubom, prerieďovaním súvislých krovitých zárástov.	Rozloha biotopu v CHVÚ	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.12.5	Zachovávať dostatočné porasty krovín na hniezdných lokalitách v poľnohospodárskej krajine.	Rozloha biotopu v CHVÚ	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.12.6	V rámci usmerňovania poľnohospodárskej činnosti obmedziť používanie umelých hnojív a chemických látok na hniezdných lokalitách.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.13.1	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie krutihlava hnedého.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.13.2	Vylúčiť zmenu TTP na ornú pôdu alebo iný druh pozemku, vylúčiť rozoranie TTP.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.13.3	Zachovávať všetky staré a dutinové stromy, solitérne stromy a stromoradia v poľnohospodárskej krajine.	Rozloha biotopu v CHVÚ	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.13.4	Podľa potreby vysadiť solitérne stromy ako zabezpečenie potenciálnych hniezdných stromov do budúcnosti. (najmä na rozsiahlych otvorených plochách TTP, OP vzniknutých počas kolektivizácie).	Rozloha biotopu v CHVÚ	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.13.5	Zachovávať dostatočné porasty drevín na hniezdných lokalitách v poľnohospodárskej krajine.	Rozloha biotopu v CHVÚ	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.13.6	V rámci usmerňovania poľnohospodárskej činnosti obmedziť používanie umelých hnojív a chemických látok na hniezdných lokalitách, s výnimkou uvedenou pre jednotlivé EFP.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.14.1	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie lelka lesného.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak rozloha klesá) / neplní sa (ak rozloha stagnuje alebo rastie)
1.14.2	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch s výnimkou uvedenou pre jednotlivé EFP.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.14.3	Zabezpečiť na vhodných lokalitách zachovanie rôznovekých rozvolnených porastov drevín.	Rozloha biotopu v CHVÚ	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.15.1	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa / neplní sa
1.15.2	Ponechať pri spracúvaní kalamít na dožite zdravé stromy, ak je to možné aspoň 5 stromov na 1 ha, takisto ponechávať zlomy.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.15.3	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch s výnimkou uvedenou pre jednotlivé EFP.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

1.15.4	Vyhľadávať a nechať na dožitie hniezdne stromy s dutinami.	Počet hniezdných stromov s rozhodnutiami o ochrane	Stanoviská, rozhodnutia príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.15.5	Zapracovať relevantné opatrenia do PSL.	Počet JPRL so zapracovanými zásadami OP	Schválené PSL	Plní sa priebežne / plní sa čiastočne / neplní sa priebežne
1.15.6	Zabezpečiť pravidelne monitoring vybranej vzorky populácie muchára sivého.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.16.1	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie raz za 5 rokov	Plní sa / neplní sa
1.16.2	Ponechať pri spracúvaní kalamít na dožitie zdravé stromy, ak je to možné aspoň 5 stromov na 1 ha, takisto ponechávať zlomy.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.16.3	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch, s výnimkou uvedenou pre jednotlivé EFP.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Zhodnotenie raz za 5 rokov	Plní sa / neplní sa
1.16.4	Vyhľadávať a nechať na dožitie hniezdne stromy s dutinami.	Počet hniezdných stromov s rozhodnutiami o ochrane	Stanoviská, rozhodnutia príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.16.5	Zapracovať relevantné opatrenia do PSL.	Počet JPRL so zapracovanými zásadami OP	Schválené PSL	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
1.16.6	Zabezpečiť pravidelne monitoring vybranej vzorky populácie ďatľa prostredného.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá).
1.17.1	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa / neplní sa
1.17.2	Ponechať pri spracovaní kalamít na dožitie zdravé stromy, ak je to možné aspoň 5 stromov na 1 ha, takisto ponechávať zlomy.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.17.3	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch, s výnimkou uvedenou pre jednotlivé EFP..	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská, príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.17.4	Vyhľadávať a nechať na dožitie hniezdne stromy s dutinami.	Počet hniezdných stromov s rozhodnutiami o ochrane	Stanoviská, rozhodnutia príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.17.5	Zapracovať relevantné opatrenia do PSL.	Počet JPRL so zapracovanými zásadami OP	Schválené PSL	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
1.17.6	Zabezpečiť pravidelne monitoring vybranej vzorky populácie muchárika bielokrkého.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.18.1	Zabezpečiť monitoring všetkých hniezdných okrskov orla skalného každoročne a každoročne dohľadávať hniezda v porastoch ohrozených ťažbou lesných porastov.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

1.18.2	Zabezpečiť po vyhniezdení opravu všetkých známych nestabilných stromových hniezd a v prípade pádu na vhodných stromoch vyložiť náhradné hniezdne podložky.	Počet hniezd s vykonanými zásahmi.	Správy a záznamy z opráv	Plní sa (ak boli opravené hniezda) / neplní sa (ak hniezda s nutnou opravou neboli opravené).
1.18.3	V okolí hniezd zabezpečiť vyhlásenie ochranných zón.	Počet vyhlásených ochranných zón.	Rozhodnutia úradov	Plní sa / neplní sa
1.18.4	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa / neplní sa
1.18.5	Dôsledne posúdiť vplyv investícií do cestovného ruchu a iných investícií na predmety ochrany.	Počet stanovísk k zámerom a činnostiam	Stanoviská, príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.18.6	Zabezpečiť kontrolnú činnosť dodržiavania obmedzení z dôvodov ochrany prírody.	Počet stanovísk k zámerom a činnostiam	Stanoviská, príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.18.7	Zapracovať relevantné opatrenia ako zásady hospodárenia v lese do novovypracúvaných PSL.	Počet JPRL so zapracovanými zásadami OP	Schválené PSL	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
1.18.8	Nové elektrické vedenia ošetriť prvkami zamedzujúcimi kolíziám a rovnako ošetriť aj existujúce vedenia vo vybraných úsekokach zvážiť ich umiestnenie pod zem...	Dĺžka vedení bez zábran proti sadaniu / kolíziám vtáctva	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa (ak dĺžka klesá) / neplní sa (ak dĺžka stagnuje alebo rastie)
1.18.9	Usmerniť fotografovanie orlov skalných v blízkosti ich hniezdisk.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.19.1	Zabezpečiť monitoring všetkých obsadených hniezdných teritórií (3 návštevy do roka na každom hniezde) na začiatku hniezdenia v období toku, uprostred hniezdenia a po vyletení mláďat.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
1.19.2	V okolí hniezd zabezpečiť vyhlásenie ochranných zón.	Počet vyhlásených ochranných zón	Rozhodnutia úradov	Plní sa / neplní sa
1.19.3	V hniezdnom období vo vzdialenosťi min. 500 m okolo hniezd vylúčiť skalolezeckú činnosť, športovo rekreačnú činnosť, turistické chodníky, ohniská, paragliding.	Počet stanovísk k zámerom a činnostiam	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.19.	Dôsledne posúdiť dopad investícií do cestovného ruchu a iných investícií na predmety ochrany.	Počet stanovísk k zámerom a činnostiam	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.19.5	Zabezpečiť kontrolnú činnosť dodržiavania obmedzení z dôvodov ochrany prírody.	Počet stanovísk k zámerom a činnostiam	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.19.6	Nové elektrické vedenia ošetriť prvkami zamedzujúcim kolíziám a rovnako ošetriť aj existujúce vedenia, vo vybraných úsekokach zvážiť ich umiestnenie pod zem..	Dĺžka vedení bez zábran proti sadaniu / kolíziám vtáctva	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa (ak dĺžka klesá) / neplní sa (ak dĺžka stagnuje alebo rastie)
1.19.7	Usmerniť fotografovanie a filmovanie vtáctva v území.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.20.1	Zabezpečiť pravidelne monitoring vybraných hniezdných okrskov včielára lesného.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

1.20.2	V okolí vybraných hniezd zabezpečiť vyhlásenie ochranných zón.	Počet vyhlásených ochranných zón.	Rozhodnutia úradov	Plní sa / neplní sa
1.20.3	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa / neplní sa
1.20.4	Dôsledne posúdiť dopad investícií do cestovného ruchu a iných investícií na predmety ochrany.	Počet stanovísk k zámerom a činnostiam	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.20.5	Zabezpečiť kontrolnú činnosť dodržiavania obmedzení z dôvodov ochrany prírody.	Počet stanovísk k zámerom a činnostiam	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
1.20.6	Zapracovať relevantné opatrenia ako zásady hospodárenia v lese novovypracúvaných PSL.	Počet JPRL so zapracovanými zásadami OP	Schválené PSL	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
1.20.7	Vylúčiť zmenu TTP na ornú pôdu alebo iný druh pozemku, vylúčiť rozoranie TTP.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.20.8	Zabezpečiť dlhodobé polnohospodárske využitie pozemkov vhodnou formou (pastva, kosenie) a zabrániť opusteniu polnohospodárskej pôdy.	Rozloha pôdy nevhodne obhospodarovanej	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa (ak rozloha klesá) / neplní sa (ak rozloha stagnuje alebo rastie)
1.20.9	Nové elektrické vedenia ošetriť prvkami zamedzujúcim koliziám a rovnako ošetriť aj existujúce vedenia, vo vybraných úsekoch zvážiť ich umiestnenie pod zem..	Dĺžka vedení bez zábran proti sadaniu / koliziám vtáctva	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa (ak dĺžka klesá) / neplní sa (ak dĺžka stagnuje alebo rastie)
1.20.10.	Vylúčiť negatívne zásahy do mokradí a zabezpečiť revitalizáciu poškodených mokradí.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.20.11.	Usmerniť fotografovanie včelára lesného v blízkosti hniezdisk.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.21.1	Monitorovať pravidelne zastúpenie porastov vo veku nad 80 rokov.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.21.2	Kontrolovať dodržiavanie legislatívny na úseku ochrany prírody a hospodárenia v lese pri obnovných ťažbách.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
1.21.3	Zapracovať požiadavky na zastúpenie lesa vo veku 80 rokov do novovypracúvaných PSL tak, aby tento podiel neklesol pod 35 %.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa / neplní sa
2.1.1.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa / neplní sa
2.1.2.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch s výnimkou uvedenou pre jednotlivé EFP..	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
2.1.3.	Vyhľadávať a nechať na dožitie hniezdne stromy s dutinami.	Počet hniezdných stromov s rozhodnutiami o ochrane	Stanoviská, rozhodnutia príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

2.1.4.	Zabezpečiť aby rozloha lesných porastov so zastúpením buka výšším ako 10 % a vekom nad 80 rokov neklesla pod 700 ha.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa / neplní sa
2.1.5.	Zapracovať relevantné opatrenia do PSL.	Počet JPRL so zapracovanými zásadami OP	Schválené PSL	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
2.1.6.	Na lokalitách tetrova hlucháňa zabezpečiť ochranu biotopov podľa nárokov tetrova hlucháňa ako predpoklad aj pre ochranu žlny sivej.	Počet JPRL so zapracovanými zásadami OP	Schválené PSL	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
2.1.7.	Zabezpečiť pravidelne monitoring vybranej vzorky populácie žlny sivej.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
2.2.1	Kontrola dodržiavania legislatív ochrany prírody a usmernenie hospodárskych činností na obsadených lokalitách, najmä z dôvodu obmedzenia vyrúšovania, ale aj za účelom podpory vhodného manažmentu.	Počet stanovísk k zámerom a činnostiam	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
2.2.2.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 25 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa / neplní sa
2.2.3.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch, s výnimkou uvedenou pre jednotlivé EFP.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
2.2.4.	Presadiť čo najvyššie zastúpenie pionierskych drevín v PSL.	Počet JPRL so zapracovanými zásadami OP	Schválené PSL	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
2.2.5.	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie jariabka hôrnego.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
2.2.6.	Zapracovať relevantné opatrenia ako zásady hospodárenia v lese do novovypracúvaných PSL.	Schválené PSL	Počet JPRL so zapracovanými zásadami OP	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
2.2.7.	Zabezpečiť doplnenie vhodných druhov drevín (bubuľonosné, breza, jelša, jarabina) ich výsadobu a zabezpečiť ochranu mravenísk.	Počet vysadených drevín/plocha vysadených drevín; zakladanie nových mravenísk/ zmena obhospodarovania	Záznamy/správy z realizácie	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
2.2.8.	Vylúčiť prikrmovanie polovnej zveri zrnninami a zabezpečiť zníženie stavu diviakov v týchto revíroch na nulu.	JSK diviakov lesných v dotknutých revíroch	Každoročné zhodnotenie	Plní sa (ak počet klesá) / neplní sa (ak je počet stabilný alebo rastie)
2.2.9.	Odstrániť nelegálne skládky, ktoré slúžia ako miesta zberu potravy pre krkavcovité vtáky.	Počet zrealizovaných projektov	Správy z realizácie projektov	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
2.2.10	Vylúčiť vstup motorových vozidiel mimo existujúcej cestnej siete.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
2.3.1.	Pri obnovnej ťažbe zabezpečiť, aby vždy na každú jednotku plochy 100 ha ostalo zachovaných minimálne 35 % obnovných porastov starších ako 80 rokov.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa / neplní sa

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

2.3.2.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch s výnimkou pre jednotlivé EFP.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
2.3.3.	Zabezpečiť každoročne monitoring vybranej vzorky hniezdných lokalít žltouchvosta lesného.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
2.3.4.	Ak nie je možné pri spracovaní kalamít ponechať v poraste 25 % porastov starších ako 80 rokov na 100 ha, potom je potrebné pri spracovaní kalamít ponechávať na dožitie zdravé stromy, ak je to možné aspoň 5 stromov na 1 ha, takisto ponechávať zlomy.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
2.3.5.	Vyhľadávať a nechať na dožitie stromy s dutinami.	Počet hniezdných stromov s rozhodnutiami o ochrane	Stanoviská, rozhodnutia príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
2.3.6.	Podporiť hniezdne podmienky pre žltouchvosta lesného vyvesením búdkov.	Počet zrealizovaných projektov vyhotovenia búdkov	Správy z realizácie projektov	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
2.3.7.	Vymedziť bezzásahové zóny.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
2.3.8.	Zapracovať relevantné opatrenia ako zásady hospodárenia v lese do novovypracúvaných PSL.	Počet JPRL so zapracovanými zásadami OP	Schválené PSL	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
2.4.1.	Zabezpečiť pravidelný monitoring vybranej vzorky populácie strakoša sivého.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
2.4.2.	Vylúčiť zmenu TTP na ornú pôdu alebo iný druh pozemku, vylúčiť rozoranie TTP.	Počet kontrol v CHVÚ	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
2.4.3.	Zabezpečiť dlhodobé polnohospodárske využitie pozemkov vhodnou formou pre predmety ochrany.	Rozloha pôdy nevhodne obhospodarovanej	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa (ak rozloha klesá) / neplní sa (ak rozloha stagnuje alebo rastie)
2.4.4.	Zachovávať dostatočné porasty krovín, solitérnych stromov a stromoradí na hniezdných lokalitách.	Rozloha biotopu v CHVÚ	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
2.4.5.	Zachovať (prípadne podľa potreby aj vysadiť) vyššie solitérne stromy ako potenciálne miesta hniezdenia a lovú strakoša sivého.	Rozloha biotopu v CHVÚ	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
2.5.1.	Vo vybraných porastoch vylúčiť lesohospodárske a iní zásahy do lesných porastov.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
2.5.2.	Vylúčiť vykonávanie lesohospodárskej činnosti od 1.03. do 30.06..	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
2.5.3.	Vylúčiť aplikáciu insekticídov v lesných porastoch s výnimkou uvedenou pre jednotlivé EFP..	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
2.5.4.	Zabezpečiť, aby v území bolo na konci platnosti programu starostlivosti minimálne 60 % výmery lesov vo veku nad 80 rokov.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie na konci platnosti programu starostlivosti	Plní sa / neplní sa

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

2.5.5.	Výchovnými zásahmi zabezpečiť, aby boli porasty vhodné pre výskyt tetrova hlucháňa (heterogénne, zakmenenie maximálne 0,7 a pod.).	Počet JPRL so zapracovanými zásadami OP	Schválené PSL	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
2.5.6.	Obnovu lesných porastov vykonávať spôsobom vhodným pre tetrova hlucháňa.	Počet JPRL so zapracovanými zásadami OP	Schválené PSL	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
2.5.7.	Pre obnovu porastov vypracovať projekty obnovy podľa nárokov tetrova hlucháňa.	Počet JPRL so zapracovanými zásadami OP	Schválené PSL	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
2.5.8.	Vylúčiť výstavbu ďalších lesných ciest a zvážnic.	Počet stanovísk a rozhodnutí	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
2.5.9.	Zabezpečiť monitoring všetkých tokanísk tetrova hlucháňa.	Zistený počet párov	Záznamy z monitoringu zadané do databázy	Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dátá)
2.5.10	Zabezpečiť prieskum negatívnych faktorov vplývajúcich na početnosť tetrova hlucháňa za účelom upresnenia vhodných manažmentových opatrení.	Počet kontrol na lokalitách výskytu tetrova hlucháňa.	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
2.5.11	Zabezpečiť kontrolnú činnosť dodržiavania obmedzení z dôvodu ochrany prírody.	Počet stanovísk k zámerom a činnostiam	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
2.5.12	Vylúčiť stavbu nových elektrických vedení a existujúce ošetriť prvkami pre zabránenie kolízii s vtáctvom alebo ich umiestniť po zem.	Dĺžka vedení bez zábran proti sadaniu / kolíziám vtáctva	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa (ak dĺžka klesá) / neplní sa (ak dĺžka stagnuje alebo rastie)
2.5.13	Usmerniť fotografovanie a filmovevanie vtáctva v území.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
2.5.14	Zapracovať relevantné opatrenia ako zásady hospodárenia v lese do novovypracúvaných PSL.	Počet JPRL so zapracovanými zásadami OP	Schválené PSL	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
2.6.1	Vylúčiť prikrmovanie poľovej zveri zrnninami a zabezpečiť zníženie stavu diviakov v týchto revíroch na nulu.	Jednotný kmeňový stav (JKS) diviakov lesných v dotknutých revíroch	Každoročné zhodnotenie	Plní sa (ak počet klesá) / neplní sa (ak je počet stabilný alebo rastie)
2.6.2.	Odstrániť nelegálne skládky, ktoré slúžia ako miesta zberu potravy pre krkavcovité vtáky.	Počet zrealizovaných projektov	Správy z realizácie projektov	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
2.6.3.	Monitorovať výskyt diviaka na lokalitách tetrova hlucháňa a jariabka hôrneho.	JKS diviakov lesných v dotknutých revíroch	Každoročné zhodnotenie	Plní sa (ak počet klesá) / neplní sa (ak je počet stabilný alebo rastie)
2.7.1.	Zabezpečiť relevantnú ochranu starších porastov s vyšším zastúpením buka.	Rozloha biotopu k CHVÚ	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
2.7.2.	Zapracovať požiadavky na zastúpenie buka do PSL v CHVÚ tak, aby súhrnný rozsah porastov vo veku nad 80 rokov a zastúpením buka nad 10 % neklesol počas platnosti PS po súčasnú úroveň.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa / neplní sa
2.7.3.	V územnoplánovacej dokumentácii presadzovať vysoké zastúpenie stromovej zelene v intravilánoch v výskytom s výskytom žltouchvosta lesného.	Rozloha biotopu v CHVÚ	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne

Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048

2.7.4.	Vyhľadávať hniezdne stromy žltouchvosta lesného a v prípade, že ide o staršie stromy zabezpečiť ich ochranu.	Počet hniezdných stromov s rozhodnutiami o ochrane	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
2.7.5.	V lesných porastoch nedosahujúcich vek 80 rokov alebo nedosahujúcich vhodnú štruktúru pre hniezdenie žltouchvosta lesného vyvesiť hniezde bûdky.	Rozloha lesných porastov vo veku nad 80 rokov	Zhodnotenie raz za päť rokov	Plní sa / neplní sa
3.1.1.	Zhodnotiť zoznam zakázaných činností a predmety ochrany podľa vyhlášky MŽP SR č. 28/2011 Z. z. z hľadiska cieľov ochrany druhov.	Vykonaná analýza efektívnosti vyhlášky MŽP SR č. 28/2011 Z. z., prehodnotenie, prípadne počet štúdií	Zhotovené štúdie, analýza	Plní sa / neplní sa
3.1.2.	Ak je relevantné, pripraviť a prerokovať návrh nového právneho predpisu.	Pripravený a prerokovaný návrh právneho predpisu.	Ukončené prerokovanie návrhu, záznamy z rokovania.	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
3.2.1.	Vyhodnotiť, či sektorové právne predpisy (poľnohospodárske, lesnícke, poľovnícke a ī.) umožňujú realizáciu opatrení navrhovaných v PS.	Vykonaná analýza relevantných právnych predpisov.	Zhotovené štúdie, analýza	Plní sa / neplní sa
3.2.2.	Ak je relevantné, pripraviť a prerokovať návrh nového právneho predpisu.	Pripravený a prerokovaný návrh právneho predpisu.	Ukončené prerokovanie návrhu, záznamy z rokovania.	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
4.1.1.	Realizovať informačné a praktické ekovýchovné aktivity pre farmárov, lesníkov, poľovníkov a miestnych obyvateľov o význame tejto lokality.	Počet workshopov, prednášok a stretnutí	Prezenčné listiny	Plní sa / neplní sa
4.1.2.	Pri investíciah do mäkkých foriem cestovného ruchu (napr. výstavba nových turistických chodníkov, altánkov, rozhládzí) zvážiť a posúdiť tieto investície z pohľadu vplyvu na predmety ochrany.	Počet stanovísk k zámerom a činnostiam	Stanoviská príslušných úradov, organizácie OP	Plní sa / neplní sa
4.1.3.	Usmerniť fotografovanie a filmovanie vtáctva v území tak, aby neohrozovalo vtáky na hniezdiskách a neviedlo k zmareniu hniezdení.	Počet kontrol v CHVÚ	Záznamy z kontroly	Plní sa priebežne / neplní sa priebežne
4.1.4.	Usmerniť návštěvnosť na hniezdiskách vtáctva mimo citlivých lokalít. Vybudovať preto vhodnú infraštruktúru (zábrany na vjazd motorových vozidiel, záchytné menšie parkoviská a prístupové náhradné chodníky na menej citlivé lokality a pod.).	Počet zrealizovaných projektov	Správy z realizácie projektov	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
4.1.5.	Na vhodných miestach vybudovať pozorovateľne vtáctva, náučný chodník, fotokryty a úkryty (drobné útulne) pre turistov za účelom usmernenia návštěvnosti územia.	Počet zrealizovaných projektov	Správy z realizácie projektov	Plní sa / neplní sa
4.1.6.	Každoročne organizovať exkurzie s pozorovaním vtáctva pre verejnosť.	Počet exkurzií	Prezenčné listiny	Plní sa / neplní sa
4.1.7.	Pravidelne organizovať prednášky a ďalšie ekovýchovné aktivity na	Počet workshopov, prednášok a stretnutí	Prezenčné listiny	Plní sa / neplní sa

*Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019-2048*

	všetkých školách v obciach a mestách dotknutých CHVÚ.			
4.1.8.	Vydávať letáky a iné vhodné propagačné materiály o území a umiestňovať pravidelne súvisiace články aj do regionálnych médií a vydáť film o lokalite.	Počet titulov publikácií a článkov	Výtlačky publikácií a článkov, film.	Plní sa / neplní sa
4.1.9.	Vhodnou formou propagovať prírodné hodnoty CHVÚ Strážovské vrchy v zahraničí s cieľom zvýšenia počtu návštěvníkov využívajúcich mäkké formy cestovného ruchu.	Počet titulov publikácií a článkov, workshopov, prednášok a stretnutí	Výtlačky publikácií a článkov, prezenčné listiny	Plní sa / neplní sa
4.1.10	Realizovať rôzne ekovýchovné a vzdelávacie podujatia za účelom získať pre mapovanie a ochranu vtáctva obyvateľov (napr. tábory, semináre, školenia a pod.).	Počet workshopov, prednášok a stretnutí	Prezenčné listiny	Plní sa / neplní sa
4.2.1.	Realizovať informačné aktivity pre farmárov, lesníkov, rybárov, polovníkov a miestnych obyvateľov o alternatívnom hospodárení v CHVÚ.	Počet zrealizovaných projektov	Správy z realizácie projektov	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
4.2.2.	Spolupracovať so správcami tokov a vodných plôch pri zabezpečovaní ochrany mokradí a tečúcich vôd ako významných lovísk bociana čierneho a hniezdisk ostatných druhov vtákov.	Počet zrealizovaných projektov	Správy z realizácie projektov	Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa
4.2.3.	Spolupracovať so správcami elektrických rozvodných sietí na prekládkach hniezd bociana bieleho a pri ošetroení vedení prvkami zabraňujúcimi kolíziam vtáctva.	Počet zrealizovaných projektov/stanovísk k zviditeľňovaniu vedení	Správy z realizácie projektov/stanoviská	Plní sa /plní sa čiastočne/ neplní sa
4.2.4.	Zabezpečiť dostatočnú informovanosť vlastníkov a užívateľov pozemkov o možnostiach čerpania finančných prostriedkov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu podmienok pre ochranu druhov v území (operačné programy, PRV <sup>33</sup> a pod.).	Počet workshopov, prednášok a stretnutí	Prezenčné listiny	Plní sa / neplní sa
4.2.5.	Využiť primeranú formu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania alebo finančný príspevok podľa zákona č. 543/2002 Z. z..	Počet zrealizovaných zámen pozemkov	Zámmenné zmluvy	Plní sa / neplní sa

<sup>33</sup> Program rozvoja vidieka

## 5. POUŽITÉ PODKLADY A ZDROJE INFORMÁCIÍ


- Aymí, R., Gargallo, G. and de Juana, E. 2015. Barred Warbler (*Sylvia nisoria*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. (eds), *Handbook of the Birds of the World Alive*, Lynx Edicions, Barcelona.
- Baptista, L.F., Trail, P.W., Horblit, H.M., Boesman, P. and Sharpe, C.J. 2015. European Turtle-dove (*Streptopelia turtur*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. (eds), *Handbook of the Birds of the World Alive*, Lynx Edicions, Barcelona.
- Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, 2009-2013 dostupné na <http://www.beiss.sk/>
- Cleere, N. and Christie, D.A. 2013. European Nightjar (*Caprimulgus europaeus*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. (eds), *Handbook of the Birds of the World Alive*, Lynx Edicions, Barcelona.
- Collar, N. 2015. Common Stonechat (*Saxicola torquatus*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. (eds), *Handbook of the Birds of the World Alive*, Lynx Edicions, Barcelona.
- Collar, N. and Christie, D.A. 2015. Common Redstart (*Phoenicurus phoenicurus*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. (eds), *Handbook of the Birds of the World Alive*, Lynx Edicions, Barcelona.
- Danko, Š. Lelek obyčajný/lelek lesný. 2002. In: DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. Autor druhu Štefan Danko. ISBN 80-224-0714-3. Kapitola Lelek obyčajný / Lelek lesný, s. 381 - 382.
- Danko, Š., Karaska, D., 2002. Výr skalný (*Bubo bubo*). In: Danko, Š., Darolová, A., Krištín, T. 2002. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda. Bratislava. 688 s.
- Databáza hydrogeologických a geotermálnych vrtov, Geologický ústav Dionýza Štúra, 2014 dostupné na <http://mapserver.geology.sk/hgvrtv/>
- de Juana, E. and Kirwan, G.M. 2012. Western Capercaillie (*Tetrao urogallus*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. (eds), *Handbook of the Birds of the World Alive*, Lynx Edicions, Barcelona
- de Juana, E. a Kirwan, G.M. 2013. Hazel Grouse (*Bonasa bonasia*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (eds.) 2013. *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona. Demko, M. (2001). Program záchrany kriticky ohrozeného druhu chrapkáč poľný (*Crex crex*) na území Slovenska. ŠOP SR, Banská Bystrica.
- Demko, M 2002. Prepelica poľná In: DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. *Rozšírenie vtákov na Slovensku*. Bratislava : Veda, 2002. ISBN 80-224-0714-3. s. 227 – 229.
- Holt, D.W., Berkley, R., Deppe, C., Enríquez Rocha, P., Petersen, J.L., Rangel Salazar, J.L., Segars, K.P. & Wood, K.L. 1999a. Boreal Owl (*Aegolius funereus*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (eds.) 2014. *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona.
- Hraško, J., Linkeš, V., Šály, R., Šurina, B., 1993. Pôdna mapa Slovenska, Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
- Hudec, K. 1983: Fauna ČSSR. Ptáci 3/I. — Academia, Praha.
- Hudec, K. Šťastný K (1994): Fauna ČR a SR, Ptáci, 2. přepracované a doplněné vydání. Academia, Praha.
- Hudec, K. Šťastný K. (eds) 2005: Fauna ČR. Ptáci – Aves, díl II/1. Academia, Praha
- Huntley B., Green R.E., Collingham Y.C., Willis S.G. 2007: A Climatic Atlas of European Breeding Birds. – Durham University/RSPB/Lynx, UK.
- Karaska D. 2002. Bocian čierny. In: DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. *Rozšírenie vtákov na Slovensku*. Bratislava: Veda, 2002. ISBN 80-224-0714-3. s. 99 – 101.

- Karaska D & Cichocki W 2014: Hniezdne rozšírenie vtáctva Oravy [Birds distribution of Orava region]. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava
- Karaska, D, Danko, Š. 2002. Včelár obyčajný. In: DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. ISBN 80-224-0714-3. s. 166 - 167.
- Krištín, A. 2002a. Penica jarabá. In: Danko, Š., Darolová, A., Krištín, T. (eds.) (2002). Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava.
- Krištín, A. 2002b. Pŕhlaviar čiernohlavý. In: Danko, Š., Darolová, A., Krištín, T. (eds.) (2002). Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava.
- Krištín, A. 2002c. Hrdlička poľná. In: DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. *Rozšírenie vtákov na Slovensku*. Bratislava : Veda, 2002. ISBN 80-224-0714-3.
- Krištín, A. Kropil, R. 2002. Muchárik bielokrký. In: DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. ISBN 80-224-0714-3. s. 531 - 532.
- Kropil, R. Tesár čierny/d'ateľ čierny. 2002. In: DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. ISBN 80-224-0714-3. s. 399-401
- Kropil, R. 2002b. Žltochvost hôrny / Žltochvost lesný. In: DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. *Rozšírenie vtákov na Slovensku*. Bratislava : Veda, 2002. Autor druhu Rudolf Kropil. ISBN 80-224-0714-3. s. 469 - 470.
- Mapový portál Štátnej ochrany prírody a krajiny, Banská Bystrica, 2014 dostupné na <http://maps.sopsr.sk/mapy/map.html>
- McGowan, P.J.K., de Juana, E. and Boesman, P. 2013. Common Quail (*Coturnix coturnix*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. (eds), *Handbook of the Birds of the World Alive*, Lynx Edicions, Barcelona.
- Miklós, L., 2002. Atlas krajiny Slovenskej republiky. I. vyd., Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR; Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia
- Orta, J., Kirwan, G.M., Boesman, P., Garcia, E.F.J., Marks, J.S. 2015. Golden Eagle (*Aquila chrysaetos*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. a de Juana, E. (eds.) 2015. *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona.
- Pačenovský, S., Chrašč, P., Repel, M. 2012. Nesting by the Eurasian eagle owl (*Bubo bubo*) in a nest of the whitetailed eagle (*Haliaeetus albicilla*). Slovak Rapt J (6).s. 37–40.
- Pavlík, Š. 2002a. Ďateľ prostredný. In: Danko, Š., Darolová, A., Krištín, T. (eds.) (2002). Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava.
- Pavlík, Š. 2002b. Krutohlav obyčajný/krutihlav hnedý. In: DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. *Rozšírenie vtákov na Slovensku*. Bratislava : Veda, 2002. ISBN 80-224-0714-3. s. 393 - 395.
- Pivarčí, M., Kropitz, P., 1998. Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja, Banská Bystrica: Urkea s.r.o. v znení zmien a doplnkov č. 1 až 4
- Polák, P., Saxa, A. (eds.), 2005: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. ŠOP SR, Banská Bystrica, 736 pp.
- Prehľad výhradných ložísk a ložísk nevyhradených nerastov, Geologický ústav Dionýza Štúra, 2014 dostupné na <http://mapserver.geology.sk/loziska/>
- Program záchrany hlucháňa hôrneho (*Tetrao urogallus* Linnaeus, 1758) na roky 2018-2022. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, 2018
- Register evidencie navrhovaných, určených, blokovaných a zrušených prieskumných území, Geologický ústav Dionýza Štúra, 2014 dostupné na <http://mapserver.geology.sk/pu/>
- Register zaevidovaných skládok odpadov na území SR, Geologický ústav Dionýza Štúra, 2014 dostupné na <http://mapserver.geology.sk/skladky/>
- Register zdokumentovaných svahových deformácií na území SR, Geologický ústav Dionýza Štúra, 2014 dostupné na <http://mapserver.geology.sk/zosuvy/>


- Saniga, M..2002. Jariabok hôrny (*Bonasa bonasia*). In: Danko, Š., Darolová, A., Krištín, T. (eds.) 2002. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava.
- SOS/BirdLife Slovensko. 2013. Metodika dlhodobého systematického monitoringu výberových druhov vtákov v chránených vtáčích územiach. Štátnej ochrany prírody SR, Banská Bystrica. 180 s.
- Šotnár K. 2007: Tree nesting of Eagle Owl (*Bubo bubo*) in Prievidza district. — Slovak Raport Journal 1: 59–60
- Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny dostupný na <http://uzemia.enviroportal.sk/>
- Šťastný, K. a Hudec, K. a (2011). Sylvia nisoria – Penice vlašská. In: Ptáci – Aves. Fauna ČR, díl 3/I. Academia, Praha.
- Taylor, B. 2006a. Red-breasted Flycatcher (*Ficedula parva*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (eds.) (2014). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona.
- Taylor, B. 2006b. Collared Flycatcher (*Ficedula albicollis*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (eds.) (2014). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (retrieved from <http://www.hbw.com/node/59049> on 30 March 2015).
- Taylor, B. 2006c. Spotted Flycatcher (*Muscicapa striata*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona.
- Taylor, B. & de Juana, E. 2014. Corncrake (*Crex crex*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (eds.) (2014). *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona.
- Vass, D.,1988. Regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej panvy na území ČSSR, Bratislava: Geologický ústav Dionýza Štúra
- Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu
- White, C.M., Christie, D.A., de Juana, E. & Marks, J.S. 2015. Peregrine Falcon (*Falco peregrinus*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (eds.) 2015. *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona. dostupné na:<http://www.hbw.com/node/53247>.
- Winkler, H., Christie, D. 2002a. Black Woodpecker (*Dryocopus martius*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. (eds), *Handbook of the Birds of the World Alive*, Lynx Edicions, Barcelona.
- Winkler, H., Christie, D.A. 2002b. White-backed Woodpecker (*Dendrocopos leucotos*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. (eds), *Handbook of the Birds of the World Alive*, Lynx Edicions, Barcelona.
- Winkler, H., Christie, D.A. 2015. Grey-faced Woodpecker (*Picus canus*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (eds.) 2015. *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona.
- Winkler, H., Christie, D.A. and Kirwan, G.M. 2015. Eurasian Wryneck (*Jynx torquilla*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. (eds), *Handbook of the Birds of the World Alive*, Lynx Edicions, Barcelona
- Yosef, R. and International Shrike Working Group. 2008. Lesser Grey Shrike (*Lanius minor*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. (eds), *Handbook of the Birds of the World Alive*, Lynx Edicions, Barcelona.
- Yosef, R., International Shrike Working Group and Christie, D.A. 2012. Red-backed Shrike (*Lanius collurio*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. (eds), *Handbook of the Birds of the World Alive*, Lynx Edicions, Barcelona.
- Zuna-Kratky T 2003: Hnízdění výra velkého (*Bubo bubo*) v nížinných lužních lesích v SV Rakousku [Nesting of eagle-owl (*Bubo bubo*) in lowlands of riparian forests in the north-east of Austria]. *Crex* 20: 41–47.

## 6. PRÍLOHY


### 6.1. Mapa predmetov ochrany CHVÚ Strážovské vrchy




## 6.2. Mapa identifikácie vlastnícko – uživateľských vzťahov CHVÚ Strážovské vrchy



### 6.3. Mapa využitia územia CHVÚ Strážovské vrchy




## 6.4. Mapa ekologicko funkčných priestorov CHVÚ Strážovské vrchy




## 6.5. Iná dokumentácia<sup>34</sup>

### 6.5.1. Mapa častí CHVÚ Strážovské vrchy so zakázanými činnosťami podľa vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z. z..



<sup>34</sup> V zmysle prílohy č. 18 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. je prílohou č. 6.5 Mapa zón. Nakoľko CHVÚ Strážovské vrchy nie je zónované, táto mapa sa nevyhotovuje.

## 6.5.2 Mapa prekryvu CHVÚ Strážovské vrchy s chránenými územiami a územiami európskeho významu (ÚEV)



### 6.5.3. Porastová mapa CHVÚ Strážovské vrchy

